

یہ کتاب حکومت پنجاب کی طرف سے تعلیمی سال  
2019-20 کیلئے پنجاب کے سرکاری سکولوں  
میں تقسیم کی گئی جیکٹ میں شامل ہے

علمی کتاب خانہ  
کبیر سٹریٹ، اُردو بازار، لاہور



”تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مطلوبہ پیش رفت کے بغیر ہم نہ صرف اقوامِ عالم سے پیچھے رہ جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے“

قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان  
(26 ستمبر 1947ء - کراچی)

## قومی ترانہ

پاک سرزمین شاد باد      کشورِ حسین شاد باد  
تو نشانِ عزمِ عالی شان      ارضِ پاکستان  
مرکزِ یقین شاد باد  
پاک سرزمین کا نظام      قوتِ اخوتِ عوام  
قومِ ملک سلطنت      پائندہ تابندہ باد  
شاد باد منزلِ مراد  
پرچمِ ستارہ و ہلال      رہبرِ ترقی و کمال  
ترجمانِ ماضی شانِ حال      جانِ استقبال  
سایہٴ خدائے ذوالجلال

عرضِ ناشر:

یہ کتاب حکومت پنجاب کی طرف سے تمام سرکاری سکولوں میں مہیا کی گئی ہے۔ اگر اس کتاب کے متن اور املا وغیرہ میں کوئی غلطی ہو تو اس بارے میں ادارے کو آگاہ کریں۔ ادارہ آپ کا شکر گزار ہوگا۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

10

# ریاضی

سنس گروپ



علمی کتاب خانہ، لاہور۔

منظور کردہ: پنجاب کمری کولم اتھارٹی، وحدت کالونی، لاہور۔ برطانیق مراسلہ نمبر PCA/12/123 مورخہ 27.11.2012 اس کتاب کا کوئی حصہ نقل یا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے سیٹ پیپر، گائیڈ بکس، خلاصہ جات، نوٹس یا امدادی کتب کی تیاری میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

### مؤلفین

- ◀ پروفیسر محمد حبیب
- ◀ پروفیسر چوہدری اصغر علی
- ◀ پروفیسر عبدالرؤف خان
- ◀ پروفیسر محمد معین

### مدیر

پروفیسر محمد شریف غوری

### ماہر مضمون

پنجاب کمری کولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور

### اداکین ریویو کمیٹی

- ۱۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد حسین
- ۲۔ مسٹر منور دین اعوان
- ۳۔ مسٹر نسیم الاسلام
- ۴۔ پروفیسر ایم اسلم خٹک
- ۵۔ مسٹر تنزیلہ ناز
- ۶۔ مسٹر عرفان حسین
- ۷۔ مسٹر محمد عظیم
- ۸۔ سید شمن رضا
- ۹۔ مسٹر نسیم حسین
- ۱۰۔ مسٹر افضل حسین

### مقصود گرافکس

اُردو بازار، لاہور

پیوڈنگ

## فہرست

### الجبرا

| یونٹ | عنوان                     | صفحہ نمبر |
|------|---------------------------|-----------|
| 1    | دو درجی مساواتیں          | 1         |
| 2    | دو درجی مساواتوں کا نظریہ | 19        |
| 3    | تغییرات                   | 55        |
| 4    | جزوی کسریں                | 83        |
| 5    | سیٹ اور تقابل             | 95        |
| 6    | بنیادی شماریات            | 123       |

### جیومیٹری

|    |                         |     |
|----|-------------------------|-----|
| 7  | تکونیات                 | 170 |
| 8  | مثلث کے ایک ضلع کا سایہ | 201 |
| 9  | دائرے کا وتر            | 209 |
| 10 | دائرے پر مماس           | 221 |
| 11 | وتر اور قوسیں           | 235 |
| 12 | قطعہ دائرہ میں زاویہ    | 245 |
| 13 | عملی جیومیٹری۔ دائرے    | 255 |
| ❖  | جوابات                  | 277 |
| ❖  | علامات اور محققات       | 297 |
| ❖  | لوگر تھم کا جدول        | 299 |
| ❖  | اصطلاحات                | 303 |
| ❖  | انڈیکس                  | 314 |
| ❖  | حوالہ جات               | 318 |

کبیر سٹریٹ، اُردو بازار، لاہور  
042-37353510, 37248129

علمی کتاب خانہ

تیار کردہ

| تاریخ اشاعت | ایڈیشن | طباعت | تعداد اشاعت | قیمت   |
|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| مارچ 2019ء  | اول    | اول   | 80,000      | 149.00 |



طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

دو درجی مساوات کی تعریف کرنا۔

ایک متغیر میں دو درجی مساوات کو بذریعہ تجزیہ حل کرنا۔

ایک متغیر میں دو درجی مساوات کو تکمیل مربع سے حل کرنا۔

بذریعہ تکمیل مربع، دو درجی فارمولا اخذ کرنا۔

دو درجی فارمولا سے دو درجی مساوات کو حل کرنا۔

قسم کی مساواتوں کو دو درجی مساواتوں میں تبدیل کر کے حل کرنا۔  $ax^4 + bx^2 + c = 0$

قسم کی مساواتوں کو حل کرنا۔  $a p(x) + \frac{b}{p(x)} = c$

قسم کی معکوس  $a \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b \left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0$  یا  $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$

مساواتوں کو حل کرنا۔

قوت نمائی مساواتوں جن کے متغیر قوت نماؤں میں ہوں، حل کرنا۔

قسم کی مساواتوں کو جبکہ  $a + b = c + d$  حل کرنا۔  $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = k$

مندرجہ ذیل جذری مساواتوں کو حل کرنا۔

$$\sqrt{ax + b} = cx + d, \quad (i)$$

$$\sqrt{x + a} + \sqrt{x + b} = \sqrt{x + c}, \quad (ii)$$

$$\sqrt{x^2 + px + m} + \sqrt{x^2 + px + n} = q \quad (iii)$$

## 1.1 دو درجی مساوات (Quadratic Equation):

ایک مساوات جو کہ نامعلوم متغیر مقدار کے مربع پر مشتمل ہو مگر اسکی قوت دو سے زیادہ نہ ہو، دو درجی مساوات کہلاتی ہے۔

$$x^2 + bx + c = 0 \text{ متغیر میں دو درجی مساوات}$$

جبکہ  $a \neq 0$  اور  $a, b, c$  حقیقی اعداد ہوں۔ دو درجی مساوات کی عام یا معیاری فارم (شکل) کہلاتی ہے۔

یہاں  $x^2$  کا عددی سر  $a$  ہے،  $x$  کا عددی سر  $b$  ہے اور  $c$  مستقل مقدار ہے۔

یاد رہے کہ اگر  $ax^2 + bx + c = 0$  میں  $a = 0$  ہو تو مندرجہ بالا مساوات یک درجی مساوات  $bx + c = 0$  بن جاتی ہے۔

مساواتیں  $3x^2 + 4x = 5$  اور  $x^2 - 7x + 6 = 0$  دو درجی مساواتوں کی مثالیں ہیں۔

$$x^2 - 7x + 6 = 0 \text{ معیاری فارم میں ہے لیکن}$$

$$3x^2 + 4x = 5 \text{ معیاری فارم میں نہیں۔}$$

سرگرمی:

کوئی سی دو پور دو درجی مساواتیں لکھیں۔

دو درجی مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  میں اگر  $b = 0$

ہو تو یہ خالص (پور) دو درجی مساوات کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر

$$x^2 - 16 = 0 \text{ اور } 4x^2 = 7 \text{ پور دو درجی مساواتیں ہیں۔}$$

## 1.2 دو درجی مساواتوں کا حل (Solution of Quadratic Equations):

دو درجی مساوات کا حل سیٹ معلوم کرنے کے لیے درج ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔

(i) تجزی (ii) مربع مکمل کرنے سے

### 1.2(i) حل بذریعہ تجزی (Solution by Factorization)

اس طریقہ میں دو درجی مساوات کو معیاری فارم میں لکھتے ہیں جیسے

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (i)$$

اگر مساوات (i) کے لیے دو اعداد  $r$  اور  $s$  معلوم کیے جاسکتے ہوں جبکہ  $r + s = b$  اور  $rs = ac$  ہو تو

$ax^2 + bx + c$  کے دو یک درجی فیکٹرز (اجزائے ضربی) معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

طریقہ کار کی وضاحت مثال 1 میں کی گئی ہے۔

**مثال 1:** دو درجی مساوات  $3x^2 - 6x = x + 20$  کو بذریعہ تجزی حل کریں۔

$$3x^2 - 6x = x + 20 \quad (i)$$

**حل:**

مساوات (i) کی معیاری شکل یوں ہے۔

$$3x^2 - 7x - 20 = 0 \quad (ii)$$



یہاں  $ac = 3 \times -20 = -60$  اور  $c = -20$ ,  $b = -7$ ,  $a = 3$

کیونکہ  $-12 \times 5 = -60$  اور  $-12 + 5 = -7$

لہذا مساوات (ii) کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے۔

$$3x^2 - 12x + 5x - 20 = 0$$

$$3x(x - 4) + 5(x - 4) = 0$$

$$(x - 4)(3x + 5) = 0$$

$$x - 4 = 0 \quad \text{یا} \quad 3x + 5 = 0$$

$$\Rightarrow x = 4 \quad \text{یا} \quad 3x = -5 \Rightarrow x = -\frac{5}{3}$$

یعنی  $x = -\frac{5}{3}, 4$  دو درجی مساوات (ii) کے حل ہیں۔

پس حل سیٹ  $\left\{-\frac{5}{3}, 4\right\}$  ہے۔

**مثال 2:**  $5x^2 = 30x$  کو بذریعہ تجزیہ حل کریں۔

$$5x^2 = 30x$$

**حل:**

$$5x^2 - 30x = 0$$

$$5x(x - 6) = 0$$

$$\Rightarrow 5x = 0 \quad \text{یا} \quad x - 6 = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \text{یا} \quad x = 6$$

$x = 0, 6$  دو درجی مساوات کے حل ہیں۔

پس حل سیٹ  $\{0, 6\}$  ہے۔

**1.2(ii) حل بذریعہ تکمیل مربع (Solution by Completing Square)**

دو درجی مساوات بذریعہ تکمیل مربع کے حل کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں سے کی گئی ہے۔

**مثال 1:** مساوات  $x^2 - 3x - 4 = 0$  کو بذریعہ تکمیل مربع حل کیجیے۔

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

(i)

**حل:**

مستقل مقدار 4 کو دائیں طرف لے جانے سے

$$x^2 - 3x = 4$$

(ii)

$x$  کے عددی سر کے  $\frac{1}{2}$  کے مربع یعنی  $\left(\frac{-3}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2} \times (-3)\right)^2$  کو مساوات (ii) کے طرفین میں جمع کرنے سے

$$x^2 - 3x + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = 4 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = 4 + \frac{9}{4} = \frac{16+9}{4}$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

یا

اوپر دی گئی مساوات کا دونوں اطراف سے جذر لینے سے

$$\sqrt{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2} = \pm \sqrt{\frac{25}{4}}$$

$$\Rightarrow x - \frac{3}{2} = \pm \frac{5}{2} \quad \text{یا} \quad x = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = \frac{3+5}{2} = \frac{8}{2} = 4 \quad \text{یا} \quad x = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = \frac{3-5}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

4 اور -1 دی ہوئی مساوات کے حل ہیں۔ لہذا حل سیٹ  $\{-1, 4\}$  ہے۔

**مثال 2:** مساوات  $2x^2 - 5x - 3 = 0$  کو بذریعہ تکمیل مربع حل کیجیے۔

**حل:**

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

$$x^2 - \frac{5}{2}x - \frac{3}{2} = 0$$

ہر رقم کو 2 پر تقسیم کرنے سے

$-\frac{3}{2}$  کو دائیں طرف لے جانے سے

$$x^2 - \frac{5}{2}x = \frac{3}{2}$$

(i)

$x$  کے عددی سر کو  $\frac{1}{2}$  سے ضرب دی یعنی  $-\frac{5}{4}$

اب  $\left(-\frac{5}{4}\right)^2$  کو مساوات (i) کے طرفین میں جمع کرنے سے

$$x^2 - \frac{5}{2}x + \left(-\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{3}{2} + \left(-\frac{5}{4}\right)^2$$

$$\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 = \frac{3}{2} + \frac{25}{16} = \frac{24+25}{16} \quad \text{یعنی}$$

$$\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 = \frac{49}{16}$$

یا

اوپر دی گئی مساوات کے طرفین کا جذر لینے سے

$$\Rightarrow \sqrt{\left(x - \frac{5}{4}\right)^2} = \pm \sqrt{\frac{49}{16}}$$

$$x - \frac{5}{4} = \pm \frac{7}{4}$$



$$\begin{aligned}
 & \text{یعنی} \quad x - \frac{5}{4} = -\frac{7}{4} \quad \text{یا} \quad x - \frac{5}{4} = \frac{7}{4} \\
 \Rightarrow & \quad x = -\frac{7}{4} + \frac{5}{4} \quad \text{یا} \quad x = \frac{7}{4} + \frac{5}{4} \\
 & \quad = \frac{-7+5}{4} = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2} \quad \text{یا} \quad = \frac{7+5}{4} = \frac{12}{4} = 3 \\
 & \quad 3, -\frac{1}{2} \text{ دی ہوئی مساوات کے حل ہیں۔} \\
 & \quad \text{پس حل سیٹ } \left\{-\frac{1}{2}, 3\right\} \text{ ہے۔}
 \end{aligned}$$

## مشق 1.1

1- مندرجہ ذیل مساواتوں کو معیاری فارم میں لکھیے اور پھر دو درجی مساوات کی نشان دہی کیجیے۔

(i)  $(x+7)(x-3) = -7$

(ii)  $\frac{x^2+4}{3} - \frac{x}{7} = 1$

(iii)  $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = 6$

(iv)  $\frac{x+4}{x-2} - \frac{x-2}{x} + 4 = 0$

(v)  $\frac{x+3}{x+4} - \frac{x-5}{x} = 1$

(vi)  $\frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} = \frac{25}{12}$

2- بذریعہ تجبزی حل کیجیے۔

(i)  $x^2 - x - 20 = 0$

(ii)  $3y^2 = y(y-5)$

(iii)  $4 - 32x = 17x^2$

(iv)  $x^2 - 11x = 152$

(v)  $\frac{x+1}{x} + \frac{x}{x+1} = \frac{25}{12}$

(vi)  $\frac{2}{x-9} = \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-4}$

3- مندرجہ ذیل مساواتوں کو مکمل مربع سے حل کیجیے۔

(i)  $7x^2 + 2x - 1 = 0$

(ii)  $ax^2 + 4x - a = 0, a \neq 0$

(iii)  $11x^2 - 34x + 3 = 0$

(iv)  $lx^2 + mx + n = 0, l \neq 0$

(v)  $3x^2 + 7x = 0$

(vi)  $x^2 - 2x - 195 = 0$

(vii)  $-x^2 + \frac{15}{2} = \frac{7}{2}x$

(viii)  $x^2 + 17x + \frac{33}{4} = 0$

(ix)  $4 - \frac{8}{3x+1} = \frac{3x^2+5}{3x+1}$

(x)  $7(x+2a)^2 + 3a^2 = 5a(7x+23a)$

### 1.3 دو درجی فارمولا (Quadratic Formula)

1.3(i) دو درجی فارمولا کو بذریعہ تکمیل مربع اخذ کرنا:

Derivation of quadratic formula by using completing square method:

دو درجی مساوات کی معیاری شکل  $ax^2 + bx + c = 0$  ہے جبکہ  $a \neq 0$   
مساوات کی ہر رقم کو  $a$  پر تقسیم کرنے سے ہم حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$\frac{c}{a}$  کو دائیں طرف لے جانے سے

$\left(\frac{b}{2a}\right)^2$  کو دونوں اطراف میں جمع کرنے سے

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

یا

$$\sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

طرفین کا جذر لینے سے

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \Rightarrow x = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

یا

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, a \neq 0 \text{ پس بطور دو درجی فارمولا جانا جاتا ہے۔}$$

1.3(ii) دو درجی فارمولا کا استعمال (Use of Quadratic Formula)

دو درجی فارمولا ہر قسم کی مساواتوں کو حل کرنے کے لیے مفید ہے جن کی تجزی ہو سکتی ہو یا نہ ہو سکتی ہو۔ دو درجی

فارمولا کی مدد سے دو درجی مساوات کو حل کرنے کی وضاحت مثالوں سے کی گئی ہے۔

**مثال 1:** دو درجی مساوات  $2 + 9x = 5x^2$  کو بذریعہ دو درجی فارمولا حل کریں۔

$$2 + 9x = 5x^2$$

**حل:**

دی ہوئی مساوات کو معیاری صورت میں یوں لکھا جاتا ہے۔

$$5x^2 - 9x - 2 = 0 \quad ; \quad 5x^2 + (-9)(x) + (-2) = 0$$

دو درجی مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  سے موازنہ کرنے سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ

$$a = 5, b = -9, c = -2$$

دو درجی فارمولا  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  میں  $a, b, c$  کی قیمتیں درج کرنے سے



$$x = \frac{-(-9) \pm \sqrt{(-9)^2 - 4(5)(-2)}}{2(5)}$$

$$x = \frac{9 \pm \sqrt{81 + 40}}{10} = \frac{9 \pm \sqrt{121}}{10} = \frac{9 \pm 11}{10}$$

$$x = \frac{9 + 11}{10} \quad \text{یا} \quad x = \frac{9 - 11}{10}$$

$$x = \frac{20}{10} = 2 \quad \text{یا} \quad x = \frac{-2}{10} = -\frac{1}{5}$$

$2, -\frac{1}{5}$  دی ہوئی مساوات کے حل ہیں۔ پس حل سیٹ  $\{-\frac{1}{5}, 2\}$  ہے۔

**مثال 2:** دو درجی فارمولا کے استعمال سے مساوات  $\frac{2x+1}{x+2} - \frac{x-2}{x+4} = 0$  کو حل کیجیے۔

$$\frac{2x+1}{x+2} - \frac{x-2}{x+4} = 0$$

**حل:**

$$(2x+1)(x+4) - (x-2)(x+2) = 0$$

مختصر کرنے اور معیاری شکل میں لکھنے سے

$$2x^2 + 8x + x + 4 - (x^2 - 4) = 0$$

$$2x^2 + 9x + 4 - x^2 + 4 = 0$$

$$x^2 + 9x + 8 = 0$$

یا

$$c = 8, b = 9, a = 1 \quad \text{یہاں}$$

$$\text{فارمولا } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ کے استعمال کرنے سے}$$

$$x = \frac{-9 \pm \sqrt{(9)^2 - 4 \times 1 \times 8}}{2 \times 1}$$

$$= \frac{-9 \pm \sqrt{81 - 32}}{2} = \frac{-9 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{-9 \pm 7}{2}$$

$$\Rightarrow x = \frac{-9 + 7}{2} = \frac{-2}{2} = -1 \quad \text{یا} \quad x = \frac{-9 - 7}{2} = \frac{-16}{2} = -8$$

$-1, -8$  دی ہوئی مساوات کے حل ہیں۔ پس حل سیٹ  $\{-8, -1\}$  ہے۔

## 1.2 مشق

**1- مندرجہ ذیل مساواتوں کو دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجیے۔**

(i)  $2 - x^2 = 7x$

(ii)  $5x^2 + 8x + 1 = 0$

(iii)  $\sqrt{3}x^2 + x = 4\sqrt{3}$

(iv)  $4x^2 - 14 = 3x$

(v)  $6x^2 - 3 - 7x = 0$

(vi)  $3x^2 + 8x + 2 = 0$

$$(vii) \quad \frac{3}{x-6} - \frac{4}{x-5} = 1$$

$$(viii) \quad \frac{x+2}{x-1} - \frac{4-x}{2x} = 2\frac{1}{3}$$

$$(ix) \quad \frac{a}{x-b} + \frac{b}{x-a} = 2$$

$$(x) \quad -(l+m) - lx^2 + (2l+m)x = 0, l \neq 0$$

## 1.4 مساواتوں کو دو درجی فارم میں تبدیل کرنا

### (Equations reducible to quadratic form)

اب ہم مساواتوں کی مختلف اقسام کے بارے میں بحث کریں گے جنہیں دو درجی مساوات میں مناسب طریقے سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

$$(i) \quad ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad \text{قسم کی مساواتیں:}$$

مساوات  $ax^4 + bx^2 + c = 0$  میں  $x^2 = y$  اور  $x^4 = y^2$  تبدیل کرنے سے ہمیں  $y$  میں دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$\text{مثال 1: } x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \text{ کو حل کریں۔}$$

$$\text{حل: } x^4 - 13x^2 + 36 = 0$$

$$\text{فرض کیا کہ } x^2 = y \text{ تو } x^4 = y^2$$

مساوات (i) اس طرح بن جاتی ہے۔

$$y^2 - 13y + 36 = 0$$

$$\Rightarrow y^2 - 9y - 4y + 36 = 0$$

$$\Rightarrow y(y-9) - 4(y-9) = 0$$

$$\Rightarrow (y-9)(y-4) = 0$$

$$\Rightarrow y-9=0 \quad \text{یا} \quad y-4=0 \quad \text{یعنی}$$

$$\Rightarrow y=9 \quad \text{یا} \quad y=4$$

$$y = x^2 \text{ رکھنے سے}$$

$$x^2 = 9 \quad \text{یا} \quad x^2 = 4$$

$$\Rightarrow x = \pm 3 \quad \text{یا} \quad x = \pm 2$$

اس لیے حل سیٹ  $\{\pm 2, \pm 3\}$  ہے۔



$$ap(x) + \frac{b}{p(x)} = c \quad (ii)$$

**مثال 2:**  $2(2x-1) + \frac{3}{2x-1} = 5$  مساوات کو حل کریں۔

**حل:** (i)  $2(2x-1) + \frac{3}{2x-1} = 5$

فرض کیا کہ  $2x-1 = y$

تب مساوات (i) اس طرح بن جاتی ہے۔

$$2y + \frac{3}{y} = 5 \quad \text{یا} \quad 2y^2 + 3 = 5y$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 5y + 3 = 0$$

$$y = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 2 \times 3}}{2 \times 2}$$

دو درجی فارمولا استعمال کرنے سے

$$= \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{4} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{4} = \frac{5 \pm 1}{4}$$

$$y = \frac{5+1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \quad \text{یا} \quad y = \frac{5-1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

ہم حاصل کرتے ہیں  $y = \frac{3}{2}$  جب

$$2x-1 = \frac{3}{2}$$

$$(\because y = 2x-1)$$

$$\Rightarrow 2x = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \frac{5}{4}$$

جب  $y = 1$

$$2x-1 = 1$$

$$(\because y = 2x-1)$$

$$\Rightarrow 2x = 1 + 1 = 2 \Rightarrow x = 1.$$

پس حل سیٹ  $\left\{1, \frac{5}{4}\right\}$  ہے۔

**معکوس مساواتیں:** (iii)

$$a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0 \quad \text{یا} \quad ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0 \quad \text{مساوات}$$

معکوس مساوات کہلاتی ہے اگر یہ  $x$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  درج کرنے سے تبدیل نہ ہو۔

$$ax^4 - bx^3 + cx^2 - bx + a = 0 \quad \text{میں } x \text{ کی جگہ } \frac{1}{x} \text{ درج کرنے سے}$$

$$a\left(\frac{1}{x}\right)^4 - b\left(\frac{1}{x}\right)^3 + c\left(\frac{1}{x}\right)^2 - b\left(\frac{1}{x}\right) + a = 0$$

جس کو مختصر کرنے سے ہمیں وہی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$a - bx + cx^2 - bx^3 + ax^4 = 0$$

پس  $ax^4 - bx^3 + cx^2 - bx + a = 0$  معکوس مساوات ہے۔

معکوس مساوات کو حل کرنے کے طریقہ کی درج ذیل مثال سے وضاحت کی گئی ہے۔

**مثال 3:** مساوات  $2x^4 - 5x^3 - 14x^2 - 5x + 2 = 0$  کو حل کریں۔

$$2x^4 - 5x^3 - 14x^2 - 5x + 2 = 0$$

**حل:**

$$\frac{2x^4}{x^2} - \frac{5x^3}{x^2} - \frac{14x^2}{x^2} - \frac{5x}{x^2} + \frac{2}{x^2} = 0$$

ہر رقم کو  $x^2$  پر تقسیم کرنے سے

$$2x^2 - 5x - 14 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2} = 0$$

$$2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 5\left(x + \frac{1}{x}\right) - 14 = 0$$

(i)

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2 \text{ تو } x + \frac{1}{x} = y \text{ فرض کیا کہ}$$

پس مساوات (i) اس طرح بن جاتی ہے

$$2(y^2 - 2) - 5y - 14 = 0 \quad \text{یا} \quad 2y^2 - 4 - 5y - 14 = 0$$

$$2y^2 - 5y - 18 = 0$$

$$2y^2 - 9y + 4y - 18 = 0 \quad \text{یا} \quad y(2y - 9) + 2(2y - 9) = 0$$

$$\Rightarrow (2y - 9)(y + 2) = 0$$

$$2y - 9 = 0$$

یا

$$y + 2 = 0$$

$$y = x + \frac{1}{x}$$

کیونکہ

$$2\left(x + \frac{1}{x}\right) - 9 = 0$$

یا

$$x + \frac{1}{x} + 2 = 0$$

$$2x^2 - 9x + 2 = 0$$

یا

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

دو درجی فارمولا کے استعمال سے

$$x = \frac{-(-9) \pm \sqrt{(-9)^2 - 4 \times 2 \times 2}}{2 \times 2}$$

یا

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{(2)^2 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times 1}$$



$$\Rightarrow x = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 16}}{4}$$

$$= \frac{9 \pm \sqrt{65}}{4}$$

$$یا \quad x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4}}{2}$$

$$یا \quad x = \frac{-2 \pm 0}{2} \Rightarrow x = -1, -1$$

پس حل سیٹ  $\left\{-1, \frac{9 - \sqrt{65}}{4}, \frac{9 + \sqrt{65}}{4}\right\}$  ہے۔

#### (iv) قوت نمائی مساواتیں:

قوت نمائی مساواتوں میں متغیر قوت نماؤں میں ہوتا ہے۔

اس طرح کی مساواتوں کو حل کرنے کے طریقے کی وضاحت درج ذیل مثال سے کی گئی ہے۔

**مثال 4:** مساوات  $5^{1+x} + 5^{1-x} = 26$  حل کریں۔

$$5^{1+x} + 5^{1-x} = 26$$

**حل:**

$$5^1 \cdot 5^x + 5^1 \cdot 5^{-x} = 26 \quad یا \quad 5 \cdot 5^x + \frac{5}{5^x} - 26 = 0 \quad (i)$$

فرض کیا کہ  $5^x = y$  تو مساوات (i) اس طرح بن جاتی ہے۔

$$5y + \frac{5}{y} - 26 = 0$$

$$5y^2 + 5 - 26y = 0 \quad یا \quad 5y^2 - 26y + 5 = 0$$

$$5y^2 - 25y - y + 5 = 0$$

$$5y(y - 5) - 1(y - 5) = 0$$

$$(y - 5)(5y - 1) = 0$$

$$y - 5 = 0 \quad یا \quad 5y - 1 = 0, \quad یعنی$$

$$y = 5 \quad یا \quad 5y = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{5}$$

$$y = 5^x \quad درج کرنے سے$$

$$5^x = 5^1 \quad یا \quad 5^x = 5^{-1} \Rightarrow x = 1 \quad یا \quad x = -1$$

پس حل سیٹ  $\{\pm 1\}$  ہے۔

#### (v) مساواتوں کی قسم:

$$a + b = c + d \quad جبکہ \quad (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = k$$

**مثال 5:**  $(x - 1)(x + 2)(x + 8)(x + 5) = 19$  حل کریں۔

$$(x-1)(x+2)(x+8)(x+5) = 19$$

$$[(x-1)(x+8)][(x+2)(x+5)] - 19 = 0 \quad (\because -1+8=2+5) \quad \text{یا}$$

$$(x^2 + 7x - 8)(x^2 + 7x + 10) - 19 = 0 \quad (i)$$

$$x^2 + 7x = y \quad \text{فرض کیا کہ}$$

مساوات (i) اس طرح بن جاتی ہے۔

$$(y-8)(y+10) - 19 = 0$$

$$y^2 + 2y - 80 - 19 = 0$$

$$y^2 + 2y - 99 = 0$$

$$y^2 + 11y - 9y - 99 = 0$$

$$y(y+11) - 9(y+11) = 0$$

$$(y+11)(y-9) = 0$$

$$y+11=0$$

یا

$$y-9=0$$

یعنی

درج کرنے سے

$$y = x^2 + 7x$$

$$x^2 + 7x - 9 = 0$$

یا

$$x^2 + 7x + 11 = 0$$

پس

دو درجی فارمولہ کے طریقہ سے حل کرنے سے

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{(7)^2 - 4(1)(-9)}}{2(1)} \\ = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 36}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{85}}{2}$$

یا

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{(7)^2 - 4(1)(11)}}{2(1)} \\ = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 44}}{2} = \frac{-7 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{پس حل سیٹ } \left\{ \frac{-7 \pm \sqrt{5}}{2}, \frac{-7 \pm \sqrt{85}}{2} \right\} \text{ ہے۔}$$

### مشق 1.3

درج ذیل مساواتوں کو حل کیجیے۔

$$1. \quad 2x^4 - 11x^2 + 5 = 0$$

$$2. \quad 2x^4 = 9x^2 - 4$$

$$3. \quad 5x^{1/2} = 7x^{1/4} - 2$$

$$4. \quad x^{2/3} + 54 = 15x^{1/3}$$

$$5. \quad 3x^{-2} + 5 = 8x^{-1}$$

$$6. \quad (2x^2 + 1) + \frac{3}{2x^2 + 1} = 4$$

$$7. \quad \frac{x}{x-3} + 4\left(\frac{x-3}{x}\right) = 4$$

$$8. \quad \frac{4x+1}{4x-1} + \frac{4x-1}{4x+1} = 2\frac{1}{6}$$



$$9. \frac{x-a}{x+a} - \frac{x+a}{x-a} = \frac{7}{12}$$

$$10. x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$11. 2x^4 + x^3 - 6x^2 + x + 2 = 0$$

$$12. 4 \cdot 2^{2x+1} - 9 \cdot 2^x + 1 = 0$$

$$13. 3^{2x+2} = 12 \cdot 3^x - 3$$

$$14. 2^x + 64 \cdot 2^{-x} - 20 = 0$$

$$15. (x+1)(x+3)(x-5)(x-7) = 192$$

$$16. (x-1)(x-2)(x-8)(x+5) + 360 = 0$$

## 1.5 ریڈیکل (جذری) مساواتیں:

وہ مساوات جس میں اکیلے جملے یا جملوں پر جذری علامت ہو، جذری مساوات کہلاتی ہے۔

$$\sqrt{x+3} = x+1 \quad \text{اور} \quad \sqrt{x-1} = \sqrt{x-2} + 1 \quad \text{مثال کے طور پر}$$

### 1.5(i) $\sqrt{ax+b} = cx+d$ قسم کی مساوات:

**مثال 1:** مساوات  $\sqrt{3x+7} = 2x+3$  کو حل کریں۔

$$\sqrt{3x+7} = 2x+3$$

(i)

**حل:**

مساوات (i) کے دونوں اطراف کا مربع لینے سے

$$(\sqrt{3x+7})^2 = (2x+3)^2$$

$$3x+7 = 4x^2 + 12x + 9$$

یا

اوپر دی ہوئی مساوات کو مختصر کرنے سے

$$4x^2 + 9x + 2 = 0$$

دو درجی فارمولا استعمال کرنے سے

$$x = \frac{-9 \pm \sqrt{(9)^2 - 4 \times 4 \times 2}}{2 \times 4}$$

$$x = \frac{-9 \pm \sqrt{81 - 32}}{8} = \frac{-9 \pm \sqrt{49}}{8} = \frac{-9 \pm 7}{8}$$

$$x = \frac{-9+7}{8} = \frac{-2}{8} = \frac{-1}{4} \quad \text{اس لیے}$$

$$x = \frac{-9-7}{8} = \frac{-16}{8} = -2 \quad \text{یا}$$

**پڑتال:** مساوات (i) میں  $x = -\frac{1}{4}$  درج کرنے سے

$$\sqrt{3\left(-\frac{1}{4}\right) + 7} = 2\left(-\frac{1}{4}\right) + 3 \Rightarrow \sqrt{\frac{-3+28}{4}} = -\frac{1}{2} + 3 \Rightarrow \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$$

مساوات (i) میں  $x = -2$  درج کرنے سے

$$\sqrt{3(-2) + 7} = 2(-2) + 3 \Rightarrow \sqrt{1} = -1$$

جو کہ غلط ہے

پڑتال کرنے سے معلوم ہوا کہ  $x = -2$  مساوات (i) کو درست ثابت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ایک فالتو حل ہے۔  
پس حل سیٹ  $\left\{-\frac{1}{4}\right\}$  ہے۔

**1.5(ii)  $\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b} = \sqrt{x+c}$  قسم کی مساوات**

**مثال 2:** مساوات  $\sqrt{x+3} + \sqrt{x+6} = \sqrt{x+11}$  کو حل کریں۔

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{x+6} = \sqrt{x+11} \quad (i)$$

**حل:**

مساوات (i) کے دونوں اطراف کا مربع لینے سے

$$x+3 + x+6 + 2(\sqrt{x+3})(\sqrt{x+6}) = x+11$$

$$2\sqrt{x^2+9x+18} = -x+2 \quad (ii) \quad \text{یا}$$

مساوات (ii) کے دونوں اطراف کا مربع لینے سے

$$4(x^2+9x+18) = x^2 - 4x + 4$$

$$3x^2 + 40x + 68 = 0 \quad \text{یا}$$

دو درجی فارمولا استعمال کرنے سے

$$x = \frac{-40 \pm \sqrt{(40)^2 - 4 \times 3 \times 68}}{2 \times 3} = \frac{-40 \pm \sqrt{1600 - 816}}{6}$$

$$= \frac{-40 \pm \sqrt{784}}{6} = \frac{-40 \pm 28}{6}$$

$$x = \frac{-40+28}{6} = \frac{-12}{6} = -2 \quad \text{یا} \quad x = \frac{-40-28}{6} = \frac{-68}{6} = \frac{-34}{3} \quad \text{یعنی}$$

**پڑتال:** مساوات (i) میں  $x = \frac{-34}{3}$  درج کرنے سے

$$\sqrt{\frac{-34}{3} + 3} + \sqrt{\frac{-34}{3} + 6} = \sqrt{\frac{-34}{3} + 11}$$

$$\sqrt{\frac{-34+9}{3}} + \sqrt{\frac{-34+18}{3}} = \sqrt{\frac{-34+33}{3}} \quad \text{یا}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{25}{3} \times (-1)} + \sqrt{\frac{16}{3} \times (-1)} = \sqrt{\frac{1}{3} \times (-1)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{25}{3}} \cdot \sqrt{-1} + \sqrt{\frac{16}{3}} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt{-1}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{\sqrt{3}}i + \frac{4}{\sqrt{3}}i = \frac{1}{\sqrt{3}}i$$

جو کہ درست نہیں چونکہ  $i = \sqrt{-1}$

کیونکہ  $\frac{-34}{3}$  ایک فالتو حل ہے۔ لہذا حل سیٹ  $\{-2\}$  ہے۔



$$1.5(iii) \quad \sqrt{x^2 + px + m} + \sqrt{x^2 + px + n} = q \quad \text{قسم کی مساواتیں:}$$

**مثال 3:** مساوات  $\sqrt{x^2 - 3x + 36} - \sqrt{x^2 - 3x + 9} = 3$  کو حل کریں۔

**حل:**

$$\sqrt{x^2 - 3x + 36} - \sqrt{x^2 - 3x + 9} = 3$$

$$x^2 - 3x = y \quad \text{فرض کیا کہ}$$

$$\sqrt{y + 36} - \sqrt{y + 9} = 3 \quad \text{تب}$$

دونوں اطراف کا مربع لینے سے

$$y + 36 + y + 9 - 2(\sqrt{y + 36})(\sqrt{y + 9}) = 9$$

$$2y + 45 - 2\sqrt{(y + 36)(y + 9)} = 9$$

$$-2\sqrt{y^2 + 45y + 324} = -2y - 36 \quad \text{یا} \quad -2\sqrt{y^2 + 45y + 324} = -2(y + 18)$$

$$\Rightarrow \sqrt{y^2 + 45y + 324} = y + 18$$

دوبارہ دونوں اطراف کا مربع لینے سے

$$y^2 + 45y + 324 = y^2 + 36y + 324$$

$$9y = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$x^2 - 3x = 0 \quad \text{کیونکہ} \quad -x^2 - 3x = y$$

$$\Rightarrow x(x - 3) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{یا} \quad x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 \quad \text{یعنی}$$

$x = 0, 3$  مساوات کے حل ہیں۔

پس حل سیٹ  $\{0, 3\}$  ہے۔

## مشق 1.4

درج ذیل مساواتوں کو حل کریں۔

$$1. \quad 2x + 5 = \sqrt{7x + 16}$$

$$2. \quad \sqrt{x + 3} = 3x - 1$$

$$3. \quad 4x = \sqrt{13x + 14} - 3$$

$$4. \quad \sqrt{3x + 100} - x = 4$$

$$5. \quad \sqrt{x + 5} + \sqrt{x + 21} = \sqrt{x + 60}$$

$$6. \quad \sqrt{x + 1} + \sqrt{x - 2} = \sqrt{x + 6}$$

$$7. \quad \sqrt{11 - x} - \sqrt{6 - x} = \sqrt{27 - x}$$

$$8. \quad \sqrt{4a + x} - \sqrt{a - x} = \sqrt{a}$$

$$9. \quad \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + x - 1} = 1$$

$$10. \quad \sqrt{x^2 + 3x + 8} + \sqrt{x^2 + 3x + 2} = 3$$

$$11. \quad \sqrt{x^2 + 3x + 9} + \sqrt{x^2 + 3x + 4} = 5$$

## متفرق مشق 1

کثیر الانتخابی سوالات

1- دیے گئے سوالات کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست کے لیے (✓) لگائیں۔  
(i) دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 \quad (b) \quad bx + c = 0, b \neq 0 \quad (a)$$

$$ax^2 = 0, a \neq 0 \quad (d) \quad ax^2 = bx, a \neq 0 \quad (c)$$

(ii) دو درجی معیاری مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  میں رقوموں کی تعداد ہے۔

$$4 \quad (d) \quad 3 \quad (c) \quad 2 \quad (b) \quad 1 \quad (a)$$

(iii) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟

$$4 \quad (d) \quad 3 \quad (c) \quad 2 \quad (b) \quad 1 \quad (a)$$

(iv) دو درجی فارمولا ہے۔

$$x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (b) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (a)$$

$$x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a} \quad (d) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a} \quad (c)$$

(v)  $x^2 - 15x + 56$  کے دو یک درجی فیکٹرز ہیں۔

$$(x - 8) \text{ اور } (x + 7) \quad (b) \quad (x + 8) \text{ اور } (x - 7) \quad (a)$$

$$(x + 8) \text{ اور } (x + 7) \quad (d) \quad (x - 8) \text{ اور } (x - 7) \quad (c)$$

(vi) وہ مساوات جس میں  $x$  کی جگہ  $\frac{1}{x}$  درج کرنے سے تبدیل نہ ہو، کہلاتی ہے۔

$$\text{معکوس مساوات} \quad (b) \quad \text{قوت نمائی مساوات} \quad (a)$$

$$\text{کوئی نہیں} \quad (d) \quad \text{جزری مساوات} \quad (c)$$

(vii) مساوات  $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$  کی قسم ہے۔

$$\text{جزری مساوات} \quad (b) \quad \text{قوت نمائی مساوات} \quad (a)$$

$$\text{کوئی نہیں} \quad (d) \quad \text{معکوس مساوات} \quad (c)$$



(viii) مساوات  $4x^2 - 16 = 0$  کا حل سیٹ ہے۔

(a)  $\{\pm 4\}$  (b)  $\{4\}$

(c)  $\{\pm 2\}$  (d)  $\{\pm 2\}$

(ix) مساوات  $2x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 3x + 2 = 0$  کہلاتی ہے۔

(a) معکوس مساوات (b) جذری مساوات

(c) قوت نمائی مساوات (d) کوئی نہیں

**-2** درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔

(i) حل کریں  $x^2 + 2x - 2 = 0$  (ii) بذریعہ تجزی حل کریں  $5x^2 = 15x$

(iii) مساوات کی معیاری شکل میں لکھیں  $\frac{1}{x+4} + \frac{1}{x-4} = 3$

(iv) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقوں کے نام لکھیں۔

(v) حل کریں  $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$  (vi) حل کریں  $\sqrt{3x+18} = x$

(vii) دو درجی مساوات کی تعریف لکھیں۔ (viii) معکوس مساوات کی تعریف لکھیں۔

(ix) قوت نمائی مساوات کی تعریف لکھیں۔ (x) جذری مساوات کی تعریف لکھیں۔

**-3** خالی جگہ پُر کریں۔

(i) دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے \_\_\_\_\_۔

(ii) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں \_\_\_\_\_۔

(iii) دو درجی فارمولہ معلوم کرنے کے طریقہ کا نام ہے \_\_\_\_\_۔

(iv) مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$ ,  $a \neq 0$  کا حل ہے \_\_\_\_\_۔

(v)  $25x^2 - 1 = 0$  کا حل سیٹ ہے \_\_\_\_\_۔

(vi)  $2^{2x} - 3 \cdot 2^x + 5 = 0$  قسم کی مساوات کہلاتی ہے \_\_\_\_\_ مساوات۔

(vii)  $x^2 - 9 = 0$  مساوات کا حل سیٹ ہے \_\_\_\_\_۔

(viii)  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$  قسم کی مساوات کہلاتی ہے \_\_\_\_\_ مساوات۔

(ix) مساوات کا وہ حل جو اس مساوات کو صحیح ثابت نہ کرے، \_\_\_\_\_ حل کہلاتا ہے۔

(x) ایک مساوات جس میں متغیر والا جملہ \_\_\_\_\_ کے نیچے ہو، جذری مساوات کہلاتی ہے۔

## خلاصہ

ایک مساوات جو کہ نامعلوم مقدار متغیر کے مربع پر مشتمل ہو مگر دو سے زیادہ طاقت نہ رکھے، ایک دو درجی مساوات یا دوسرے درجے کی مساوات کہلاتی ہے۔

متغیر (variable) میں دوسرے درجے کی مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  جبکہ  $a, b, c$  حقیقی اعداد ہوں اور  $a \neq 0$  عام یا معیاری دو درجی مساوات کہلاتی ہے۔

ایک مساوات معکوس مساوات کہلاتی ہے اگر یہ تبدیل نہ ہو جب  $x$  کو  $\frac{1}{x}$  میں تبدیل کیا جائے۔

قوت نمائی (exponential) مساواتوں میں متغیر قوت نماؤں میں ہوتا ہے۔

ایک مساوات جس میں جملہ (expression) جذری علامت کے نیچے ہو، جذری مساوات کہلاتی ہے۔

مساوات  $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$  کے لیے دو درجی فارمولا  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  ہوتا ہے۔

دو درجی مساواتوں کو مندرجہ ذیل طریقوں سے حل کیا جاتا ہے

تکمیل مربع

(ii)

(i) تجزی

(iii) دو درجی فارمولا



# دو درجی مساواتوں کا نظریہ

## (THEORY OF QUADRATIC EQUATIONS)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

✓ دو درجی جملے  $ax^2 + bx + c$  کے فرق کنندہ  $b^2 - 4ac$  (Discreminant) کی تعریف کرنا۔

✓ دی ہوئی دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کرنا۔

✓ دو درجی مساوات کے فرق کنندہ سے روٹس کی اقسام (Nature the Roots) پر بحث کرنا۔

✓ دی ہوئی دو درجی مساوات کے روٹس کی اقسام معلوم کرنا اور مساوات حل کر کے نتیجہ کی تصدیق کرنا۔

✓ دی ہوئی دو درجی مساوات میں دی ہوئی نامعلوم مقدار کی قیمت دریافت کرنا جبکہ اس کے روٹس کی اقسام دی ہوئی ہوں۔

✓ اکائی کا جذر الملعب (Cube roots of units) معلوم کرنا۔

✓ اکائی کے کمپلیکس (Complex) جذر الملعب کی پہچان بطور  $\omega$  اور  $\omega^2$  کرنا۔

✓ اکائی کے جذر الملعب کی خصوصیات (Properties) ثابت کرنا۔

✓ اکائی کے جذر الملعب کی خصوصیات کے استعمال سے مناسب سوالوں کو حل کرنا۔

✓ دو درجی مساوات کے روٹس (Roots) اور عددی سروں (Co-efficients) کا تعلق معلوم کرنا۔

✓ دی ہوئی دو درجی مساوات کو حل کیے بغیر اس کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کرنا۔

✓ دی ہوئی دو درجی مساوات میں نامعلوم مقدار یا مقداروں کی قیمت / قیمتیں معلوم کرنا۔ جبکہ

• روٹس کا مجموعہ اور روٹس کے حاصل ضرب کا ضعف (Multiple) برابر ہوں۔

• روٹس کے مربعوں کا مجموعہ دیے ہوئے عدد کے برابر ہو۔

• روٹس کا فرق دیے ہوئے عدد کے برابر ہو۔

• روٹس کے دیے ہوئے تعلق (Relation) کو ثابت کرنا۔

(مثلاً تعلق  $2\alpha + 5\beta = 7$ ، جبکہ  $\alpha$  اور  $\beta$  دی ہوئی مساوات کے روٹس ہوں)

• روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب دونوں کسی دیے ہوئے عدد کے برابر ہوں۔

کھ دو درجی مساوات کے روٹس کے متشاکل تفاعل یا سمیٹرک تفاعل (Symmetric function) کی تعریف کرنا۔

کھ دو درجی مساوات کے روٹس کے سمیٹرک تفاعل کو اس کے عددی سروں کے لحاظ سے معلوم کرنا۔

کھ دو درجی مساوات کے دیے ہوئے روٹس سے درج ذیل کلیہ بنانا

$$0 = (x^2 + (x \text{ روٹس کا مجموعہ}) - x^2)$$

کھ اگر  $\alpha$  اور  $\beta$  دی ہوئی مساوات کے روٹس ہوں تو درج ذیل قسم کے روٹس کی مساواتیں بنانا

- $2\alpha + 1, 2\beta + 1$
- $\alpha^2, \beta^2$
- $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$
- $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$
- $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$

کھ ترکیبی تقسیم (Synthetic Division) کا طریقہ بیان کرنا۔

کھ ترکیبی تقسیم کے استعمال سے

- دی ہوئی کثیر رتی کو یک درجی کثیر رتی سے تقسیم کرنے سے باقی (Remainder) اور حاصل قسمت (Quotient) معلوم کرنا۔

- اگر کثیر رتی کے زیروز (Zeros) دیے ہوں تو نا معلوم مقدار کی قیمت معلوم کرنا۔

- اگر کثیر رتی کے اجزائے ضربی دیے ہوں تو نا معلوم مقدار یا نا معلوم مقداروں کی قیمت معلوم کرنا۔

- اگر مساوات کا ایک حل دیا ہو تو تین درجی مساوات حل کرنا۔

- اگر مساوات کے دو حقیقی حل دیے ہوں تو چار درجی مساوات (Biquadratic equation) حل کرنا۔

کھ دو متغیر میں دو ہمزا مساواتوں (Simultaneous equations) کو حل کرنا۔ جبکہ

- ایک مساوات یک درجی اور دوسری دو درجی ہو۔

- دونوں مساواتیں دو درجی ہوں۔

کھ روزمرہ زندگی (Real life) کے سوالات (Problems) کو دو درجی مساوات بنا کر حل کرنا۔



## 2.1 دو درجی مساواتوں کے روٹس کی اقسام:

دو درجی مساواتوں کے حل سے ہم مختلف روٹس حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم دو درجی مساوات کو بغیر حل کے اس کے روٹس کی خصوصیات معلوم کریں گے۔

### 2.1.1 دو درجی جملے $ax^2 + bx + c$ کے فرق کنندہ $(b^2 - 4ac)$ کی خصوصیات:

ہم جانتے ہیں کہ مساوات

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0 \quad (i)$$

$$\text{کے دو روٹس } \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ اور } \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ ہیں۔}$$

ان روٹس کی اقسام کا انحصار جملہ " $b^2 - 4ac$ " کی قیمت پر ہے جو دو درجی مساوات (i) یا دو درجی جملہ  $ax^2 + bx + c$  کا فرق کنندہ کہلاتا ہے۔

### 2.1.2 دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کرنا

ہم دی ہوئی دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کرنے کے طریقہ کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے کرتے ہیں۔

**مثال 1:** درج ذیل مساواتوں کا فرق کنندہ معلوم کیجیے۔

$$(b) \quad x^2 - 3x + 3 = 0$$

$$(a) \quad 2x^2 - 7x + 1 = 0$$

**حل:**

$$(b) \quad x^2 - 3x + 3 = 0$$

$$(a) \quad 2x^2 - 7x + 1 = 0$$

$$a = 1, b = -3, c = 3 \quad \text{یہاں}$$

$$a = 2, b = -7, c = 1 \quad \text{یہاں}$$

$$\text{فرق کنندہ} = b^2 - 4ac$$

$$\text{فرق کنندہ} = b^2 - 4ac$$

$$= (-3)^2 - 4(1)(3)$$

$$= (-7)^2 - 4(2)(1)$$

$$= 9 - 12 = -3$$

$$= 49 - 8 = 41$$

### 2.1.3 دو درجی مساوات کے روٹس کی اقسام بذریعہ فرق کنندہ

دو درجی مساوات  $ax^2 + bx + c = 0, (a \neq 0)$  کے روٹس  $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  ہیں اور اس کا فرق کنندہ

$$b^2 - 4ac \text{ ہے۔}$$

جبکہ  $a, b$  اور  $c$  ناطق اعداد ہوں۔ تب روٹس کی اقسام یوں بیان کی جاسکتی ہیں۔

(i) اگر  $b^2 - 4ac > 0$  اور مکمل مربع ہو تو اس کے روٹس ناطق (حقیقی) اور نابرابر ہوتے ہیں۔

(ii) اگر  $b^2 - 4ac > 0$  اور مکمل مربع نہ ہو۔ تو اس کے روٹس غیر ناطق (حقیقی) اور نابرابر ہوتے ہیں۔

(iii) اگر  $b^2 - 4ac = 0$  ہو تو اس کے روٹس ناطق (حقیقی) اور برابر ہوتے ہیں۔

(iv) اگر  $b^2 - 4ac < 0$  ہو تو اس کے روٹس خیالی یا غیر حقیقی (Imaginary) ہوتے ہیں۔

## 2.1.4 دی ہوئی دو درجی مساوات کے روٹس کی اقسام معلوم کرنا اور مساوات حل

کر کے جوابات کی تصدیق کرنا

ہم مندرجہ ذیل مثالوں کے ذریعہ طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں۔

**مثال 2:** مندرجہ ذیل مساواتوں کے روٹس کی اقسام بذریعہ فرق کنندہ معلوم کیجیے اور مساواتوں کو حل کر کے جوابات کی تصدیق کیجیے۔

(b)  $2x^2 - x + 1 = 0$

(a)  $x^2 - 5x + 5 = 0$

(d)  $7x^2 + 8x + 1 = 0$

(c)  $x^2 + 8x + 16 = 0$

(a)  $x^2 - 5x + 5 = 0$  **حل:**

دو درجی معیاری مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  سے موازنہ کرنے سے

یہاں  $a = 1, b = -5$  اور  $c = 5$

فرق کنندہ  $= b^2 - 4ac$

$= (-5)^2 - 4(1)(5) = 25 - 20 = 5 > 0$

کیونکہ فرق کنندہ مثبت ہے اور مکمل مربع نہیں ہے۔

اس لیے روٹس غیر ناطق (حقیقی) اور نابرابر ہیں۔

$x^2 - 5x + 5 = 0$

اب مساوات کو کلیہ سے حل کرنے سے

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$= \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(1)(5)}}{2(1)} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 20}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$

ظاہر ہے کہ روٹس غیر ناطق (حقیقی) اور نابرابر ہیں۔

(b)  $2x^2 - x + 1 = 0$

یہاں  $a = 2, b = -1$  اور  $c = 1$

فرق کنندہ  $= b^2 - 4ac$

$= (-1)^2 - 4(2)(1) = 1 - 8 = -7 < 0$



کیونکہ فرق کنندہ منفی ہے۔  
اس لیے روٹس غیر حقیقی اور نابرابر ہیں۔  
مساوات کو بذریعہ دو درجی کلیہ حل کرنے سے

$$2x^2 - x + 1 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(2)(1)}}{2(2)}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{1 - 8}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{-7}}{4}$$

ظاہر ہے کہ مساوات کے روٹس غیر حقیقی اور نابرابر ہیں۔

$$x^2 + 8x + 16 = 0 \quad (c)$$

$$a = 1, b = 8 \text{ اور } c = 16 \quad \text{یہاں}$$

$$\text{فرق کنندہ} = b^2 - 4ac$$

$$= (8)^2 - 4(1)(16)$$

$$= 64 - 64 = 0$$

کیونکہ فرق کنندہ صفر ہے۔ اس لیے روٹس ناطق (حقیقی) اور برابر ہیں۔  
مساوات کی تصدیق بذریعہ حل

$$x^2 + 8x + 16 = 0$$

$$(x + 4)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = -4, -4$$

پس روٹس ناطق (حقیقی) اور برابر ہیں۔

$$7x^2 + 8x + 1 = 0 \quad (d)$$

$$a = 7, b = 8 \text{ اور } c = 1 \quad \text{یہاں}$$

$$\text{فرق کنندہ} = b^2 - 4ac$$

$$= (8)^2 - 4(7)(1)$$

$$= 64 - 28 = 36 = (6)^2$$

جو کہ مثبت اور مکمل مربع ہے۔  
اس لیے روٹس ناطق (حقیقی) اور نابرابر ہیں۔  
اب مساوات کو بذریعہ تجزیہ حل کرنے سے

$$7x^2 + 8x + 1 = 0$$

$$7x^2 + 7x + x + 1 = 0$$

$$7x(x+1) + 1(x+1) = 0$$

$$(x+1)(7x+1) = 0$$

$$x+1=0 \quad \text{یا}$$

$$7x+1=0 \quad \text{اس طرح}$$

$$x=-1 \quad \text{یا} \quad 7x=-1 \Rightarrow x=-\frac{1}{7}$$

پس روٹس ناطق (حقیقی) اور نابرابر ہیں۔

## 2.1.5 دی ہوئی دو درجی مساوات میں دی ہوئی نامعلوم مقدار کی قیمت دریافت کرنا

جب کہ اس کے روٹس کی اقسام دی ہوئی ہوں۔

ہم مندرجہ ذیل مثال سے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں۔

**مثال 3:** اگر  $k \neq 3$  ہو اور مساوات  $(k+3)x^2 - 2(k+1)x - (k+1) = 0$  کے روٹس برابر ہوں۔

تو  $k$  معلوم کیجیے۔

$$(k+3)x^2 - 2(k+1)x - (k+1) = 0$$

**حل:**

$$a = k+3, \quad b = -2(k+1) \quad \text{اور} \quad c = -(k+1)$$

یہاں

کیونکہ روٹس برابر ہیں۔ پس فرق کنندہ کی قیمت صفر ہے۔

$$b^2 - 4ac = 0$$

یعنی

$$[-2(k+1)]^2 - 4(k+3)[- (k+1)] = 0$$

$$4[k+1]^2 + 4(k+3)(k+1) = 0 \quad \text{یا} \quad 4(k+1)(k+1+k+3) = 0$$

$$\Rightarrow 4(k+1)(2k+4) = 0 \quad \text{یا} \quad 8(k+1)(k+2) = 0$$

$$\Rightarrow k+1=0 \quad \text{یا} \quad k+2=0$$

$$\Rightarrow k=-1 \quad \text{یا} \quad k=-2$$

اگر  $k = -1, -2$  ہو تو روٹس برابر ہوں گے۔

## مشق 2.1

مندرجہ ذیل دی ہوئی دو درجی مساواتوں کا فرق کنندہ معلوم کیجیے۔

$$(i) \quad 2x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$(ii) \quad 6x^2 - 8x + 3 = 0$$

$$(iii) \quad 9x^2 - 30x + 25 = 0$$

$$(iv) \quad 4x^2 - 7x - 2 = 0$$

مندرجہ ذیل دی ہوئی دو درجی مساواتوں کے روٹس کی اقسام معلوم کیجیے اور مساواتوں کو حل کر کے روٹس کی

تصدیق کیجیے۔

$$(i) \quad x^2 - 23x + 120 = 0$$

$$(ii) \quad 2x^2 + 3x + 7 = 0$$

$$(iii) \quad 16x^2 - 24x + 9 = 0$$

$$(iv) \quad 3x^2 + 7x - 13 = 0$$



(b)

$k$  کی کس قیمت کے لیے دیا ہوا جملہ  $k^2x^2 + 2(k+1)x + 4$  مکمل مربع ہے؟  
 اگر مندرجہ ذیل مساواتوں کے روٹس برابر ہوں تو  $k$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

-4

(i)  $(2k-1)x^2 + 3kx + 3 = 0$

(ii)  $x^2 + 2(k+2)x + (3k+4) = 0$

(iii)  $(3k+2)x^2 - 5(k+1)x + (2k+3) = 0$

ثابت کیجیے کہ مساوات  $x^2 + (mx+c)^2 = a^2$  کے روٹس برابر ہونگے۔ اگر  $c^2 = a^2(1+m^2)$  -5

شرط معلوم کیجیے کہ مساوات  $(mx+c)^2 - 4ax = 0$  کے روٹس برابر ہوں۔ -6

اگر مساوات  $(c^2 - ab)x^2 - 2(a^2 - bc)x + (b^2 - ac) = 0$  کے روٹس برابر ہوں -7

تو  $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$  یا  $a = 0$

ثابت کیجیے کہ مندرجہ ذیل مساواتوں کے روٹس ناطق ہیں۔ -8

(i)  $a(b-c)x^2 + b(c-a)x + c(a-b) = 0$

(ii)  $(a+2b)x^2 + 2(a+b+c)x + (a+2c) = 0$

$k$  کی تمام قیمتوں کے لیے مساوات  $x^2 - 2\left(k + \frac{1}{k}\right)x + 4 = 0$ ,  $(k \neq 0)$  کے روٹس حقیقی ہیں۔ -9

ثابت کریں کہ مساوات  $(b-c)x^2 + (c-a)x + (a-b) = 0$  کے روٹس حقیقی ہیں۔ -10

## 2.2 اکائی کا جذر المکعب اور اس کی خصوصیات:

### 2.2.1 اکائی کا جذر المکعب:

فرض کریں کہ  $x$  اکائی کا جذر المکعب ہے۔

$x = (1)^{1/3}$

یعنی

$x^3 = 1$

یا

$\Rightarrow x^3 - 1 = 0$  یا  $(x^3 - (1)^3) = 0$

$\Rightarrow (x-1)(x^2+x+1) = 0$  [  $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$  کے استعمال سے ]

$x-1=0$  یا  $x^2+x+1=0$  اس طرح

$\Rightarrow x=1$  یا  $x = \frac{-1 \pm \sqrt{(1)^2 - 4(1)(1)}}{2(1)}$   
 $= \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

اس لیے اکائی کے تین جذر المکعب ہیں۔

$i = \sqrt{-1}$  جبکہ  $\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$  اور  $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ , 1

## 2.2.2 $\omega$ اور $\omega^2$ کی بطور اکائی کے کمپلیکس جذور المکعب کی پہچان کرنا۔

اکائی کے دو کمپلیکس جذور المکعب  $\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$  اور  $\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$  ہیں۔

اگر ہم کسی ایک کا نام  $\omega$  (اومیگا) رکھیں تو دوسرا  $\omega^2$  ہو گا۔ ہم اس بیان کو اگلے آرٹیکل (Article) میں ثابت کریں گے۔

## 2.2.3 اکائی کے جذور المکعب کی خصوصیات:

(a) ثابت کیجیے کہ اکائی کا ہر ایک غیر حقیقی (کمپلیکس) جذور المکعب دوسرے کا مربع ہوتا ہے۔

**ثبوت:** اکائی کے کمپلیکس جذور المکعب  $\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$  اور  $\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$  ہیں۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} \left(\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}\right)^2 &= \frac{-1-\sqrt{-3}}{2} & \text{اور} & & \left(\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}\right)^2 &= \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} \\ \left(\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}\right)^2 &= \frac{1+(-3)-2\sqrt{-3}}{4} & & & \left(\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}\right)^2 &= \frac{1+(-3)+2\sqrt{-3}}{4} \\ &= \frac{-2-2\sqrt{-3}}{4} & & & &= \frac{-2+2\sqrt{-3}}{4} \\ &= \frac{2(-1-\sqrt{-3})}{4} & & & &= \frac{2(-1+\sqrt{-3})}{4} \\ &= \frac{-1-\sqrt{-3}}{2} & & & &= \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} \end{aligned}$$

پس اکائی کا ہر ایک غیر حقیقی جذور المکعب دوسرے کا مربع ہے۔ یعنی اگر  $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$  ہو تو

$$\omega^2 = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2} \text{ ہے۔ اور اگر } \omega = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2} \text{ ہو تو } \omega^2 = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} \text{ ہے۔}$$

(b) ثابت کیجیے کہ اکائی کے تینوں جذور المکعب کا حاصل ضرب ایک ہوتا ہے:

**ثبوت:** اکائی کے تین جذور المکعب 1،  $\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$  اور  $\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}$  ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اکائی کے جذور المکعب کا حاصل ضرب} &= (1) \left(\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}\right) \left(\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}\right) \\ &= \frac{(-1)^2 - (\sqrt{-3})^2}{4} = \frac{1 - (-3)}{4} = \frac{1+3}{4} = \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$



(b) یعنی  $(1) (\omega) (\omega^2) = 1$  or  $\omega^3 = 1$  یاد رکھیں کہ

$$\omega^4 = \omega^3 \cdot \omega = 1 \cdot \omega = \omega$$

(c) ثابت کیجیے کہ اکائی کا ہر ایک غیر حقیقی جذر المکعب دوسرے کا معکوس ہوتا ہے۔

$$\omega^3 = 1 \Rightarrow \omega \cdot \omega^2 = 1$$

ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ

$$\omega = \frac{1}{\omega^2} \quad \text{یا} \quad \omega^2 = \frac{1}{\omega} \quad \text{پس}$$

لہذا اکائی کا ہر ایک کمپلیکس جذر المکعب دوسرے کا الٹ ہے۔

(d) ثابت کریں کہ اکائی کے تمام جذر المکعب کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔

$$1 + \omega + \omega^2 = 0 \quad \text{یعنی}$$

ثبوت: 1،  $\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$  اور  $\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$  اکائی کے جذر المکعب ہیں۔

$$\omega^2 = \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \quad \text{تو} \quad \omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \quad \text{اگر}$$

$$1 + \omega + \omega^2 = \text{تمام روٹس کا مجموعہ}$$

$$= 1 + \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$$

$$= \frac{2 - 1 + \sqrt{-3} - 1 - \sqrt{-3}}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$1 + \omega + \omega^2 = 0$$

پس

ہم آسانی سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad 1 + \omega^2 = -\omega \quad (ii) \quad 1 + \omega = -\omega^2 \quad (iii) \quad \omega + \omega^2 = -1$$

2.2.4 اکائی کے جذر المکعب کی خصوصیات کے استعمال سے مناسب سوالوں کو حل کرنا۔

ہم کی بڑی طاقتوں کو 1،  $\omega$  اور  $\omega^2$  میں بدل سکتے ہیں۔

$$\omega^7 = (\omega^3)^2 \cdot \omega = (1)^2 \cdot \omega = \omega$$

مثلاً

$$\omega^{23} = (\omega^3)^7 \cdot \omega^2 = (1)^7 \cdot \omega^2 = \omega^2$$

$$\omega^{63} = (\omega^3)^{21} = (1)^{21} = 1$$

$$\omega^{-5} = \frac{1}{\omega^5} = \frac{1}{\omega^3 \cdot \omega^2} = \frac{1}{1 \cdot \omega^2} = \frac{\omega^3}{\omega^2} = \omega$$

$$\omega^{-16} = \frac{1}{\omega^{16}} = \frac{1}{(\omega^3)^5 \cdot \omega} = \frac{1}{(1)^5 \cdot \omega} = \frac{\omega^3}{\omega} = \omega^2$$

$$\omega^{-27} = \frac{1}{\omega^{27}} = \frac{1}{(\omega^3)^9} = \frac{1}{(1)^9} = 1$$

مثال 1:  $(-1 + \sqrt{-3})^8 + (-1 - \sqrt{-3})^8$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

حل:

$$\begin{aligned} & (-1 + \sqrt{-3})^8 + (-1 - \sqrt{-3})^8 \\ &= \left[ 2 \left( \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \right) \right]^8 + \left[ 2 \left( \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \right) \right]^8 \\ &= (2\omega)^8 + (2\omega^2)^8 \\ &= 256 \omega^8 + 256 \omega^{16} \\ &= 256 [\omega^8 + \omega^{16}] \\ &= 256 [(\omega^3)^2 \cdot \omega^2 + (\omega^3)^5 \cdot \omega] \quad (\because \omega^3 = 1) \\ &= 256 [\omega^2 + \omega] \quad (\omega + \omega^2 = -1) \\ &= 256 (-1) = -256 \end{aligned}$$

مثال 2: ثابت کیجیے کہ  $x^3 - y^3 = (x - y)(x - \omega y)(x - \omega^2 y)$

حل:

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x - \omega y)(x - \omega^2 y)$$

$$\begin{aligned} \text{R.H.S} &= (x - y)(x - \omega y)(x - \omega^2 y) \\ &= (x - y)[x^2 - \omega^2 xy - \omega xy + \omega^3 y^2] \\ &= (x - y)[x^2 - xy(\omega^2 + \omega) + (1)y^2] \\ &= (x - y)[x^2 - xy(-1) + y^2] \\ &= (x - y)[x^2 + xy + y^2] \\ &= x^3 - y^3 = \text{L.H.S} \end{aligned}$$

## مشق 2.2

1-  $-1, 8, -27, 64$  کے جذور المکعب معلوم کیجیے۔

2- قیمت معلوم کیجیے۔

(i)  $(1 - \omega - \omega^2)^7$

(ii)  $(1 - 3\omega - 3\omega^2)^5$

(iii)  $(9 + 4\omega + 4\omega^2)^3$

(iv)  $(2 + 2\omega - 2\omega^2)(3 - 3\omega + 3\omega^2)$

(v)  $(-1 + \sqrt{-3})^6 + (-1 - \sqrt{-3})^6$

(vi)  $\left( \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \right)^9 + \left( \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \right)^9$

(vii)  $\omega^{37} + \omega^{38} - 5$

(viii)  $\omega^{-13} + \omega^{-17}$

3- ثابت کیجیے کہ  $x^3 + y^3 = (x + y)(x + \omega y)(x + \omega^2 y)$

4- ثابت کیجیے کہ  $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x + \omega y + \omega^2 z)(x + \omega^2 y + \omega z)$

5- ثابت کیجیے کہ  $(1 + \omega)(1 + \omega^2)(1 + \omega^4)(1 + \omega^8) \dots 2n \text{ factors} = 1$



## (b) دودرجی مساوات کے روٹس اور عددی سر:

ہم جانتے ہیں کہ  $\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  اور  $\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس ہیں۔  
 جبکہ  $a, b$  بالترتیب  $x^2$  اور  $x$  کے عددی سر ہیں اور  $c$  مستقل رقم ہے۔

### 2.3.1 دودرجی مساوات کے روٹس (Roots) اور عددی سروں میں تعلق:

اگر  $\alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  اور  $\beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  تو ہم مندرجہ ذیل طریقہ سے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{روٹس کا مجموعہ} &= \alpha + \beta \\ &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac} - b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{روٹس کا حاصل ضرب} &= \alpha\beta \\ &= \left( \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \left( \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) \\ &= \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\ &= \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} \end{aligned}$$

اگر ہم روٹس کے مجموعے اور حاصل ضرب کو بالترتیب  $S$  اور  $P$  سے ظاہر کریں تو

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{\text{x کا عددی سر}}{\text{x}^2 \text{ کا عددی سر}}$$

$$P = \frac{c}{a} = \frac{\text{مستقل رقم}}{\text{x}^2 \text{ کا عددی سر}}$$

اور

### 2.3.2 دی ہوئی دودرجی مساوات کو حل کیے بغیر اس کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کرنا:

ہم مندرجہ ذیل مثالوں سے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں۔

**مثال 1:** مساواتوں کو حل کیے بغیر روٹس (Roots) کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

(a)  $3x^2 - 5x + 7 = 0$

(b)  $x^2 + 4x - 9 = 0$

**حل:** (a) فرض کریں کہ  $\alpha$  اور  $\beta$  مساوات  $3x^2 - 5x + 7 = 0$  کے روٹس ہیں۔

تب  $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\left(\frac{-5}{3}\right) = \frac{5}{3}$

اور  $\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{7}{3}$

(b) فرض کریں کہ  $\alpha$  اور  $\beta$  مساوات  $x^2 + 4x - 9 = 0$  کے روٹس ہیں۔

تب  $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{4}{1} = -4$

اور  $\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{-9}{1} = -9$

### 2.3.3 دی ہوئی دودرجی مساوات میں نامعلوم مقدار کی قیمت معلوم کرنا

ہم مندرجہ ذیل مثالوں سے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں۔

(a) جب روٹس کا مجموعہ (Sum of Roots) روٹس کے حاصل ضرب

(Product of Roots) کے ضعف (Multiple) کے برابر ہو:

**مثال 1:** اگر مساوات  $3x^2 + (9 - 6h)x + 5h = 0$  کے روٹس کا مجموعہ (Sum of roots) روٹس کے حاصل

ضرب (Product of Roots) کے 3 گنا کے برابر ہو تو "h" کی قیمت معلوم کریں۔

**حل:** فرض کریں کہ  $\alpha$  اور  $\beta$  مساوات  $3x^2 + (9 - 6h)x + 5h = 0$  کے روٹس ہیں۔

تب  $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\left(\frac{9 - 6h}{3}\right) = \frac{6h - 9}{3}$

$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{5h}{3}$

$\alpha + \beta = 3(\alpha\beta)$

کیونکہ

$\frac{6h - 9}{3} = 3\left(\frac{5h}{3}\right)$  اور  $\frac{3(2h - 3)}{3} = 5h$

اس لیے

$2h - 3 = 5h \Rightarrow 2h - 5h = 3$

$-3h = 3 \Rightarrow h = \frac{3}{-3} = -1$



(b) جب روٹس (Roots) کے مربعوں کا مجموعہ دیئے ہوئے عدد کے برابر ہو۔

مثال 2:  $p$  کی قیمت معلوم کیجیے۔ اگر مساوات  $4x^2 + 3px + p^2 = 0$  کے روٹس (Roots) کے مربعوں کا مجموعہ ایک کے برابر ہو۔

حل: اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $4x^2 + 3px + p^2 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{3p}{4}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{p^2}{4}$$

اور

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1$$

کیونکہ

$$(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1$$

اس لیے

$$\Rightarrow \left(\frac{-3p}{4}\right)^2 - 2\left(\frac{p^2}{4}\right) = 1 \quad \text{اور} \quad \frac{9p^2}{16} - \frac{p^2}{2} = 1$$

$$\Rightarrow 9p^2 - 8p^2 = 16 \Rightarrow p^2 = 16 \Rightarrow p = \pm 4$$

(c) جب روٹس (Roots) کا فرق دیئے ہوئے عدد کے برابر ہو:

مثال 3: اگر مساوات  $x^2 - hx + 10 = 0$  کے روٹس (Roots) میں 3 کا فرق ہو تو  $h$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

حل: فرض کریں کہ  $\alpha$  اور  $\alpha - 3$  مساوات  $x^2 - hx + 10 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو

$$\alpha + \alpha - 3 = -\frac{b}{a} = -\left(\frac{-h}{1}\right) = h$$

$$2\alpha - 3 = h \Rightarrow 2\alpha = h + 3 \Rightarrow \alpha = \frac{h+3}{2} \quad (i)$$

$$\alpha(\alpha - 3) = \frac{c}{a} = \frac{10}{1} = 10 \quad \text{اور} \quad \alpha(\alpha - 3) = 10 \quad (ii)$$

مساوات (i) سے  $\alpha$  کی قیمت مساوات (ii) میں درج کرنے سے

$$\left(\frac{h+3}{2}\right)\left(\frac{h+3}{2} - 3\right) = 10 \Rightarrow \left(\frac{h+3}{2}\right)\left(\frac{h+3-6}{2}\right) = 10$$

$$\left(\frac{h+3}{2}\right)\left(\frac{h-3}{2}\right) = 10 \Rightarrow h^2 - 9 = 40, \quad \text{لہذا}$$

$$h^2 = 49 \Rightarrow h = \pm 7$$

(d) روٹس (Roots) کے دیئے ہوئے ربط کو ثابت کریں:

(مثلاً  $2\alpha + 5\beta = 7$ ، جبکہ  $\alpha, \beta$  دی ہوئی مساوات کے روٹس (Roots) ہیں)

مثال 4:  $p$  کی قیمت معلوم کیجیے اگر

$\alpha$  اور  $\beta$  مساوات  $x^2 - 5x + p = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں اور دیا ہوا تعلق  $2\alpha + 5\beta = 7$  ہے۔

**حل:** اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $x^2 - 5x + p = 0$  کے روٹس ہوں تو

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\left(\frac{-5}{1}\right) = 5$$

$$\alpha + \beta = 5 \Rightarrow \beta = 5 - \alpha \quad (i)$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{p}{1} = p \Rightarrow \alpha\beta = p \quad (ii)$$

$$2\alpha + 5\beta = 7 \quad (\text{معلوم}) \quad (iii) \quad \text{کیونکہ}$$

مساوات (i) سے  $\beta$  کی قیمت مساوات (iii) میں درج کرنے سے

$$2\alpha + 5(5 - \alpha) = 7$$

$$2\alpha + 25 - 5\alpha = 7 \quad \text{اور} \quad -3\alpha = 7 - 25, \quad \text{لہذا}$$

$$-3\alpha = -18 \Rightarrow \alpha = 6 \quad (iv)$$

$$\beta = 5 - 6 = -1$$

(i) اور (iv) کے استعمال سے

$\alpha$  اور  $\beta$  کی قیمتیں مساوات (ii) میں درج کرنے سے

$$6(-1) = p \Rightarrow p = -6$$

(e) جب روٹس (Roots) کا مجموعہ اور حاصل ضرب دونوں کسی دیے ہوئے عدد کے برابر ہوں۔

**مثال 5:**  $m$  کی قیمت معلوم کیجیے۔ اگر مساوات  $5x^2 + (7 - 2m)x + 3 = 0$  کے روٹس (Roots) کا مجموعہ اور حاصل ضرب دیے ہوئے عدد  $\lambda$  کے برابر ہو۔

**حل:** فرض کریں  $\alpha, \beta$  مساوات  $5x^2 + (7 - 2m)x + 3 = 0$  کے روٹس ہوں تو

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{7 - 2m}{5} = \frac{2m - 7}{5}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$$

اور

$$\alpha + \beta = \lambda \quad (i) \quad \text{فرض کریں کہ}$$

$$\alpha\beta = \lambda \quad (ii) \quad \text{اور}$$

$$\alpha + \beta = \alpha\beta \quad (i) \text{ اور } (ii) \text{ کی رو سے}$$

$$\frac{2m - 7}{5} = \frac{3}{5} \quad \text{اس لیے}$$

$$\Rightarrow 2m - 7 = 3 \Rightarrow 2m = 10 \Rightarrow m = 5$$



## مشق 2.3

1- مندرجہ ذیل دو درجی مساواتوں کو حل کیے بغیر مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

(i)  $x^2 - 5x + 3 = 0$

(ii)  $3x^2 + 7x - 11 = 0$

(iii)  $px^2 - qx + r = 0$

(iv)  $(a + b)x^2 - ax + b = 0$

(v)  $(l + m)x^2 + (m + n)x + n - l = 0$

(vi)  $7x^2 - 5mx + 9n = 0$

2-  $k$  کی قیمت معلوم کیجیے اگر

(i) مساوات  $2kx^2 - 3x + 4k = 0$  کے روٹس کا مجموعہ اس کے روٹس (Roots) کے حاصل ضرب کا دو گنا ہو۔

(ii) مساوات  $x^2 + (3k - 7)x + 5k = 0$  کے روٹس (Roots) کا مجموعہ اس کے روٹس (Roots) کے حاصل ضرب کا  $\frac{3}{2}$  گنا ہو۔

3-  $k$  کی قیمت معلوم کیجیے اگر

(i) مساوات  $4kx^2 + 3kx - 8 = 0$  کے روٹس (Roots) کے مربعوں کا مجموعہ 2 ہو۔

(ii) مساوات  $x^2 - 2kx + (2k + 1) = 0$  کے روٹس (Roots) کے مربعوں کا مجموعہ 6 ہو۔

4-  $p$  کی قیمت معلوم کیجیے اگر

(i) مساوات  $x^2 - x + p^2 = 0$  کے روٹس (Roots) میں 1 کا فرق ہو۔

(ii) مساوات  $x^2 + 3x + p - 2 = 0$  کے روٹس (Roots) میں 2 کا فرق ہو۔

5-  $m$  کی قیمت معلوم کیجیے اگر

(i) مساوات  $x^2 - 7x + 3m - 5 = 0$  کے روٹس دیے گئے تعلق  $3\alpha + 2\beta = 4$  کو ثابت کریں۔

(ii) مساوات  $x^2 + 7x + 3m - 5 = 0$  کے روٹس دیے گئے تعلق  $3\alpha - 2\beta = 4$  کو ثابت کریں۔

(iii) مساوات  $3x^2 - 2x + 7m + 2 = 0$  کے روٹس دیے گئے تعلق  $7\alpha - 3\beta = 18$  کو ثابت کریں۔

6-  $m$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

اگر مندرجہ ذیل مساواتوں کے روٹس (Roots) کا مجموعہ اور حاصل ضرب دونوں ایک دیے گئے عدد  $\lambda$  کے برابر ہوں۔

(i)  $(2m + 3)x^2 + (7m - 5)x + (3m - 10) = 0$

(ii)  $4x^2 - (3 + 5m)x - (9m - 17) = 0$

## 2.4 دو درجی مساوات کے روٹس (Roots) کے (سمیٹرک)

### تفاعل: (Symmetric Functions)

#### 2.4.1 دو درجی مساوات کے روٹس (Roots) کے سمیٹرک تفاعل کی تعریف:

تعریف:

دو درجی مساوات کے روٹس کے سمیٹرک تفاعل ایسے جملوں پر مشتمل ہوتا ہے جن (جملے) میں روٹس کی جگہ تبدیل کرنے سے تفاعل میں فرق نہیں آتا۔

$$f(\alpha, \beta) = \alpha^2 + \beta^2$$

$$f(\beta, \alpha) = \beta^2 + \alpha^2 = \alpha^2 + \beta^2 = f(\alpha, \beta)$$

$$(\because \beta^2 + \alpha^2 = \alpha^2 + \beta^2) \quad \text{تو}$$

**مثال:** اگر  $\alpha = 2, \beta = 1$  ہو تو  $\alpha^3 + \beta^3 + 3\alpha\beta$  کی قیمت معلوم کیجیے۔ اگر  $\alpha = 1$  اور  $\beta = 2$  ہو تو  $\alpha^3 + \beta^3 + 3\alpha\beta$  کی قیمت بھی معلوم کیجیے۔

**حل:** جب  $\alpha = 2$  اور  $\beta = 1$

$$\alpha^3 + \beta^3 + 3\alpha\beta = (2)^3 + (1)^3 + 3(2)(1) \\ = 8 + 1 + 6 = 15$$

$$\alpha = 1 \quad \beta = 2 \quad \text{جب}$$

$$\alpha^3 + \beta^3 + 3\alpha\beta = (1)^3 + (2)^3 + 3(1)(2) \\ = 1 + 8 + 6 = 15$$

جملہ  $\alpha^3 + \beta^3 + 3\alpha\beta$ ،  $\alpha$  اور  $\beta$  کے سمیٹرک تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔

#### 2.4.2 دو درجی مساوات کے روٹس (Roots) کے سمیٹرک تفاعل کی اس کے

عددی سروں کی شکل میں قیمت معلوم کرنا:

اگر  $\alpha, \beta$  دو درجی مساوات

$$ax^2 + bx + c = 0, (a \neq 0) \quad \text{کے روٹس ہوں تو} \quad (i)$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad (ii)$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} \quad (iii) \quad \text{اور}$$

مساوات (ii) اور (iii) میں دیے گئے تفاعل دو درجی مساوات (i) کے سمیٹرک تفاعل ہیں۔

دو متغیروں  $\alpha, \beta$  میں کچھ مزید سمیٹرک تفاعل نیچے دیے گئے ہیں۔

$$(i) \quad \alpha^2 + \beta^2$$

$$(ii) \quad \alpha^3 + \beta^3$$

$$(iii) \quad \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$$

$$(iv) \quad \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$$



**مثال 1:** اگر  $\alpha, \beta$  دو درجی مساوات  $px^2 + qx + r = 0$  , ( $p \neq 0$ ) کے روٹس (Roots) ہوں تو  $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

**حل:** کیونکہ  $\alpha, \beta$  مساوات  $px^2 + qx + r = 0$  کے روٹس (Roots) ہیں۔ اس لیے

$$\alpha + \beta = -\frac{q}{p} \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = \frac{r}{p}$$

$$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$= \frac{r}{p} \left( -\frac{q}{p} \right) = \frac{-qr}{p^2}$$

**مثال 2:** اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $2x^2 + 3x + 4 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کیجیے۔

$$(i) \alpha^2 + \beta^2 \quad (ii) \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$$

**حل:** کیونکہ  $\alpha, \beta$  مساوات  $2x^2 + 3x + 4 = 0$  کے روٹس ہیں۔ اس لیے

$$\alpha + \beta = -\frac{3}{2} \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = \frac{4}{2} = 2$$

$$(i) \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = \left( -\frac{3}{2} \right)^2 - 2(2)$$

$$= \frac{9}{4} - 4 = \frac{9 - 16}{4} = -\frac{7}{4}$$

$$(ii) \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = (\alpha + \beta) \frac{1}{\alpha\beta}$$

$$= \left( -\frac{3}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) = \frac{-3}{4}$$

## مشق 2.4

1- اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $x^2 + px + q = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کیجیے۔

$$(i) \alpha^2 + \beta^2$$

$$(ii) \alpha^3\beta + \alpha\beta^3$$

$$(iii) \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$$

2- اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $4x^2 - 5x + 6 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کیجیے۔

$$(i) \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$$

$$(ii) \alpha^2\beta^2$$

$$(iii) \frac{1}{\alpha^2\beta} + \frac{1}{\alpha\beta^2}$$

$$(iv) \frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha}$$

3- اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $lx^2 + mx + n = 0$  ( $l \neq 0$ ) کے روٹس (Roots) ہوں تو مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کیجیے۔

$$(i) \alpha^3\beta^2 + \alpha^2\beta^3$$

$$(ii) \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$$

## 2.5 دودرجی مساوات کی تشکیل:

اگر  $\alpha$  اور  $\beta$  مطلوبہ دودرجی مساوات کے روٹس (Roots) ہوں۔

$$x = \alpha \quad \text{اور} \quad x = \beta \quad \text{فرض کریں کہ}$$

$$x - \alpha = 0, \quad x - \beta = 0 \quad \text{یعنی}$$

$$(x - \alpha)(x - \beta) = 0 \quad \text{اور}$$

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

جو کہ مطلوبہ دودرجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔

### 2.5.1 دیئے گئے روٹس (Roots) سے دودرجی مساوات کا کلیہ تشکیل دینا:

$$0 = (\text{روٹس کا حاصل ضرب}) + x + (\text{روٹس کا مجموعہ}) - x^2 :$$

فرض کریں کہ  $\alpha$  اور  $\beta$  درج ذیل دودرجی مساوات کے روٹس ہیں۔

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad (a \neq 0) \quad (i)$$

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \text{اور} \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} \quad \text{تب}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad \text{مساوات (i) کو اس طرح لکھنے سے}$$

$$x^2 - \left(-\frac{b}{a}\right)x + \frac{c}{a} = 0 \quad \text{یا}$$

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 - (\text{روٹس کا حاصل ضرب}) + x + (\text{روٹس کا مجموعہ}) = 0, \quad \text{یا}$$

$$x^2 - Sx + P = 0 \quad \text{جبکہ} \quad S = \alpha + \beta \quad \text{اور} \quad P = \alpha\beta$$

**مثال 1:** دودرجی مساوات بنائیے۔ جس کے روٹس (Roots) 3 اور 4 ہوں۔

**حل:** کیونکہ 3 اور 4 مطلوبہ دودرجی مساوات کے روٹس (Roots) ہیں۔

$$S = \text{روٹس کا مجموعہ} = 3 + 4 = 7 \quad \text{اس لیے}$$

$$P = \text{روٹس کا حاصل ضرب} = (3)(4) = 12$$

$$x^2 - Sx + P = 0, \quad \text{کیونکہ}$$

$$\text{پس } x^2 - 7x + 12 = 0 \text{ مطلوبہ دودرجی مساوات ہے۔}$$



## 2.5.2 دو درجی مساوات کی تفصیل جس کے روٹس (Roots) درج ذیل اقسام کے ہوں:

- (i)  $2\alpha + 1, 2\beta + 1$  (ii)  $\alpha^2, \beta^2$  (iii)  $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$  (iv)  $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$  (v)  $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$

جبکہ  $\alpha, \beta$  دی ہوئی دو درجی مساوات کے روٹس ہوں۔

**مثال 2:** اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $2x^2 - 3x - 5 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو دیے ہوئے روٹس سے مساوات

بنائیے۔

(i)  $2\alpha + 1, 2\beta + 1$  (ii)  $\alpha^2, \beta^2$  (iii)  $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$

(iv)  $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$  (v)  $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$

**حل:** چونکہ  $\alpha, \beta$  مساوات  $2x^2 - 3x - 5 = 0$  کے روٹس ہیں۔

اس لیے  $\alpha + \beta = -\left(\frac{-3}{2}\right) = \frac{3}{2}$  اور  $\alpha\beta = \frac{-5}{2} = -\frac{5}{2}$

(i)  $S =$  روٹس کا مجموعہ  $= 2\alpha + 1 + 2\beta + 1$

$$= 2(\alpha + \beta) + 2 = 2\left(\frac{3}{2}\right) + 2 = 5$$

$P =$  روٹس کا حاصل ضرب  $= (2\alpha + 1)(2\beta + 1)$

$$= 4\alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 1$$

$$= 4\left(-\frac{5}{2}\right) + 2\left(\frac{3}{2}\right) + 1$$

$$= -10 + 3 + 1 = -6$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

اب

$x^2 - (5)x + (-6) = 0 \Rightarrow x^2 - 5x - 6 = 0$  اور  $S$  کو استعمال کرنے سے

(ii)  $S =$  روٹس کا مجموعہ  $= \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$

$$= \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2\left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{9}{4} + 5 = \frac{29}{4}$$

$P =$  روٹس کا حاصل ضرب  $= \alpha^2 \cdot \beta^2 = (\alpha\beta)^2 = \left(-\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

اب

$x^2 - \frac{29}{4}x + \frac{25}{4} = 0 \Rightarrow 4x^2 - 29x + 25 = 0$  اور  $S$  کو استعمال کرنے سے

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad S = \text{روٹس کا مجموعہ} &= \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta} = (\alpha + \beta) \cdot \frac{1}{\alpha\beta} \\
 &= \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) \quad (\because \alpha\beta = -\frac{5}{2}) \\
 &= -\frac{3}{5}
 \end{aligned}$$

$$P = \text{روٹس کا حاصل ضرب} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha\beta} = -\frac{2}{5} \quad (\because \alpha\beta = -\frac{5}{2})$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

اب

$$x^2 - \left(-\frac{3}{5}\right)x + \left(-\frac{2}{5}\right) = 0 \Rightarrow 5x^2 + 3x - 2 = 0 \quad \text{P اور S کو استعمال کرنے سے}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iv)} \quad S = \text{روٹس کا مجموعہ} &= \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = [(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta] \cdot \frac{1}{\alpha\beta} \\
 &= \left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2\left(-\frac{5}{2}\right)\right] \times \left(-\frac{2}{5}\right) \quad (\because \alpha\beta = -\frac{5}{2}) \\
 &= \left(\frac{9}{4} + 5\right) \times \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{29}{4} \times \left(-\frac{2}{5}\right) = -\frac{29}{10}
 \end{aligned}$$

$$P = \text{روٹس کا حاصل ضرب} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = 1$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

اب

$$x^2 - \left(-\frac{29}{10}\right)x + 1 = 0 \Rightarrow 10x^2 + 29x + 10 = 0 \quad \text{P اور S کو استعمال کرنے سے}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(v)} \quad S = \text{روٹس کا مجموعہ} &= \alpha + \beta + \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \alpha + \beta + \frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta} \\
 &= (\alpha + \beta) \left(1 + \frac{1}{\alpha\beta}\right) = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{2}{5}\right) = \frac{3}{2} \times \frac{3}{5} \\
 &= \frac{9}{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P = \text{روٹس کا حاصل ضرب} &= (\alpha + \beta) \cdot \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right) = (\alpha + \beta) \left(\frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta}\right) \\
 &= (\alpha + \beta)^2 \times \frac{1}{\alpha\beta} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \times \left(-\frac{2}{5}\right) \\
 &= \frac{9}{4} \times \left(-\frac{2}{5}\right) = -\frac{9}{10}
 \end{aligned}$$

$$x^2 - Sx + P = 0$$

اب



$$x^2 - \frac{9}{10}x + \left(-\frac{9}{10}\right) = 0 \Rightarrow 10x^2 - 9x - 9 = 0 \quad \text{P اور S کو استعمال کرنے سے}$$

**مثال 3:** اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $x^2 - 7x + 9 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو ایسی مساوات تشکیل دیں جس کے روٹس  $2\alpha$  اور  $2\beta$  ہوں۔

**حل:** کیونکہ  $\alpha, \beta$  مساوات  $x^2 - 7x + 9 = 0$  کے روٹس ہیں۔ اس لیے

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\left(\frac{-7}{1}\right) = 7$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{9}{1} = 9$$

اور

$2\alpha$  اور  $2\beta$  مطلوبہ مساوات کے روٹس (Roots) ہیں۔

$$S = \text{روٹس کا مجموعہ} = 2\alpha + 2\beta = 2(\alpha + \beta) = 2(7) = 14$$

$$P = \text{روٹس کا حاصل ضرب} = (2\alpha)(2\beta) = 4\alpha\beta = 4(9) = 36$$

پس مطلوبہ دو درجی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$x^2 - Sx + P = 0$$

یعنی

$$x^2 - 14x + 36 = 0$$

## مشق 2.5

1- مندرجہ ذیل روٹس (Roots) والی دو درجی مساواتیں لکھیں۔

- |                    |                                  |            |
|--------------------|----------------------------------|------------|
| (a) 1, 5           | (b) 4, 9                         | (c) -2, 3  |
| (d) 0, -3          | (e) 2, -6                        | (f) -1, -7 |
| (g) $1 + i, 1 - i$ | (h) $3 + \sqrt{2}, 3 - \sqrt{2}$ |            |

2- اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $x^2 - 3x + 6 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو دیے ہوئے روٹس (Roots) سے مساواتیں بنائیں۔

- |  |  |   |
|--|--|---|
| (a) $2\alpha + 1, 2\beta + 1$                    | (b) $\alpha^2, \beta^2$                                  | (c) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ |
| (d) $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ | (e) $\alpha + \beta, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ |   |

3- اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $x^2 + px + q = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو دیے ہوئے روٹس (Roots) سے مساواتیں بنائیں۔

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| (a) $\alpha^2, \beta^2$ | (b) $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ |
|-------------------------|--|

## 2.6 ترکیبی تقسیم (Synthetic Division)

ترکیبی تقسیم کے عمل سے ہم کثیر رقمی کو یک درجی کثیر رقمی سے تقسیم کر کے حاصل قسمت اور باقی معلوم کرتے ہیں۔ درحقیقت ترکیبی تقسیم، تقسیم کا ایک مختصر طریقہ ہے۔

### 2.6.1 ترکیبی تقسیم کا طریقہ کار:

درج ذیل مثال میں ترکیبی تقسیم کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے۔

**مثال 1:** ترکیبی تقسیم کے طریقہ سے کثیر رقمی  $P(x) = 5x^4 + x^3 - 3x$  کو  $x - 2$  پر تقسیم کیجیے۔

**حل:**  $(5x^4 + x^3 - 3x) \div (x - 2)$

یہاں تقسیم کنندہ  $x - a$  میں  $a = 2$

اب مقسوم علیہ کے عددی سروں کو دیے ہوئے طریقہ سے نیچے ترکیب نزولی میں اور غیر موجود  $x$  کے عددی سر کو صفر لکھیں۔

$$P(x) = 5x^4 + 1 \times x^3 + 0 \times x^2 - 3x + 0 \times x^0$$

اب مقسوم علیہ سے  $x$  کے عددی سروں کو ایک قطار میں اور  $a = 2$  کو بائیں طرف لکھیں۔

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   | 5 | 1  | 0  | -3 | 0  |
| 2 | ↓ | 10 | 22 | 44 | 82 |
|   | 5 | 11 | 22 | 41 | 82 |

(i) پہلے عددی سر 5 کو قطار میں افقی قطعہ خط کے نیچے لکھیں۔

(ii) 5 کو 2 سے ضرب دیں اور جواب 10 کو 1 کے نیچے لکھیں۔ مجموعہ  $10 + 1 = 11$  کو افقی قطعہ خط کے نیچے لکھیں۔

(iii) 11 کو 2 سے ضرب دے کر جواب 22 کو 0 کے نیچے لکھیں۔ 0 اور 22 کو جمع کر کے جواب 22 افقی قطعہ خط کے نیچے لکھیں۔

(iv) 22 کو 2 سے ضرب دے کر جواب 44 کو -3 کے نیچے لکھیں۔ 44 اور -3 کے مجموعہ 41 کو افقی قطعہ خط کے نیچے لکھیں۔

(v) 41 کو 2 سے ضرب دیں اور جواب 82 کو 0 کے نیچے لکھیں۔ 82 اور 0 کا مجموعہ 82 ہے۔

آخری قطار میں باقی 82 کو راسی قطعہ خط سے الگ کیا گیا ہے اور 5، 11، 22، 41 حاصل قسمت کے عددی سر

ہیں۔

جیسا کہ مقسوم علیہ میں  $x$  کی سب سے بڑی قوت 4 ہے۔ اس لیے حاصل قسمت میں  $x$  کی سب سے بڑی قوت

$$4 - 1 = 3$$

پس  $Q(x) = 5x^3 + 11x^2 + 22x + 41$  حاصل قسمت

اور  $R = 82$  باقی



## 2.6.2 ترکیبی تقسیم کے استعمال سے:

(a) دی ہوئی کثیر رتی کو یک درجی کثیر رتی (Linear polynomial) سے تقسیم کر کے حاصل قسمت (Quotient) اور باقی (Remainder) معلوم کرنا:

مثال 2: ترکیبی تقسیم کے استعمال سے  $P(x) = x^4 - x^2 + 15$  کو  $x + 1$  سے تقسیم کیجیے۔

حل:

$$(x^4 - x^2 + 15) \div (x + 1)$$

$$a = -1 \quad \text{پس} \quad x + 1 = x - (-1)$$

اب مقسوم علیہ کے عددی سروں کو ایک قطار میں اور  $a = -1$  کو بائیں طرف لکھیں۔

|    |   |    |    |   |    |
|----|---|----|----|---|----|
|    | 1 | 0  | -1 | 0 | 15 |
| -1 | ↓ | -1 | 1  | 0 | 0  |
|    | 1 | -1 | 0  | 0 | 15 |

$$\text{اس لیے} \quad Q(x) = x^3 - x^2 + 0 \cdot x + 0 = x^3 - x^2$$

$$\text{باقی} = 15$$

اور

(b) اگر کثیر رتی کے زیر دئیے ہوں تو متغیر/متغیروں کی قیمت/قیمتیں معلوم کرنا۔

مثال 3: اگر  $1$ ، کثیر رتی  $P(x) = 3x^2 + 4x - 7h$  کا زیر ہو تو ترکیبی تقسیم کے استعمال سے  $h$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

حل:

$$P(x) = 3x^2 + 4x - 7h$$

اور  $1$ ، کثیر رتی کا زیر ہو تو ترکیبی تقسیم کے طریقہ سے

|   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
|   | 3 | 4 | -7h    |
| 1 | ↓ | 3 | 7      |
|   | 3 | 7 | 7 - 7h |

$$\text{باقی} = 7 - 7h$$

کیونکہ  $1$ ، کثیر رتی کا زیر ہے۔

$$\text{باقی} = 0$$

اس لیے

$$7 - 7h = 0$$

یعنی

$$7 = 7h \Rightarrow h = 1$$

(c) اگر کثیر رتی کے اجزائے ضربی دیئے ہوں تو متغیر/متغیروں کی قیمت/قیمتیں معلوم کرنا۔

مثال 4: اگر  $x - 1$  اور  $x + 1$  کثیر رتی  $P(x) = x^3 + 3lx^2 + mx - 1$  کے اجزائے ضربی ہوں تو ترکیبی تقسیم کے

استعمال سے  $l$  اور  $m$  کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

حل: کیونکہ  $x - 1$  اور  $x + 1$  کثیر رتی  $P(x) = x^3 + 3lx^2 + mx - 1$  کے اجزائے ضربی ہیں۔ اس لیے  $1$  اور

”-1“ کثیر رقمی  $P(x)$  کے زیر وز ہیں۔  
اب ترکیبی تقسیم سے

|   |   |      |        |        |
|---|---|------|--------|--------|
|   | 1 | 3l   | m      | -1     |
| 1 | ↓ | 1    | 3l+1   | 3l+m+1 |
|   | 1 | 3l+1 | 3l+m+1 | 3l+m   |

کیونکہ '1' کثیر رقمی کا صفر ہے۔ اس لیے باقی صفر ہے۔ یعنی

$$3l + m = 0 \quad (i)$$

اور

|    |   |      |         |        |
|----|---|------|---------|--------|
|    | 1 | 3l   | m       | -1     |
| -1 | ↓ | -1   | -3l+1   | 3l-m-1 |
|    | 1 | 3l-1 | -3l+m+1 | 3l-m-2 |

کیونکہ '1' کثیر رقمی کا زیرو ہے اس لیے باقی صفر ہے۔

$$3l - m - 2 = 0 \quad (ii)$$

یعنی

مساوات (i) اور (ii) کو جمع کرنے سے

$$6l - 2 = 0$$

$$6l = 2 \Rightarrow l = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

l کی قیمت مساوات (i) میں درج کرنے سے

$$3\left(\frac{1}{3}\right) + m = 0 \text{ or } 1 + m = 0 \Rightarrow m = -1$$

$$l = \frac{1}{3} \text{ اور } m = -1 \quad \text{پس}$$

(d) اگر مساوات کا ایک روٹ دیا ہوا ہو تو تین درجی مساوات حل کرنا۔

مثال 5: ترکیبی تقسیم کے استعمال سے مساوات  $3x^3 - 11x^2 + 5x + 3 = 0$  کو حل کیجیے جب 3 مساوات کا روٹس

ہے۔

حل: کیونکہ 3 مساوات  $3x^3 - 11x^2 + 5x + 3 = 0$  کا روٹ ہے۔

تب ترکیبی تقسیم سے ہم حاصل کرتے ہیں۔

|   |   |     |    |    |
|---|---|-----|----|----|
|   | 3 | -11 | 5  | 3  |
| 3 | ↓ | 9   | -6 | -3 |
|   | 3 | -2  | -1 | 0  |

$$3x^2 - 2x - 1 = 0$$

اس لیے کم درجے والی مساوات



$$3x^2 - 3x + x - 1 = 0$$

$$3x(x - 1) + 1(x - 1) = 0$$

$$(x - 1)(3x + 1) = 0$$

$$x - 1 = 0 \quad \text{یا} \quad 3x + 1 = 0,$$

$$x = 1 \quad \text{یا} \quad 3x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{3} \quad \text{یعنی}$$

پس 1, 3 اور  $-\frac{1}{3}$  دی ہوئی مساوات کے روٹس ہیں۔

(e) اگر مساوات کے دو حقیقی روٹس (Roots) دیے گئے ہوں تو چار درجی مساوات حل کرنا:

**مثال 6:** ترکیبی تقسیم کے طریقہ سے مساوات  $x^4 - 49x^2 + 36x + 252 = 0$  کو حل کریں جب 2- اور 6 اس کے روٹس (Roots) ہوں۔

**حل:** کیونکہ 2- اور 6 دی ہوئی مساوات  $x^4 - 49x^2 + 36x + 252 = 0$  کے روٹس ہیں۔  
ترکیبی تقسیم سے

|    |   |    |     |      |      |
|----|---|----|-----|------|------|
|    | 1 | 0  | -49 | 36   | 252  |
| -2 | ↓ | -2 | 4   | 90   | -252 |
|    | 1 | -2 | -45 | 126  | 0    |
| 6  |   | 6  | 24  | -126 |      |
|    | 1 | 4  | -21 | 0    |      |

اس لیے کم درجے والی مساوات

$$x^2 + 4x - 21 = 0$$

$$x^2 + 7x - 3x - 21 = 0$$

$$x(x + 7) - 3(x + 7) = 0$$

$$(x + 7)(x - 3) = 0$$

$$x + 7 = 0 \quad \text{یا} \quad x - 3 = 0$$

$$x = -7 \quad \text{یا} \quad x = 3$$

پس -2, 6, -7 اور 3 دی ہوئی مساوات کے روٹس (Roots) ہیں۔

## مشق 2.6

1- ترکیبی تقسیم کو استعمال کرتے ہوئے حاصل قسمت اور باقی معلوم کیجیے۔ جب

(i)  $(x^2 + 7x - 1) \div (x + 1)$  (ii)  $(4x^3 - 5x + 15) \div (x + 3)$

(iii)  $(x^3 + x^2 - 3x + 2) \div (x - 2)$

2- ترکیبی تقسیم کے استعمال سے  $h$  کی قیمت معلوم کیجیے اگر

(i) عدد '3' کثیر رقی  $2x^3 - 3hx^2 + 9$  کا زیر ہو۔

(ii) عدد '1' کثیر رقی  $x^3 - 2hx^2 + 11$  کا زیر ہو۔

(iii) عدد '-1' کثیر رقی  $2x^3 + 5hx - 23$  کا زیر ہو۔

3- ترکیبی تقسیم کے استعمال سے  $l$  اور  $m$  کی قیمتیں معلوم کیجیے اگر

(i)  $(x + 3)$  اور  $(x - 2)$  کثیر رقی  $x^3 + 4x^2 + 2lx + m$  کے اجزائے ضربی ہوں۔

(ii)  $(x - 1)$  اور  $(x + 1)$  کثیر رقی  $x^3 - 3lx^2 + 2mx + 6$  کے اجزائے ضربی ہوں۔

4- بذریعہ ترکیبی تقسیم حل کیجیے اگر

(i) عدد '2' مساوات  $x^3 - 28x + 48 = 0$  کا روٹ ہو۔

(ii) عدد '3' مساوات  $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$  کا روٹ ہو۔

(iii) عدد '-1' مساوات  $4x^3 - x^2 - 11x - 6 = 0$  کا روٹ ہو۔

5- بذریعہ ترکیبی تقسیم حل کیجیے اگر

(i) '1' اور '3' مساوات  $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں۔

(ii) '3' اور '-4' مساوات  $x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں۔

## 2.7 ہمزا مساواتیں (Simultaneous Equations)

دو متغیروں میں دو مساواتیں جس کا حل سیٹ مشترک ہو وہ ہمزا مساواتیں کہلاتی ہیں۔

تمام مترتب جوڑوں  $(x, y)$  کا وہ سیٹ جو ہمزا مساواتوں کو درست ثابت کرے ان کا حل سیٹ کہلاتا ہے۔

2.7(ii) دو متغیروں کی دو مساواتوں کو حل کرنا:

(a) جب ایک مساوات یک درجی اور دوسری دو درجی ہو:

ہمزا مساواتوں کو حل کرنے کے لیے ہم یک درجی مساوات میں  $y$  کی قیمت کو  $x$  کی فارم میں تبدیل کر کے دو درجی مساوات میں رکھنے سے  $x$  میں دو درجی مساوات حاصل کرتے ہیں۔  $x$  والی دو درجی مساوات کو حل کرنے سے  $x$  کی دو قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔  $x$  کی ہر قیمت سے  $y$  کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ مترتب جوڑے  $(x, y)$  ہمزا مساواتوں کا حل سیٹ ہوتے ہیں۔



**مثال 1:** ہمزاد مساواتوں  $3x^2 + y^2 = 52$  اور  $3x + y = 4$  کو حل کیجیے۔

**حل:** دی ہوئی مساواتیں

$$3x + y = 4 \quad (i)$$

$$3x^2 + y^2 = 52 \quad (ii)$$

اور

مساوات (i) سے

$$y = 4 - 3x \quad (iii)$$

y کی قیمت مساوات (ii) میں درج کرنے سے

$$3x^2 + (4 - 3x)^2 = 52$$

$$3x^2 + 16 - 24x + 9x^2 - 52 = 0$$

$$12x^2 - 24x - 36 = 0 \quad \text{یا} \quad x^2 - 2x - 3 = 0$$

تجزی کرنے سے

$$x^2 - 3x + x - 3 = 0$$

$$x(x - 3) + 1(x - 3) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$$

$$x - 3 = 0 \quad \text{یا} \quad x + 1 = 0$$

$$x = 3 \quad \text{یا} \quad x = -1$$

x کی قیمتیں مساوات (iii) میں درج کرنے سے

$$x = 3 \quad \text{جب} \quad x = -1 \quad \text{جب}$$

$$y = 4 - 3x \quad \text{تو} \quad y = 4 - 3x \quad \text{تو}$$

$$y = 4 - 3(3) = 4 - 9 \quad y = 4 - 3(-1) = 4 + 3$$

$$y = -5 \quad y = 7$$

اس لیے مرتب جوڑے  $(3, -5)$  اور  $(-1, 7)$  بنتے ہیں۔

پس حل سیٹ  $\{(3, -5), (-1, 7)\}$  ہے۔

**(b) جب دونوں مساواتیں دو درجی ہوں:**

مساواتوں کو حل کرنے کا طریقہ مندرجہ ذیل مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔

**مثال 2:** مساواتوں  $x^2 + y^2 + 2x = 8$  اور  $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 8$  کو حل کیجیے۔

**حل:** دی ہوئی مساواتیں یہ ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 2x = 8 \quad (i)$$

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 8 \quad (ii)$$

مساوات (ii) سے ہم حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 = 8$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 2y = 6$$

یا (iii)

مساوات (iii) کو مساوات (ii) سے تفریق کرنے سے

$$4x - 2y = 2 \quad \text{یا} \quad 2x - y = 1 \Rightarrow y = 2x - 1 \quad \text{(iv)}$$

مساوات (ii) میں  $y$  کی قیمت درج کرنے سے

$$(x - 1)^2 + (2x - 1 + 1)^2 = 8$$

$$x^2 - 2x + 1 + 4x^2 - 8 = 0$$

$$5x^2 - 2x - 7 = 0$$

$$5x^2 - 7x + 5x - 7 = 0 \quad \text{یا} \quad x(5x - 7) + 1(5x - 7) = 0$$

$$\Rightarrow (5x - 7)(x + 1) = 0$$

$$5x - 7 = 0 \quad \text{یا} \quad x + 1 = 0$$

$$5x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{5} \quad \text{یا} \quad x = -1 \quad \text{یعنی}$$

$x$  کی قیمتیں مساوات (iv) میں درج کرنے سے

$$x = \frac{7}{5} \quad \text{جب}$$

$$y = 2\left(\frac{7}{5}\right) - 1 \quad \text{تو}$$

$$y = \frac{14}{5} - 1 = \frac{14 - 5}{5} = \frac{9}{5}$$

$$x = -1 \quad \text{جب}$$

$$y = 2(-1) - 1 \quad \text{تو}$$

$$y = -3$$

پس حل سیٹ  $\left\{(-1, -3), \left(\frac{7}{5}, \frac{9}{5}\right)\right\}$  ہے۔

**مثال 3:** مساواتوں  $x^2 + y^2 = 7$  اور  $2x^2 + 3y^2 = 18$  کو حل کیجیے۔

**حل:** دی ہوئی مساواتیں یہ ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 7 \quad \text{(i)}$$

$$2x^2 + 3y^2 = 18 \quad \text{(ii)}$$

مساوات (i) کو 3 سے ضرب دینے سے

$$3x^2 + 3y^2 = 21 \quad \text{(iii)}$$

مساواتوں (ii) کو (iii) سے تفریق کرنے سے

$$x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$$



جب  $x = \sqrt{3}$  ہو تو مساوات (i) سے

$$x^2 + y^2 = 7 \quad \text{یا} \quad 3 + y^2 = 7 \Rightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm 2$$

$$y = \pm 2 \quad \text{تو} \quad x = -\sqrt{3} \quad \text{جب}$$

پس مطلوبہ حل سیٹ  $\{(\pm\sqrt{3}, \pm 2)\}$  ہے۔

**مثال 4:** مساواتوں  $x^2 + y^2 = 20$  اور  $6x^2 + xy - y^2 = 0$  کو حل کیجیے۔

**حل:** دی ہوئی مساواتیں یہ ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 20 \quad (i)$$

$$6x^2 + xy - y^2 = 0 \quad (ii)$$

مساوات (ii) کو یوں لکھنے سے

$$y^2 - xy - 6x^2 = 0$$

$$\Rightarrow y = \frac{-(-x) \pm \sqrt{(-x)^2 - 4 \times 1 \times (-6x^2)}}{2 \times 1}$$

$$= \frac{x \pm \sqrt{x^2 + 24x^2}}{2} = \frac{x \pm \sqrt{25x^2}}{2} = \frac{x \pm 5x}{2}$$

$$y = \frac{x + 5x}{2} = \frac{6x}{2} = 3x \quad \text{یا} \quad y = \frac{x - 5x}{2} = \frac{-4x}{2} = -2x$$

مساوات (i) میں  $y = 3x$  درج کرنے سے

$$x^2 + (3x)^2 = 20 \quad \text{یا} \quad x^2 + 9x^2 = 20$$

$$\Rightarrow 10x^2 = 20 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

$$\text{جب } x = \sqrt{2} \text{ ہو تو } y = 3(\sqrt{2}) = 3\sqrt{2} \quad \text{اور جب } x = -\sqrt{2} \text{ ہو تو } y = 3(-\sqrt{2}) = -3\sqrt{2}$$

مساوات (i) میں  $y = -2x$  درج کرنے سے

$$x^2 + (-2x)^2 = 20 \quad \text{یا} \quad x^2 + 4x^2 = 20$$

$$\Rightarrow 5x^2 = 20 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$\text{جب } x = 2 \text{ ہو تو } y = -2(2) = -4 \quad \text{اور جب } x = -2 \text{ ہو تو } y = -2(-2) = 4$$

$$\text{پس حل سیٹ } \{(\sqrt{2}, 3\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, -3\sqrt{2}), (2, -4), (-2, 4)\} \text{ ہے۔}$$

**مثال 5:** مساواتوں  $x^2 + y^2 = 40$  اور  $3x^2 - 2xy - y^2 = 80$  کو حل کیجیے۔

**حل:** دی ہوئی مساواتیں یہ ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 40 \quad (i)$$

$$3x^2 - 2xy - y^2 = 80 \quad (ii)$$

مساوات (i) کو 2 سے ضرب دینے سے

$$2x^2 + 2y^2 = 80$$

(iii)

مساوات (iii) کو مساوات (ii) سے تفریق کرنے سے

$$x^2 - 2xy - 3y^2 = 0$$

(iv)

مساوات (iv) کی تجزی کرنے سے

$$x^2 - 3xy + xy - 3y^2 = 0$$

$$x(x - 3y) + y(x - 3y) = 0 \quad \text{یا}$$

$$\Rightarrow (x - 3y)(x + y) = 0$$

$$x - 3y = 0 \quad \text{یا} \quad x + y = 0$$

$$x = 3y \quad \text{یا} \quad x = -y$$

مساوات (i) میں درج کرنے سے

$$(3y)^2 + y^2 = 40$$

$$10y^2 = 40$$

$$y^2 = 4$$

$$y = \pm 2$$

$$y = 2$$

$$x = 3y$$

$$x = 3(2)$$

$$x = 6$$

$$y = -2$$

$$x = 3y$$

$$x = 3(-2)$$

$$x = -6$$

$$(-y)^2 + y^2 = 40$$

$$2y^2 = 40$$

$$y^2 = 20$$

$$y = \pm 2\sqrt{5}$$

$$y = 2\sqrt{5}$$

$$x = -y$$

$$x = -(2\sqrt{5})$$

$$x = -2\sqrt{5}$$

$$y = -2\sqrt{5}$$

$$x = -y$$

$$x = -(-2\sqrt{5})$$

$$= 2\sqrt{5}$$

اس لیے حل سیٹ  $\{(6, 2), (-6, -2), (2\sqrt{5}, -2\sqrt{5}), (-2\sqrt{5}, 2\sqrt{5})\}$  ہے۔

## مشق 2.7

مندرجہ ذیل مساواتیں حل کریں۔

$$1. \quad x + y = 5 \quad ; \quad x^2 - 2y - 14 = 0$$

$$2. \quad 3x - 2y = 1 \quad ; \quad x^2 + xy - y^2 = 1$$

$$3. \quad x - y = 7 \quad ; \quad \frac{2}{x} - \frac{5}{y} = 2$$

$$4. \quad x + y = a - b \quad ; \quad \frac{a}{x} - \frac{b}{y} = 2$$

$$5. \quad x^2 + (y - 1)^2 = 10 \quad ; \quad x^2 + y^2 + 4x = 1$$

$$6. \quad (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 5 \quad ; \quad (x + 2)^2 + y^2 = 5$$

$$7. \quad x^2 + 2y^2 = 22 \quad ; \quad 5x^2 + y^2 = 29$$



- |     |                   |   |                          |
|-----|-------------------|---|--------------------------|
| 8.  | $4x^2 - 5y^2 = 6$ | ; | $3x^2 + y^2 = 14$        |
| 9.  | $7x^2 - 3y^2 = 4$ | ; | $2x^2 + 5y^2 = 7$        |
| 10. | $x^2 + 2y^2 = 3$  | ; | $x^2 + 4xy - 5y^2 = 0$   |
| 11. | $3x^2 - y^2 = 26$ | ; | $3x^2 - 5xy - 12y^2 = 0$ |
| 12. | $x^2 + xy = 5$    | ; | $y^2 + xy = 3$           |
| 13. | $x^2 - 2xy = 7$   | ; | $xy + 3y^2 = 2$          |

## (ii) 2.7 روز مسرہ زندگی سے متعلق سوالات کو دو درجی مساوات کی مدد سے حل کرنا:

کئی سوالات کو دو درجی مساوات کی مدد سے حل کیا جاسکتا ہے۔ ایک مساوات بنانے میں نامعلوم مقداروں کے لیے علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ مساواتوں کے جوابات ان کے روٹس (Roots) کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں۔

**مثال 1:** کسی عدد سے 3 کم کرنے اور دو گنا عدد سے 9 تفریق کرنے سے حاصل ضرب 104 بنتا ہے۔ عدد معلوم کریں۔

**حل:** فرض کریں کہ مطلوبہ عدد  $x$  ہے۔

$$\text{عدد سے 3 کم} = x - 3$$

$$\text{اور عدد کے دو گنا سے 9 کم} = 2x - 9$$

سوال کی شرط کے مطابق

$$(x - 3)(2x - 9) = 104$$

$$2x^2 - 15x + 27 = 104$$

$$2x^2 - 15x - 77 = 0$$

تجزی کرنے سے

$$2x^2 + 7x - 22x - 77 = 0$$

$$x(2x + 7) - 11(2x + 7) = 0$$

$$(2x + 7)(x - 11) = 0 \Rightarrow x = -\frac{7}{2}, \quad x = 11$$

یعنی مطلوبہ اعداد  $-\frac{7}{2}$  اور 11 ہیں۔

**مثال 2:** ایک مستطیل کی لمبائی، چوڑائی سے 4 سم زیادہ ہے۔ اگر مستطیل کا رقبہ 45 مربع سم ہو تو اس کے اضلاع کی لمبائی معلوم کیجیے۔

**حل:** فرض کریں کہ سم میں چوڑائی  $x$  ہے تو لمبائی  $x + 4$  ہوگی۔

$$x(x + 4) = 45$$

$$x^2 + 4x - 45 = 0$$

$$(x + 9)(x - 5) = 0$$

دی ہوئی شرط کے مطابق

$$x + 9 = 0 \Rightarrow x = -9 \quad \text{یا}$$

$$x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$$

(منفی قیمت کو نظر انداز کرتے ہوئے)

$$x + 4 = 5 + 4 = 9 \text{ تو } x = 5 \text{ اگر}$$

پس چوڑائی 5 سم اور لمبائی 9 سم ہے۔

**مثال 3:** ایک نقطہ کے محددات کا مجموعہ 6 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ 20 ہے۔ نقطہ کے محددات معلوم کیجیے۔

**حل:** فرض کریں کہ  $(x, y)$  نقطہ کے محدد ہیں۔

دی ہوئی شرائط کے مطابق

$$x + y = 6$$

(i)

$$x^2 + y^2 = 20$$

(ii)

$$y = 6 - x$$

(iii)

مساوات (i) سے

مساوات (ii) میں  $y = 6 - x$  درج کرنے سے

$$x^2 + (6 - x)^2 = 20$$

$$x^2 + 36 + x^2 - 12x - 20 = 0$$

$$2x^2 - 12x + 16 = 0 \quad \text{یا} \quad x^2 - 6x + 8 = 0$$

تجزی کرنے سے

$$(x - 4)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 4 \quad \text{یا} \quad x = 2$$

مساوات (iii) کے استعمال سے

$$y = 6 - 4 = 2 \quad \text{یا} \quad y = 6 - 2 = 4$$

پس نقطہ کے محددات  $(4, 2)$  یا  $(2, 4)$  ہیں۔

## مشق 2.8

- 1- دو مسلسل مثبت اعداد کا حاصل ضرب 182 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔
- 2- تین مسلسل مثبت اعداد کے مربعوں کا مجموعہ 77 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔
- 3- ایک عدد کے 5 گنا اور اس کے مربع کا مجموعہ 204 ہے۔ عدد معلوم کیجیے۔
- 4- ایک عدد کے 3 گنا سے 5 کم اور 4 گنا سے 1 کم کا حاصل ضرب 7 ہے۔ عدد معلوم کیجیے۔
- 5- ایک عدد اور اس کے معکوس کا فرق  $\frac{15}{4}$  ہے۔ عدد معلوم کیجیے۔
- 6- ایک مثبت صحیح عدد کے دو ہندسوں کے مربعوں کا مجموعہ 65 ہے اور عدد اپنے ہندسوں کے مجموعے کا 9 گنا ہے۔ عدد معلوم کیجیے۔



- 7- ایک نقطہ کے محدعات کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ 45 ہے۔ نقطہ کے محدعات معلوم کیجیے۔  
 8- دو صحیح اعداد کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا فرق بھی 9 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔  
 9- دو صحیح اعداد کا فرق 4 ہے اور ان کے مربعوں کا فرق 72 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔  
 10- ایک مستطیل کے اضلاع معلوم کیجیے جس کا احاطہ 80 سم اور اس کا رقبہ 375 مربع سم ہے۔

## مفرد مشق 2

### کثیر الانتخابی سوالات

- 1- دیے گئے سوالات کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست کے لیے (✓) لگائیں۔
- (i) اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $3x^2 + 5x - 2 = 0$  کے روٹس ہوں تو  $\alpha + \beta$  برابر ہے۔  
 (a)  $\frac{5}{3}$  (b)  $\frac{3}{5}$  (c)  $-\frac{5}{3}$  (d)  $-\frac{2}{3}$
- (ii) اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $7x^2 - x + 4 = 0$  کے روٹس ہوں تو  $\alpha\beta$  برابر ہے۔  
 (a)  $-\frac{1}{7}$  (b)  $\frac{4}{7}$  (c)  $\frac{7}{4}$  (d)  $-\frac{4}{7}$
- (iii) مساوات  $4x^2 - 5x + 2 = 0$  کے روٹس ہیں۔  
 (a) غیر ناطق (b) غیر حقیقی (c) ناطق (d) کوئی نہیں
- (iv) '1' کے جذور الملعب ہیں۔  
 (a)  $-1, -\omega, -\omega^2$  (b)  $-1, \omega, -\omega^2$  (c)  $-1, -\omega, \omega^2$  (d)  $1, -\omega, -\omega^2$
- (v) اکائی کے جذور الملعب کا مجموعہ ہے۔  
 (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) 3
- (vi) اکائی کے جذور الملعب کا حاصل ضرب ہے۔  
 (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) 3
- (vii) اگر  $b^2 - 4ac < 0$  ہو تو مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس ہوتے ہیں۔  
 (a) غیر ناطق (b) ناطق (c) غیر حقیقی (d) کوئی نہیں
- (viii) اگر  $b^2 - 4ac > 0$  لیکن مکمل مربع نہ ہو تو مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس ہیں۔  
 (a) غیر حقیقی (b) ناطق (c) غیر ناطق (d) کوئی نہیں

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \text{ برابر ہے۔} \quad (\text{ix})$$

$$\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} \quad (\text{d})$$

$$\frac{\alpha - \beta}{\alpha\beta} \quad (\text{c})$$

$$\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} \quad (\text{b})$$

$$\frac{1}{\alpha} \quad (\text{a})$$

$$\alpha^2 + \beta^2 \text{ برابر ہے۔} \quad (\text{x})$$

$$\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} \quad (\text{b})$$

$$\alpha^2 - \beta^2 \quad (\text{a})$$

$$\alpha + \beta \quad (\text{d})$$

$$(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \quad (\text{c})$$

اکائی کے دو جذر المربع ہیں۔ (xi)

$$\omega, \omega^2 \quad (\text{d})$$

$$1, -\omega \quad (\text{c})$$

$$1, \omega \quad (\text{b})$$

$$1, -1 \quad (\text{a})$$

مسوات  $4x^2 - 4x + 1 = 0$  کے روٹس ہیں۔ (xii)

غیر ناطق (d)

غیر حقیقی (c)

نابرابر، حقیقی (b)

برابر، حقیقی (a)

اگر  $\alpha, \beta$  مسوات  $px^2 + qx + r = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو  $2\alpha$  اور  $2\beta$  کا مجموعہ ہے۔ (xiii)

$$-\frac{q}{2p} \quad (\text{d})$$

$$-\frac{2q}{p} \quad (\text{c})$$

$$\frac{r}{p} \quad (\text{b})$$

$$-\frac{q}{p} \quad (\text{a})$$

اگر  $\alpha, \beta$  مسوات  $x^2 - x - 1 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو  $2\alpha$  اور  $2\beta$  کا حاصل ضرب ہوتا ہے۔ (xiv)

$$-4 \quad (\text{d})$$

$$4 \quad (\text{c})$$

$$2 \quad (\text{b})$$

$$-2 \quad (\text{a})$$

مسوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس کی اقسام کو ----- کہا جاتا ہے۔ (xv)

روٹس کا حاصل ضرب (b)

روٹس کا مجموعہ (a)

فرق کنندہ (d)

ترکیبی تقسیم (c)

مسوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کا فرق کنندہ ہوتا ہے۔ (xvi)

$$-b^2 - 4ac \quad (\text{d})$$

$$-b^2 + 4ac \quad (\text{c})$$

$$b^2 + 4ac \quad (\text{b})$$

$$b^2 - 4ac \quad (\text{a})$$

## 2- درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔

(i) مندرجہ ذیل مساواتوں کے روٹس (Roots) کی اقسام پر بحث کیجیے۔

$$(a) \quad x^2 + 3x + 5 = 0$$

$$(b) \quad 2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$(c) \quad x^2 + 6x - 1 = 0$$

$$(d) \quad 16x^2 - 8x + 1 = 0$$

$$(ii) \quad \text{اگر } \omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \text{ ہو تو } \omega^2 \text{ معلوم کیجیے۔}$$

(iii) ثابت کریں کہ تمام جذور المکعب کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔

(iv) اکائی کے غیر حقیقی جذور المکعب کا حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

(v) ثابت کیجیے کہ  $x^3 + y^3 = (x + y)(x + \omega y)(x + \omega^2 y)$



(vi)  $\omega^{37} + \omega^{38} + 1$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vii)  $(1 - \omega + \omega^2)^6$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

(viii) اگر  $\omega$  اکائی کا جذر المکعب ہو تو ایسی مساوات بنائیں جس کے روٹس  $3\omega$  اور  $3\omega^2$  ہوں۔

(ix) ترکیبی تقسیم کی مدد سے باقی اور حاصل قسمت معلوم کیجیے جبکہ  $(x^3 + 3x^2 + 2) \div (x - 2)$

(x) ترکیبی تقسیم کی مدد سے ثابت کیجیے کہ  $x^3 + x^2 - 7x + 2$  کا جزو ضربی  $x - 2$  ہے۔

(xi) مساوات  $2px^2 + 3qx - 4r = 0$  کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

(xii) اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $x^2 - 4x + 3 = 0$  کے روٹس ہوں تو  $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

(xiii) اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $4x^2 - 3x + 6 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو معلوم کیجیے۔

(a)  $\alpha^2 + \beta^2$  (b)  $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$  (c)  $\alpha - \beta$

(xiv) اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $x^2 - 5x + 7 = 0$  کے روٹس ہوں تو دیے ہوئے روٹس کی مساوات معلوم کیجیے۔

(a)  $-\alpha, -\beta$  (b)  $2\alpha, 2\beta$

### 3- خالی جگہ پُر کریں۔

(i) مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کا فرق کنندہ \_\_\_\_\_ ہے۔

(ii) اگر  $b^2 - 4ac = 0$  ہو تو مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس \_\_\_\_\_ ہوتے ہیں۔

(iii) اگر  $b^2 - 4ac > 0$  ہو تو مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس \_\_\_\_\_ ہوتے ہیں۔

(iv) اگر  $b^2 - 4ac < 0$  ہو تو مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس \_\_\_\_\_ ہوتے ہیں۔

(v) اگر  $b^2 - 4ac > 0$  اور مکمل مربع ہو تو  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس \_\_\_\_\_ ہوتے ہیں۔

(vi) اگر  $b^2 - 4ac > 0$  اور مکمل مربع نہ ہو تو  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس \_\_\_\_\_ ہوتے ہیں۔

(vii) اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو ان کا مجموعہ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(viii) اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو ان کا حاصل ضرب \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(ix) اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $7x^2 - 5x + 3 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو ان کا مجموعہ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(x) اگر  $\alpha, \beta$  مساوات  $5x^2 + 3x - 9 = 0$  کے روٹس (Roots) ہوں تو ان کا حاصل ضرب \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(xi) دو درجی مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$  کے لیے  $\frac{1}{\alpha\beta}$  \_\_\_\_\_ کے برابر ہوتا ہے۔

(xii) اکائی کے جذر المکعب \_\_\_\_\_ ہیں۔

(xiii) مستعمل علامتوں میں اکائی کے جذر المکعب کا مجموعہ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(xiv) اگر اکائی کے جذر المکعب  $1, \omega, \omega^2$  ہوں تو  $\omega^{-7}$  \_\_\_\_\_ کے برابر ہوتا ہے۔

(xv) اگر  $\alpha, \beta$  دو درجی مساوات کے روٹس (Roots) ہوں تو مساوات کو یوں لکھا جاتا ہے۔

(xvi) اگر  $2\omega$  اور  $2\omega^2$  مساوات کے روٹس (Roots) ہوں تو مساوات ہوتی ہے۔

## خلاصہ

دو درجی مساوات  $ax^2 + bx + c$  کا فرق کنندہ " $b^2 - 4ac$ " ہوتا ہے۔

اکائی کے جذر المکعب  $1, \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$  اور  $\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$  ہوتے ہیں۔

اکائی کے غیر حقیقی جذر المکعب  $\omega$  اور  $\omega^2$  ہیں۔

اکائی کے جذر المکعب کی خصوصیات:

(a) اکائی کے جذر المکعب کا حاصل ضرب "1" کے برابر ہوتا ہے یعنی  $1 \cdot \omega \cdot \omega^2 = \omega^3 = 1$

(b) اکائی کا ہر ایک غیر حقیقی جذر المکعب دوسرے کا معکوس ہے۔

(c) اکائی کا ہر ایک غیر حقیقی جذر المکعب دوسرے کے مربع (Square) کے برابر ہوتا ہے۔

(d) اکائی کے تمام جذر المکعب کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔ یعنی  $1 + \omega + \omega^2 = 0$

دو درجی مساوات  $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$  کے روٹس (Roots)

$$\beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ اور } \alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

دو درجی  $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$  کے روٹس (Roots) کا مجموعہ اور حاصل ضرب بالترتیب

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ اور } \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

دو درجی مساوات کے روٹس پر مشتمل جملے جو تفاعل کو بیان کرتے ہیں۔ اگر روٹس کو بدلنے سے جملے کی قیمت

تبدیل نہ ہو تو ایسے تفاعل کو **سمیٹرک تفاعل** کہتے ہیں۔

اگر روٹس (Roots) دیئے ہوئے ہوں تو دو درجی مساوات بنتی ہے۔

$$x^2 - (\text{اصلوں کا مجموعہ})x + (\text{اصلوں کا حاصل ضرب}) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0.$$

جب کثیر رشتی کو یک درجی کثیر رشتی سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو حاصل قسمت اور باقی معلوم کرنے کے طریقہ کو

**ترکیبی تقسیم** کہتے ہیں۔

دو متغیروں میں دو مساواتیں جن کا حل سیٹ مشترک ہو **ہمزاد مساواتیں** کہلاتی ہیں۔



# تغییرات (VARIATIONS)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

- نسبت، تناسب اور تغیرات (راست اور معکوس) کی تعریف کرنا
- تیسرا، چوتھا، وسط اور مسلسل تناسب معلوم کرنا
- تناسب معلوم کرنے کے لیے عکس نسبت، ابدال نسبت، ترکیب نسبت، تفصیل نسبت اور ترکیب و تفصیل نسبت کے مسئلوں کا استعمال کرنا
- مشترک تغیر کی تعریف
- مشترک تغیر سے متعلق سوالات کا حل کرنا
- تناسب پر مشتمل مشروط مساواتوں کو  $K$ - طریقہ کے استعمال سے حل کرنا
- روزمرہ زندگی میں تغیرات پر مشتمل سوالات کا حل

### 3.1 نسبت، تناسب اور تغیرات

#### (Ratio, Proportions and Variations)

3.1(i) (a) نسبت (b) تناسب اور (c) تغیرات (راست اور معکوس) کی تعریف کریں۔

(a) نسبت (Ratio)

دو ہم قسم مقداروں کے درمیان تعلق **نسبت** کہلاتا ہے۔ اگر  $a$  اور  $b$  دو ہم قسم مقداریں ہوں اور  $b$  صفر نہ ہو تو  $a$  اور  $b$  کی نسبت کو  $a : b$  یا کسر میں  $\frac{a}{b}$  لکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ دونوں مقداروں کی پیمائش کی اکائی ایک ہی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ایک ہاکی کی ٹیم کھیل میں 4 میچ جیتی اور 5 میچ ہارتی ہے۔ تو میچوں میں جیت اور ہار کی نسبت 4:5 یا کسر میں  $\frac{4}{5}$  ہوتی ہے۔

یاد رکھیے۔

- (i) نسبت کے ارکان کی ترتیب اہم ہوتی ہے۔
- (ii) نسبت  $a : b$  میں پہلی رقم  $a$  (antecedent) کہلاتی ہے۔ اور دوسری رقم  $b$  (consequent) کہلاتی ہے۔
- (iii) نسبت کی کوئی اکائی نہیں ہوتی۔

**مثال 1:** نسبت معلوم کریں۔

(i) 200 گرام سے 700 گرام (ii) 1 کلو میٹر سے 600 میٹر

**حل:** (i) 200 گرام سے 700 گرام کی نسبت

$$200 : 700 = \frac{200}{700} = \frac{2}{7} = 2 : 7$$

جبکہ 2 : 7 نسبت 200 : 700 کی آسان (مختصر) شکل ہے۔

(ii) 1 کلو میٹر سے 600 میٹر کی نسبت

کیونکہ 1 کلو میٹر = 1000 میٹر

$$1000 : 600 = \frac{1000}{600} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} = 5 : 3$$

تب

$$1000 : 600 = 1000 : 600 = \frac{1000}{100} : \frac{600}{100}$$

یا

$$= 10 : 6 = 5 : 3$$



**مثال 2:** اگر نسبت  $a + 3 : 7 + a$  اور  $4 : 5$  برابر ہوں۔ تو  $a$  معلوم کیجیے۔

**حل:** کیونکہ نسبتیں  $a + 3 : 7 + a$  اور  $4 : 5$  برابر ہیں۔

اس لیے کسری شکل میں

$$\frac{a+3}{7+a} = \frac{4}{5}$$

$$5(a+3) = 4(7+a)$$

$$5a + 15 = 28 + 4a$$

$$5a - 4a = 28 - 15$$

$$a = 13$$

پس دی ہوئی نسبتیں برابر ہوں گی اگر  $a = 13$  ہو۔

**مثال 3:** اگر نسبت  $3 : 4$  کے ہر عدد میں 2 جمع کیا جائے۔ تو ایک نئی نسبت  $5 : 6$  حاصل ہوتی ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔

**حل:** کیونکہ دو اعداد کی نسبت  $3 : 4$  ہے۔ نسبت کے ہر عدد کو  $x$  سے ضرب دیں تو اعداد  $3x$ ،  $4x$  ہو جاتے ہیں اور

نسبت  $3x : 4x$  ہو جاتی ہے۔

$$\frac{3x+2}{4x+2} = \frac{5}{6}$$

دی ہوئی شرط کے مطابق

$$6(3x+2) = 5(4x+2) \Rightarrow 18x + 12 = 20x + 10$$

$$18x - 20x = 10 - 12 \Rightarrow -2x = -2 \Rightarrow x = 1$$

پس مطلوبہ اعداد درج ذیل ہیں۔

$$4x = 4(1) = 4 \text{ اور } 3x = 3(1) = 3$$

**مثال 4:** اگر  $a : b = 5 : 8$  ہو تو نسبت  $3a + 4b : 5a + 7b$  معلوم کیجیے۔

**حل:** دی ہوئی نسبت  $a : b = 5 : 8$  ہے جس کو کسر میں یوں لکھتے ہیں  $\frac{a}{b} = \frac{5}{8}$

$$3a + 4b : 5a + 7b = \frac{3a + 4b}{5a + 7b}$$

اب

شمار کنندہ اور مخارج کو  $b$  پر تقسیم کرنے سے

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{3a+4b}{b}}{\frac{5a+7b}{b}} = \frac{3\left(\frac{a}{b}\right) + 4\left(\frac{b}{b}\right)}{5\left(\frac{a}{b}\right) + 7\left(\frac{b}{b}\right)} \\ &= \frac{3\left(\frac{5}{8}\right) + 4(1)}{5\left(\frac{5}{8}\right) + 7(1)} \end{aligned}$$

$$\left( \because \frac{a}{b} = \frac{5}{8} \right)$$

$$\frac{\frac{15}{8} + 4}{\frac{25}{8} + 7} = \frac{\frac{15 + 32}{8}}{\frac{25 + 56}{8}} = \frac{47}{81}$$

$$3a + 4b : 5a + 7b = 47 : 81$$

پس

### (b) تناسب (Proportion)

تناسب بیان کردہ دو نسبتوں کی برابری کو ظاہر کرتا ہے۔

اگر دو نسبتیں  $a : b$  اور  $c : d$  برابر ہوں تو ہم ان کو  $a : b = c : d$  لکھ سکتے ہیں۔

پہلی اور آخری مقداروں  $a, d$  کو **طرفین**، جبکہ  $b, c$  کو **وسطین** کہتے ہیں۔ علامت کے طور پر  $d$  اور  $c, a, b$  کو اس

$$a : b :: c : d$$

طرح لکھتے ہیں۔

$$\Rightarrow a : b = c : d \quad \text{یا} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$ad = bc$$

یعنی

**مثال 5:**  $x$  معلوم کیجیے۔ اگر  $x$  کلو گرام : 20 :: 90 میٹر : 60 میٹر

**حل :**  $x$  کلو گرام : 20 :: 90 میٹر : 60 میٹر

$$60 : 90 = 20 : x \quad \text{یعنی}$$

کیونکہ وسطین کی حاصل ضرب = طرفین کی حاصل ضرب

$$60x = 90 \times 20 \quad \text{اس لیے}$$

$$x = \frac{90 \times 20}{60} = 30$$

پس  $x, 30$  کلو گرام کے برابر ہے۔

**مثال 6:** اگر 7 کلو گرام چینی کی قیمت 560 روپے ہو تو 15 کلو گرام چینی کی قیمت معلوم کیجیے۔

**حل :** فرض کریں کہ 15 کلو گرام چینی کی قیمت  $x$  روپے ہے۔

تب تناسب کی شکل میں 560 روپے :  $x$  :: کلو گرام : 7

$$15 : 7 = x : 560$$

یعنی

کیونکہ وسطین کی حاصل ضرب = طرفین کی حاصل ضرب



$$15 \times 560 = 7x$$

$$7x = 15 \times 560$$

$$x = \frac{15 \times 560}{7} = 15(80) = 1200$$

پس 15 کلو گرام چینی کی قیمت 1200 روپے ہے۔

### مشق 3.1

1- مندرجہ ذیل کو نسبت  $a : b$  اور کسر کی آسان (مختصر) شکل میں ظاہر کریں۔

(i) 1250 روپے : 750 روپے (ii) 3 میٹر : 450 سم

(iii) 2 کلو گرام 750 گرام : 4 کلو گرام (iv) 1 گھنٹہ : 27 منٹ 30 سیکنڈ

(v)  $75^\circ : 225^\circ$

2- 60 طلباء کی کلاس میں 25 لڑکیاں اور باقی لڑکے ہیں۔ نسبت معلوم کریں۔

(i) لڑکوں کی تمام طلباء (ii) لڑکوں کی لڑکیوں سے

3- اگر  $3(4x - 5y) = 2x - 7y$ ، تو نسبت  $x : y$  معلوم کیجیے۔

4-  $p$  کی قیمت معلوم کیجیے۔ اگر نسبتیں  $2p + 5 : 3p + 4$  اور  $3 : 4$  برابر ہوں۔

5- اگر نسبتیں  $4x + 1 : 6$  اور  $3x + 1 : 2$  برابر ہوں تو  $x$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

6- دو اعداد میں نسبت  $5 : 8$  ہے۔ اگر ہر عدد میں 9 جمع کریں۔ تو ہم نئی نسبت  $11 : 8$  حاصل کرتے ہیں۔ اعداد معلوم کیجیے۔

7- اگر نسبت  $4 : 13$  کے ہر عدد میں 10 جمع کریں تو ہم نئی نسبت  $2 : 1$  حاصل کرتے ہیں۔ اعداد کیا ہیں؟

8- اگر 5 کلو گرام آموں کی قیمت 250 روپے ہو تو 8 کلو گرام کی قیمت معلوم کیجیے۔

9- اگر  $a : b = 7 : 6$  اور  $3a + 5b : 7b - 5a$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

10- مکمل کریں۔

(i) اگر  $\frac{24}{7} = \frac{6}{x}$  تو  $4x =$

(ii) اگر  $\frac{5a}{3x} = \frac{15b}{y}$  تو  $ay =$

(iii) اگر  $\frac{9pq}{2lm} = \frac{18p}{5m}$  تو  $5q =$

مندرجہ ذیل تناسب میں  $x$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

-11

$$\frac{3x-1}{7} : \frac{3}{5} :: \frac{2x}{3} : \frac{7}{5} \quad (ii) \quad 3x-2 : 4 :: 2x+3 : 7 \quad (i)$$

$$p^2 + pq + q^2 : x :: \frac{p^3 - q^3}{p+q} : (p-q)^2 \quad (iv) \quad \frac{x-3}{2} : \frac{5}{x-1} :: \frac{x-1}{3} : \frac{4}{x+4} \quad (iii)$$

$$8-x : 11-x :: 16-x : 25-x \quad (v)$$

**تغییر (Variation)**

(c)

تمام سائنسی علوم میں تغیر کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ تغیرات کی دو اقسام ہیں۔

(i) تغیر راست (ii) تغیر معکوس

**تغیر راست (Direct Variation)**

(i)

اگر دو مقداروں کے درمیان تعلق اس طرح کا ہو کہ ایک مقدار کے بڑھنے (کم ہونے) سے دوسری مقدار اسی نسبت سے

بڑھے (کم) ہو تو ایسا تعلق **تغیر راست** کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ایک مقدار  $y$  راست تناسب میں ہے  $x$  کے۔ تو ہم

کہتے ہیں کہ  $y$  تغیر راست ہے  $x$  کا اور اس کو  $y \propto x$  یا  $y = kx$  لکھتے ہیں۔ اس لیے

$$\frac{y}{x} = k, \quad k \neq 0$$

$\propto$  تغیر کی علامت ہے۔ اس کو تناسب یا تغیر کی علامت کہتے ہیں۔ جبکہ  $k \neq 0$  تغیر کا مستقل ہے۔

مثلاً (i) جتنی گاڑی کی رفتار تیز ہوگی اتنا زیادہ فاصلہ وہ طے کرے گی۔

(ii) جتنا دائرے کا رداس چھوٹا ہوگا اتنا ہی محیط چھوٹا ہوگا۔

**مثال 1:** حالت سکون میں بلندی  $d$  سے گرنے والے جسم اور وقت  $t$  کے مربع کے راست تناسب میں تعلق معلوم کیجیے۔

جبکہ ہوا کی مزاحمت نہ ہو۔ اگر 1 سیکنڈ  $t$ ، فاصلہ 16 فٹ  $d$  ہو تو  $k$  معلوم کیجیے۔  $d$  اور  $t$  کے درمیان تعلق بھی اخذ کیجیے۔

**حل:** کیونکہ  $t$  وقت میں حالت سکون سے گرنے والے جسم کی بلندی  $d$  ہے۔ تو سوال کی شرط کے مطابق

$$d \propto t^2$$

$$d = kt^2 \quad (i) \text{ اس لیے}$$

$$t = 1 \text{ سیکنڈ} \quad d = 16 \text{ فٹ}$$

تو مساوات (i) سے

$$16 = k(1)^2$$

$$k = 16$$

یعنی

مساوات (i) میں درج کرنے سے

$$d = 16t^2$$

جو کہ وقت  $t$  اور فاصلہ  $d$  کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔



سرگرمی

اوپر دی گئی مساوات میں (i) وقت  $t$  معلوم کیجیے، جب  $d = 64$  فٹ

(ii) فاصلہ  $d$  معلوم کیجیے، جب  $t = 3$  سیکنڈ

**مثال 2:** اگر  $x$  اور  $y$  میں تغیر راست ہو تو معلوم کیجیے۔

(a)  $x$  اور  $y$  میں مساوات

(b) تغیر کا مستقل  $k$ ،  $x$  اور  $y$  میں تعلق جب  $x = 7$  اور  $y = 6$

(c)  $y$  کی قیمت، جب  $x = 21$

**حل:** (a) دیے ہوئے  $x$  اور  $y$  میں تغیر راست ہے۔ اس لیے

$$y \propto x$$

اگر  $k$  تغیر کا مستقل ہو تو

$$y = kx \quad (i)$$

(b) مساوات (i) میں  $x = 7$  اور  $y = 6$  درج کرنے سے

مساوات (i) میں  $k = \frac{6}{7}$  درج کرنے سے

$$y = \frac{6}{7}x \quad (ii)$$

(c) اب مساوات (ii) میں  $x = 21$  درج کرنے سے

$$y = \frac{6}{7}(21) = 18$$

**مثال 3:** اگر  $A$  اور  $r$  کے مربع میں تغیر راست دیا ہوا ہو اور  $\frac{1782}{7}$  مربع سم  $A =$  جب  $r = 9$  سم

اگر  $r = 14$  سم  $A$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

**حل:** چونکہ  $A$  اور  $r$  کے مربع میں تغیر راست ہے۔

$$A \propto r^2$$

اس لیے

$$A = kr^2$$

یا (i)

$$\frac{1782}{7} = k(9)^2$$

$$\frac{1782}{7 \times 81} = k$$

یا

$$k = \frac{22}{7}$$

مساوات (i) میں  $k = \frac{22}{7}$  اور  $r = 14$  سم درج کرنے سے

$$A = \frac{22}{7} (14)^2 = \frac{22}{7} \times 14 \times 14 = 616$$

پس  $A$ ، 616 مربع سم ہے۔

**مثال 4:** اگر  $y$  اور  $x$  کے مکعب میں تغیر راست دیا ہو اور  $y = 81$  جب  $x = 3$ ، پس  $y$  کی قیمت معلوم کیجیے جب  $x = 5$

**حل:**  $y$  اور  $x$  کے مکعب میں تغیر راست دیا ہوا ہے۔ اس لیے

یعنی (i)  $y \propto x^3$  (جبکہ  $k$  مستقل ہے)

$y = kx^3$  میں درج کرنے سے  $y = 81$  اور  $x = 3$

$$81 = k(3)^3 \Rightarrow 27k = 81 \Rightarrow k = 3$$

$x = 5$  اور  $k = 3$  مساوات (i) میں درج کرنے سے

$$y = 3(5)^3 = 375$$

## (ii) تغیر معکوس (Inverse Variation)

اگر دو مقداروں کے درمیان تعلق اس طرح کا ہو کہ ایک مقدار کے بڑھنے (کم ہونے) سے دوسری مقدار اسی نسبت سے کم ہو (بڑھے) تو ایسا تعلق **تغیر معکوس** کہلاتا ہے۔

اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک مقدار  $y$  دوسری مقدار  $x$  کے لحاظ سے تغیر معکوس میں ہے۔

اس کو ہم  $y$  تناسب معکوس ہے  $x$  کا یا تغیر معکوس ہے  $x$  کا پڑھتے ہیں، اور  $y \propto \frac{1}{x}$  یا  $y = \frac{k}{x}$  لکھتے ہیں۔  
یعنی  $xy = k$ ، جبکہ  $k \neq 0$  تغیر کا مستقل ہے۔

**مثال 1:** اگر  $x$  اور  $y$  تغیر معکوس میں ہوں اور  $y = 8$  جب  $x = 4$ ، تو  $y$  معلوم کیجیے جب  $x = 16$

**حل:** کیونکہ  $x$  اور  $y$  تغیر معکوس میں ہیں اس لیے

$$y \propto \frac{1}{x}$$

$$y = \frac{k}{x}$$

$$(i) \quad y = \frac{k}{x}$$

$$(ii) \quad xy = k$$

$$\Rightarrow xy = k$$

$x = 4$  اور  $y = 8$  مساوات (ii) میں درج کرنے سے

$$k = (x)(y) = (4)(8) = 32$$

$x = 16$  اور  $k = 32$  مساوات (i) میں درج کرنے سے

$$y = \frac{32}{16} = 2$$



**مثال 2:** اگر  $y$  اور  $x^2$  تغیر معکوس میں ہوں اور  $y = 16$  جب  $x = 5$  ہو تو  $x$  معلوم کیجیے جب  $y = 100$

**حل:** چونکہ  $y$  اور  $x^2$  تغیر معکوس میں ہیں۔ اس لیے  $y = \frac{k}{x^2}$  یا  $y \propto \frac{1}{x^2}$

$$k = x^2 y \quad (i)$$

$x = 5$  اور  $y = 16$  کی قیمتیں مساوات (i) میں درج کرنے سے

$$k = (5)^2 \times 16 = 400$$

$k = 400$  اور  $y = 100$  کی قیمتیں مساوات (i) میں درج کرنے سے

$$400 = 100x^2$$

$$x^2 = \frac{400}{100} = 4 \quad \text{یا} \quad x = \pm 2$$

### مشق 3.2

1- اگر  $x$  اور  $y$  تغیر راست میں ہوں اور  $y = 8$  جبکہ  $x = 2$  ہو تو معلوم کیجیے:

(i)  $y$  کی قیمت  $x$  میں جبکہ  $x = 5$  (ii)  $y$  جبکہ  $x = 28$  (iii)

2- اگر  $x \propto y$  ہو اور  $y = 7$  جب  $x = 3$  ہو تو معلوم کیجیے۔

(i)  $y$  کی قیمت  $x$  میں جبکہ  $x = 35$  اور  $y = 18$  ہے۔ (ii)

3- اگر  $T \propto R$  ہو اور  $R = 5$  جبکہ  $T = 8$ ، تو  $T$  اور  $R$  میں مساوات معلوم کیجیے۔ نیز  $R$  معلوم کریں جب  $T = 64$

اور  $T$  معلوم کیجیے جبکہ  $R = 20$  ہو۔

4- اگر  $R \propto T^2$  ہو اور  $R = 8$  جب  $T = 3$  ہو تو  $R$  معلوم کیجیے جبکہ  $T = 6$  ہو۔

5- اگر  $V \propto R^3$  ہو اور  $V = 5$  جب  $R = 3$  ہو تو  $R$  معلوم کیجیے جبکہ  $V = 625$  ہو۔

6- اگر  $w$  اور  $u^3$  میں تغیر راست ہے اور  $w = 81$  جب  $u = 3$  ہو تو  $w$  معلوم کیجیے جبکہ  $u = 5$  ہو۔

7- اگر  $y$  اور  $x$  میں تغیر معکوس ہو اور  $y = 7$  جب  $x = 2$  ہو،  $y$  معلوم کیجیے جبکہ  $x = 126$  ہو۔

8- اگر  $y \propto \frac{1}{x}$  ہو اور  $y = 4$  جب  $x = 3$  ہو تو  $x$  معلوم کیجیے جبکہ  $y = 24$  ہو۔

9- اگر  $w \propto \frac{1}{z}$  ہو اور  $w = 5$  جب  $z = 7$  ہو تو  $w$  معلوم کیجیے جبکہ  $z = \frac{175}{4}$  ہو۔

10- اگر  $A \propto \frac{1}{r^2}$  ہو اور  $A = 2$  جب  $r = 3$  ہے،  $r$  معلوم کیجیے جبکہ  $A = 72$  ہو۔

$$11 \quad a \propto \frac{1}{b^2} \text{ اور } a = 3 \text{ جب } b = 4 \text{ ہے، معلوم کیجیے جبکہ } b = 8 \text{ ہو۔}$$

$$12 \quad V \propto \frac{1}{r^3} \text{ اور } V = 5 \text{ جب } r = 3 \text{ ہے۔ } V \text{ معلوم کیجیے جب } r = 6 \text{ اور } r \text{ معلوم کیجیے جبکہ } V = 320 \text{ ہو۔}$$

$$13 \quad m \propto \frac{1}{n^3} \text{ اور } m = 2 \text{ جبکہ } n = 4 \text{ ہو تو } m \text{ معلوم کیجیے جب } n = 6 \text{ اور } n \text{ معلوم کیجیے جبکہ } m = 432 \text{ ہو۔}$$

### (ii) 3.1 تیسرا، چوتھا وسطیٰ تناسب اور مسلسل تناسب

ہم پہلے ہی تناسب سے واقف ہیں کہ اگر چار مقداریں  $a, b, c, d$  تناسب میں ہوں تو  $a : b :: c : d$

یعنی **وسطین کا حاصل ضرب = طرفین کا حاصل ضرب**

#### تیسرا متناسب (Third Proportional)

اگر تین مقداروں  $a, b, c$  میں اس طرح کا تعلق ہو کہ  $a : b :: b : c$

تو  $c$  تیسرا متناسب کہلاتا ہے۔

**مثال 1:**  $x + y$  اور  $x^2 - y^2$  کا تیسرا متناسب معلوم کیجیے۔

**حل:** فرض کریں کہ تیسرا متناسب  $c$  ہے تو

$$x + y : x^2 - y^2 :: x^2 - y^2 : c$$

$$c(x + y) = (x^2 - y^2)(x^2 - y^2)$$

$$c = \frac{(x^2 - y^2)(x^2 - y^2)}{x + y} = \frac{(x^2 - y^2)(x - y)(x + y)}{(x + y)}$$

$$c = (x^2 - y^2)(x - y) = (x + y)(x - y)^2$$

#### چوتھا متناسب (Fourth Proportional)

اگر مقداروں  $a, b, c, d$  میں تعلق اس طرح ہو کہ

$$a : b :: c : d$$

تو  $d$  چوتھا متناسب کہلاتا ہے۔

**مثال 2:**  $a^3 + b^3, a + b$  اور  $a^2 + ab + b^2$  کا چوتھا متناسب معلوم کیجیے۔

**حل:** فرض کریں کہ چوتھا متناسب  $x$  ہے تو  $(a^3 - b^3) : (a + b) :: (a^2 + ab + b^2) : x$

$$x(a^3 - b^3) = (a + b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$x = \frac{(a + b)(a^2 + ab + b^2)}{a^3 - b^3} = \frac{(a + b)(a^2 + ab + b^2)}{(a - b)(a^2 + ab + b^2)}$$

$$x = \frac{a + b}{a - b}$$

یا



### وسطی تناسب (Mean Proportional)

اگر تین مقداروں  $a$ ،  $b$  اور  $c$  میں تعلق اس طرح ہو کہ  
 $a : b :: b : c$  تو ” $b$ “ وسطی تناسب کہلاتا ہے۔

**مثال 3:**  $9p^6q^4$  اور  $r^8$  کا وسطی تناسب معلوم کیجیے۔

**حل:** فرض کریں کہ  $m$  وسطی تناسب ہے تو

$$9p^6q^4 : m :: m : r^8$$

$$m \cdot m = 9p^6q^4 (r^8)$$

یا

$$m^2 = 9p^6q^4r^8$$

$$m = \pm \sqrt{9p^6q^4r^8} = \pm 3p^3q^2r^4$$

### مسل تناسب (Continued Proportion)

اگر تین مقداروں  $a$ ،  $b$  اور  $c$  میں تعلق اس طرح ہو کہ  
 $a : b :: b : c$

جب کہ  $a$  پہلا تناسب ہو،  $b$  وسطی تناسب ہو اور  $c$  تیسرا تناسب ہو تو  $a$ ،  $b$  اور  $c$  **مسل تناسب** میں ہوتے ہیں۔

**مثال 4:** اگر  $p$ ،  $12$  اور  $3$  مسلسل تناسب میں ہوں۔ تو  $p$  معلوم کیجیے۔

**حل:** چونکہ  $12$  اور  $3$  میں مسلسل تناسب ہے۔ اس لیے

$$12 : p :: p : 3$$

$$p \cdot p = (12)(3) \Rightarrow p^2 = 36$$

$$p = \pm 6$$

پس

## مشق 3.3

1- تیسرا تناسب معلوم کیجیے۔

(i) 6, 12

(ii)  $a^3, 3a^2$

(iii)  $a^2 - b^2, a - b$

(iv)  $(x - y)^2, x^3 - y^3$

(v)  $(x + y)^2, x^2 - xy - 2y^2$

(vi)  $\frac{p^2 - q^2}{p^3 + q^3}, \frac{p - q}{p^2 - pq + q^2}$

2- چوتھا تناسب معلوم کیجیے۔

(i) 5, 8, 15

(ii)  $4x^4, 2x^3, 18x^5$

(iii)  $15a^5b^6, 10a^2b^5, 21a^3b^3$

(iv)  $x^2 - 11x + 24, (x - 3), 5x^4 - 40x^3$

(v)  $p^3 + q^3, p^2 - q^2, p^2 - pq + q^2$

(vi)  $(p^2 - q^2)(p^2 + pq + q^2), p^3 + q^3, p^3 - q^3$

3- وسطیٰ تناسب معلوم کیجیے۔

(i) 20, 45

(ii)  $20x^3y^5, 5x^7y$

(iii)  $15p^4qr^3, 135q^5r^7$

(iv)  $x^2 - y^2, \frac{x-y}{x+y}$

4- مندرجہ ذیل میں مسلسل تناسب ہے۔ دیے گئے متغیر کی قیمت معلوم کیجیے۔

(i) 5, p, 45

(ii) 8, x, 18

(iii) 12,  $3p - 6$ , 27

(iv) 7,  $m - 3$ , 28

### 3.2 تناسب کے مسئلے (Theorems on Proportions)

اگر چار مقداریں  $a, b, c, d$  تناسب میں ہوں تو کسور کی خصوصیات سے بہت سی دوسری مفید خصوصیات اخذ کی جاسکتی ہیں۔

#### (1) مسئلہ عکس نسبت (Theorem of Invertendo)

اگر  $a : b = c : d$  ہو تو  $b : a = d : c$  ہوتا ہے۔

$2n : 3m = 2q : p$

مثال 1: اگر  $3m : 2n = p : 2q$  ہو تو ثابت کریں

$\frac{3m}{2n} = \frac{p}{2q}$

حل: چونکہ  $3m : 2n = p : 2q$  اس لیے

مسئلہ عکس نسبت کی رو سے

$\frac{2n}{3m} = \frac{2q}{p}$

$2n : 3m = 2q : p$

پس

#### (2) مسئلہ ابدال نسبت (Theorem of Alternando)

اگر  $a : b = c : d$  ہو تو  $a : c = b : d$

مثال 2: اگر  $3p + 1 : 2q = 5r : 7s$  ہو تو ثابت کیجیے کہ  $3p + 1 : 5r = 2q : 7s$

حل: دیا ہوا ہے کہ  $3p + 1 : 2q = 5r : 7s$

$\frac{3p+1}{2q} = \frac{5r}{7s}$

اس لیے

$\frac{3p+1}{5r} = \frac{2q}{7s}$

مسئلہ ابدال کی رو سے

$3p + 1 : 5r = 2q : 7s$

پس



### (3) مسئلہ ترکیب نسبت (Theorem of Componendo)

اگر  $a : b = c : d$  تو

(i)  $a + b : b = c + d : d$

(ii)  $a : a + b = c : c + d$

اور

**مثال 3:** اگر  $m + 3 : n = p : q - 2$  ہو تو ثابت کیجیے۔  $m + n + 3 : n = p + q - 2 : q - 2$

**حل:** چونکہ  $m + 3 : n = p : q - 2$  اس لیے

$$\frac{m+3}{n} = \frac{p}{q-2}$$

$$\frac{(m+3)+n}{n} = \frac{p+(q-2)}{q-2}$$

مسئلہ ترکیب نسبت کی رو سے

$$\frac{m+n+3}{n} = \frac{p+q-2}{q-2}$$

یا

$$m+n+3 : n = p+q-2 : q-2$$

پس

### (4) مسئلہ تفصیل نسبت (Theorem of Dividendo)

اگر  $a : b = c : d$  ہو تو

(i)  $a - b : b = c - d : d$

(ii)  $a : a - b = c : c - d$

اور

**مثال 4:** اگر  $m + 1 : n - 2 = 2p + 3 : 3q + 1$  ہو تو ثابت کیجیے۔

$$m - n + 3 : n - 2 = 2p - 3q + 2 : 3q + 1$$

$$\frac{m+1}{n-2} = \frac{2p+3}{3q+1}$$

**حل:** فرض کریں کہ  $m + 1 : n - 2 = 2p + 3 : 3q + 1$  تو

$$\frac{(m+1)-(n-2)}{n-2} = \frac{(2p+3)-(3q+1)}{3q+1}$$

مسئلہ تفصیل نسبت کی رو سے

$$\frac{m-n+3}{n-2} = \frac{2p-3q+2}{3q+1}$$

یا

$$m - n + 3 : n - 2 = 2p - 3q + 2 : 3q + 1$$

پس

### (5) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت (Theorem of Componendo-dividendo)

اگر  $a : b = c : d$  ہو تو

(i)  $a + b : a - b = c + d : c - d$

(ii)  $a - b : a + b = c - d : c + d$

اور

**مثال 5:** اگر  $m : n = p : q$  ہو تو ثابت کیجیے۔

$$3m + 7n : 3m - 7n = 3p + 7q : 3p - 7q$$

$$m : n = p : q$$

**حل:** چونکہ

$$\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$$

یا

طرفین کو  $\frac{3}{7}$  سے ضرب دینے سے

مسئلہ ترکیب و تفصیل کی رو سے

$$\frac{3m}{7n} = \frac{3p}{7q}$$

$$\frac{3m + 7n}{3m - 7n} = \frac{3p + 7q}{3p - 7q}$$

$$3m + 7n : 3m - 7n = 3p + 7q : 3p - 7q$$

پس

**مثال 6:** اگر  $5m + 3n : 5m - 3n = 5p + 3q : 5p - 3q$  ہو تو ثابت کیجیے۔  $m : n = p : q$

$$5m + 3n : 5m - 3n = 5p + 3q : 5p - 3q$$

**حل:** فرض کریں کہ

$$\frac{5m + 3n}{5m - 3n} = \frac{5p + 3q}{5p - 3q}$$

یا

مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت کی رو سے

$$\frac{(5m + 3n) + (5m - 3n)}{(5m + 3n) - (5m - 3n)} = \frac{(5p + 3q) + (5p - 3q)}{(5p + 3q) - (5p - 3q)}$$

$$\frac{5m + 3n + 5m - 3n}{5m + 3n - 5m + 3n} = \frac{5p + 3q + 5p - 3q}{5p + 3q - 5p + 3q}$$

$$\frac{10m}{6n} = \frac{10p}{6q}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$$

طرفین کو  $\frac{6}{10}$  سے ضرب دینے سے

یعنی

$$m : n = p : q$$

**مثال 7:** اگر  $m = \frac{6pq}{p + q}$  ہو تو  $\frac{m + 3p}{m - 3p} + \frac{m + 2q}{m - 2q}$  کی قیمت مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت کو استعمال کرتے ہوئے

معلوم کیجیے۔

$$m = \frac{6pq}{p + q}$$

**حل:** چونکہ

$$m = \frac{(3p)(2q)}{p + q}$$

(i)

یا



$$\frac{m}{3p} = \frac{2q}{p+q}$$

اس لیے

مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت کی رو سے

$$\frac{m+3p}{m-3p} = \frac{2q+(p+q)}{2q-(p+q)} = \frac{2q+p+q}{2q-p-q}$$

$$\frac{m+3p}{m-3p} = \frac{p+3q}{q-p}$$

(ii)

$$\frac{m}{2q} = \frac{3p}{p+q}$$

اب مساوات (i) سے

مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت کی رو سے

$$\frac{m+2q}{m-2q} = \frac{3p+(p+q)}{3p-(p+q)} = \frac{3p+p+q}{3p-p-q}$$

$$\frac{m+2q}{m-2q} = \frac{4p+q}{2p-q}$$

(iii)

(ii) اور (iii) کو جمع کرنے سے

$$\frac{m+3p}{m-3p} + \frac{m+2q}{m-2q} = \frac{p+3q}{q-p} + \frac{4p+q}{2p-q} = -\frac{p+3q}{p-q} + \frac{4p+q}{2p-q}$$

$$= \frac{-(p+3q)(2p-q) + (p-q)(4p+q)}{(p-q)(2p-q)}$$

$$= \frac{-2p^2 - 5pq + 3q^2 + 4p^2 - 3pq - q^2}{(p-q)(2p-q)}$$

$$= \frac{2p^2 - 8pq + 2q^2}{(p-q)(2p-q)} = \frac{2(p^2 - 4pq + q^2)}{(p-q)(2p-q)}$$

**مثال 8:** مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے مساوات  $\frac{\sqrt{x+3} + \sqrt{x-3}}{\sqrt{x+3} - \sqrt{x-3}} = \frac{4}{3}$  کو حل کریں۔

**حل:** مساوات  $\frac{\sqrt{x+3} + \sqrt{x-3}}{\sqrt{x+3} - \sqrt{x-3}} = \frac{4}{3}$  دی ہوئی ہے۔

مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت کی رو سے

$$\frac{\sqrt{x+3} + \sqrt{x-3} + \sqrt{x+3} - \sqrt{x-3}}{\sqrt{x+3} + \sqrt{x-3} - \sqrt{x+3} + \sqrt{x-3}} = \frac{4+3}{4-3}$$

$$\frac{2\sqrt{x+3}}{2\sqrt{x-3}} = \frac{7}{1} \Rightarrow \sqrt{\frac{x+3}{x-3}} = 7$$

$$\frac{x+3}{x-3} = 49$$

طرفین کا مربع لینے سے

$$x+3 = 49(x-3) \Rightarrow x+3 = 49x-147 \Rightarrow x-49x = -147-3$$

$$-48x = -150 \Rightarrow 48x = 150 \Rightarrow x = \frac{150}{48} = \frac{25}{8}$$

**مثال 9:** مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت کے استعمال سے مساوات  $\frac{(x+3)^2 - (x-5)^2}{(x+3)^2 + (x-5)^2} = \frac{4}{5}$  کو حل کیجیے۔

**حل:** مساوات  $\frac{(x+3)^2 - (x-5)^2}{(x+3)^2 + (x-5)^2} = \frac{4}{5}$  دی ہوئی ہے۔

مسئلہ ترکیب و تفصیل کی رو سے

$$\frac{(x+3)^2 - (x-5)^2 + (x+3)^2 + (x-5)^2}{(x+3)^2 - (x-5)^2 - (x+3)^2 - (x-5)^2} = \frac{4+5}{4-5}$$

$$\frac{2(x+3)^2}{-2(x-5)^2} = \frac{9}{-1} \Rightarrow \left(\frac{x+3}{x-5}\right)^2 = (\pm 3)^2$$

$$\frac{x+3}{x-5} = \pm 3$$

جزر المربع لینے سے

$$\frac{x+3}{x-5} = 3$$

$$\frac{x+3}{x-5} = -3$$

$$x+3 = 3(x-5)$$

$$x+3 = -3(x-5)$$

$$x+3 = 3x-15$$

$$x+3 = -3x+15$$

$$-2x = -18$$

$$4x = 12$$

$$x = 9$$

$$x = 3$$

پس حل سیٹ  $\{3, 9\}$  ہے۔

### 3.4 مشق

1- اگر  $a : b = c : d$  ثابت کیجیے کہ

$$(i) \quad \frac{4a+5b}{4a-5b} = \frac{4c+5d}{4c-5d}$$

$$(ii) \quad \frac{2a+9b}{2a-9b} = \frac{2c+9d}{2c-9d}$$

$$(iii) \quad \frac{ac^2+bd^2}{ac^2-bd^2} = \frac{c^3+d^3}{c^3-d^3}$$

$$(iv) \quad \frac{a^2c+b^2d}{a^2c-b^2d} = \frac{ac^2+bd^2}{ac^2-bd^2}$$

$$(v) \quad pa+qb : pa-qb = pc+qd : pc-qd$$



$$(vi) \quad \frac{a+b+c+d}{a+b-c-d} = \frac{a-b+c-d}{a-b-c+d}$$

$$(vii) \quad \frac{2a+3b+2c+3d}{2a+3b-2c-3d} = \frac{2a-3b+2c-3d}{2a-3b-2c+3d}$$

$$(viii) \quad \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2} = \frac{ac+bd}{ac-bd}$$

2- مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے

$$-x = \frac{4yz}{y+z} \text{ اگر } x \text{ کی قیمت معلوم کیجیے} \quad \frac{x+2y}{x-2y} + \frac{x+2z}{x-2z} \quad (i)$$

$$-xm = \frac{10np}{n+p} \text{ اگر } m \text{ کی قیمت معلوم کیجیے} \quad \frac{m+5n}{m-5n} + \frac{m+5p}{m-5p} \quad (ii)$$

$$-x = \frac{12ab}{a-b} \text{ اگر } x \text{ کی قیمت معلوم کیجیے} \quad \frac{x-6a}{x+6a} - \frac{x+6b}{x-6b} \quad (iii)$$

$$-x = \frac{3yz}{y-z} \text{ اگر } x \text{ کی قیمت معلوم کیجیے} \quad \frac{x-3y}{x+3y} - \frac{x+3z}{x-3z} \quad (iv)$$

$$-s = \frac{6pq}{p-q} \text{ اگر } s \text{ کی قیمت معلوم کیجیے} \quad \frac{s-3p}{s+3p} + \frac{s+3q}{s-3q} \quad (v)$$

$$- \text{کو حل کریں۔} \quad \frac{(x-2)^2 - (x-4)^2}{(x-2)^2 + (x-4)^2} = \frac{12}{13} \quad (vi)$$

$$- \text{کو حل کریں۔} \quad \frac{\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2-2}}{\sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2-2}} = 2 \quad (vii)$$

$$- \text{کو حل کریں۔} \quad \frac{\sqrt{x^2+8p^2} - \sqrt{x^2-p^2}}{\sqrt{x^2+8p^2} + \sqrt{x^2-p^2}} = \frac{1}{3} \quad (viii)$$

$$- \text{کو حل کریں۔} \quad \frac{(x+5)^3 - (x-3)^3}{(x+5)^3 + (x-3)^3} = \frac{13}{14} \quad (ix)$$

### 3.3(i) مشترک تغیر (Joint variation)

ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات میں راست اور معکوس تغیروں کے ملنے سے **مشترک تغیر** بنتا ہے۔

اگر ایک متغیر  $y$  کا  $x$  کے ساتھ تغیر راست اور  $z$  کے ساتھ تغیر معکوس ہو تو  $y \propto \frac{x}{z}$  اور  $y \propto \frac{1}{z}$

$$y \propto \frac{x}{z}$$

$$y = k \frac{x}{z}$$

مشترک تغیر میں، ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں۔

یعنی

جبکہ  $k \neq 0$  تغیر کا مستقل ہے۔

مثلاً نیوٹن کے قانون کشش ثقل کے مطابق، اگر ایک جسم سے دوسرے پر لگائی جانے والی قوت  $G$ ، جو کہ اجسام

کی کمیتوں  $m_1, m_2$  کے حاصل ضرب میں تغیر راست اور ان کے درمیانی فاصلہ  $d$  کے مربع میں تغیر معکوس ہو۔

$$G \propto \frac{m_1 m_2}{d^2} \quad \text{تو}$$

$$G = k \frac{m_1 m_2}{d^2} \quad \text{یا} \quad (\text{جبکہ } k \neq 0 \text{ مستقل ہے})$$

### (ii) 3.3 مشترک تغیر کے متعلق سوالات (Problems related to joint variation)

مشترک تغیر سے متعلق سوالات کو حل کرنے کے طریقے کی وضاحت مثالوں سے کی گئی ہے۔

**مثال 1:** اگر  $y, x^2$  اور  $z$  میں مشترک تغیر اور  $y = 6$  جب  $x = 6, z = 9$  ہو۔  $y$  کو بطور  $x$  اور  $z$  کا تفاعل لکھیے اور  $y$  کی قیمت

معلوم کیجیے جب  $x = -8$  اور  $z = 12$  ہو۔

**حل:** چونکہ  $y, x^2$  اور  $z$  میں مشترک تغیر ہے، اس لیے

$$y \propto x^2 z$$

$$y = kx^2 z \quad (i)$$

یعنی

$$y = 6, x = 4, z = 9 \quad \text{درج کرنے سے}$$

مساوات (i) میں

$$6 = k(4)^2(9)$$

$$\frac{6}{16 \times 9} = k \Rightarrow k = \frac{1}{24}$$

$$y = \frac{1}{24} x^2 z \quad (ii)$$

$$x = -8, z = 12 \quad \text{درج کرنے سے}$$

اب مساوات (ii) میں

$$y = \frac{1}{24} (-8)^2 (12) = 32$$

**مثال 2:**  $p$  کا  $q$  اور  $r^2$  میں تغیر راست ہے اور  $s$  اور  $t^2$  میں تغیر معکوس ہے۔ جب  $p = 40, r = 5, q = 8$

$t = 2, s = 3, p, q, r, s, t$  اور  $p$  کی قیمت معلوم کیجیے جب  $s = 3, r = 4, q = -2$  اور  $t = -1$  ہو۔

ہو۔

$$p \propto \frac{qr^2}{st^2}$$

$$p = k \frac{qr^2}{st^2} \quad (i)$$

**حل:** دی ہوئی شرط کے مطابق



$p = 40, q = 8, r = 5, s = 3$  اور  $t = 2$  مساوات (i) میں درج کرنے سے

$$40 = k \frac{(8)(5)^2}{3(2)^2}$$

$$\frac{40 \times 3 \times 4}{8 \times 25} = k \Rightarrow k = \frac{12}{5}$$

$$p = \frac{12}{5} \frac{qr^2}{st^2} \quad \text{تو } k = \frac{r}{2} \text{ رکھنے سے مساوات (i) ہو جاتی ہے۔}$$

اب  $s = 3, r = 4, q = -2$  اور  $t = -1$  ہوئی مساوات میں درج کرنے سے

$$p = \frac{12}{5} \frac{(-2)(4)^2}{(3)(-1)^2} = -\frac{128}{5}$$

### مشق 3.5

1- اگر  $s$  کا  $u^2$  سے تغیر راست اور  $v$  سے تغیر معکوس اور  $s = 7$  جب  $u = 3, v = 2$  ہو۔

$s$  کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ  $u = 6$  اور  $v = 10$  ہو۔

2- اگر  $w$  کا  $x^2, y^2$  اور  $z$  میں تغیر مشترک ہو اور  $w = 5$  جب  $x = 2, y = 3, z = 10$  ہو۔

$w$  معلوم کیجیے جبکہ  $x = 4, y = 7, z = 3$  ہو۔

3- اگر  $y$  کا  $x^3$  سے تغیر راست اور  $z^2, t$  میں تغیر معکوس ہو اور  $y = 16$  جب  $x = 4, z = 2, t = 3$  کی قیمت

معلوم کیجیے جبکہ  $x = 2, z = 3, t = 4$  ہو۔

4- اگر  $u$  کا  $x^2$  سے تغیر راست اور حاصل ضرب  $yz^3$  سے تغیر معکوس ہو اور  $u = 2$  جب  $x = 8, y = 7, z = 2$  ہو۔

تو  $u$  کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ  $x = 6, y = 3, z = 2$  ہو۔

5- اگر  $v$  کا حاصل ضرب  $xy^3$  سے تغیر راست اور  $z^2$  سے تغیر معکوس ہو اور  $v = 27$  جب  $x = 7, y = 6, z = 7$  ہو۔

$v$  کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ  $x = 6, y = 2, z = 3$  ہو۔

6- اگر  $w$  کا  $u$  کے مکعب سے تغیر معکوس ہو اور  $w = 5$  جبکہ  $u = 3$  ہو۔  $w$  معلوم کیجیے جب  $u = 6$  ہو۔

### 3.4 K-طریقہ (K-Method)

(i) 3.4 k-طریقہ کے استعمال سے تناسب پر مشتمل مشروط مساواتوں کو ثابت کرنا۔

اگر  $a : b :: c : d$  ایک تناسب ہو تو ہر نسبت  $k$  کے برابر اس طرح رکھنے سے

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

$$\frac{a}{b} = k \text{ اور } \frac{c}{d} = k \Rightarrow a = bk \text{ اور } c = dk$$

اوپر دی گئی مساواتوں کے استعمال سے ہم تناسب سے متعلق بعض سوالات کو زیادہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔

یہ طریقہ  $k$ ، طریقہ کہلاتا ہے۔ ہم  $k$  - طریقہ کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے کرتے ہیں۔

$$\frac{3a + 2b}{3a - 2b} = \frac{3c + 2d}{3c - 2d}$$

**مثال 1:** اگر  $a : b = c : d$  تو ثابت کیجیے کہ

$$a : b = c : d$$

**حل:**

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

فرض کریں کہ

$$a = bk \text{ اور } c = dk$$

تب

$$\frac{3a + 2b}{3a - 2b} = \frac{3c + 2d}{3c - 2d}$$

ثابت کرنے کے لیے

$$\text{L.H.S} = \frac{3a + 2b}{3a - 2b} = \frac{3kb + 2b}{3kb - 2b} = \frac{b(3k + 2)}{b(3k - 2)}$$

اب

$$= \frac{3k + 2}{3k - 2}$$

(i)

$$\text{R.H.S} = \frac{3c + 2d}{3c - 2d} = \frac{3kd + 2d}{3kd - 2d} = \frac{d(3k + 2)}{d(3k - 2)}$$

نیز

$$= \frac{3k + 2}{3k - 2}$$

(ii)

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

اس لیے

$$\frac{3a + 2b}{3a - 2b} = \frac{3c + 2d}{3c - 2d}$$

یعنی

**مثال 2:** اگر  $a : b = c : d$  تو ثابت کیجیے کہ  $pa + qb : ma - nb = pc + qd : mc - nd$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

**حل:** فرض کریں کہ

$$a = bk \text{ اور } c = dk$$

تب

$$\text{L.H.S} = pa + qb : ma - nb = \frac{pa + qb}{ma - nb} = \frac{pkb + qb}{mkb - nb}$$

$$= \frac{b(pk + q)}{b(mk - n)} = \frac{pk + q}{mk - n}$$



$$\begin{aligned} \text{R.H.S} = pc + qd : mc - nd &= \frac{pc + qd}{mc - nd} = \frac{pkd + qd}{mkd - nd} \quad (c = kd) \\ &= \frac{d(pk + q)}{d(mk - n)} = \frac{pk + q}{mk - n} \end{aligned}$$

$$pa + qb : ma - nb = pc + qd : mc - nd \quad \text{یعنی}$$

$$\frac{a^3 + c^3 + e^3}{b^3 + d^3 + f^3} = \frac{ace}{bdf} \quad \text{اگر } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} \text{ ہو تو ثابت کیجیے کہ}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k \quad \text{حل: فرض کریں کہ}$$

$$\frac{a}{b} = k, \frac{c}{d} = k \text{ اور } \frac{e}{f} = k$$

تب

$$a = bk, c = dk \text{ اور } e = fk$$

یعنی

$$\frac{a^3 + c^3 + e^3}{b^3 + d^3 + f^3} = \frac{ace}{bdf}$$

ثابت کرنے کے لیے

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= \frac{a^3 + c^3 + e^3}{b^3 + d^3 + f^3} = \frac{(bk)^3 + (dk)^3 + (fk)^3}{b^3 + d^3 + f^3} \\ &= \frac{b^3k^3 + d^3k^3 + f^3k^3}{b^3 + d^3 + f^3} = k^3 \left( \frac{b^3 + d^3 + f^3}{b^3 + d^3 + f^3} \right) = k^3 \end{aligned}$$

اب

$$\text{R.H.S} = \frac{ace}{bdf} = \frac{(bk)(dk)(fk)}{bdf} = k^3 \frac{bdf}{bdf} = k^3$$

نیز

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

اس لیے

$$\frac{a^3 + c^3 + e^3}{b^3 + d^3 + f^3} = \frac{ace}{bdf}$$

یعنی

$$\frac{a^2b + c^2d + e^2f}{ab^2 + cd^2 + ef^2} = \frac{a + c + e}{b + d + f} \quad \text{اگر } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} \text{ ہو تو ثابت کیجیے کہ}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k \quad \text{حل: فرض کریں کہ}$$

$$a = bk, c = dk, e = fk$$

$$\frac{a^2b + c^2d + e^2f}{ab^2 + cd^2 + ef^2} = \frac{a + c + e}{b + d + f}$$

ثابت کرنے کے لیے

$$\text{L.H.S.} = \frac{a^2b + c^2d + e^2f}{ab^2 + cd^2 + ef^2}$$

$$= \frac{(bk)^2b + (dk)^2d + (fk)^2f}{(bk)b^2 + (dk)d^2 + (fk)f^2} = \frac{k^2b^3 + k^2d^3 + k^2f^3}{kb^3 + kd^3 + kf^3}$$

$$= \frac{k^2(b^3 + d^3 + f^3)}{k(b^3 + d^3 + f^3)} = k$$

$$\text{R.H.S.} = \frac{a+c+e}{b+d+f} = \frac{bk+dk+fk}{b+d+f}$$

$$= \frac{k(b+d+f)}{b+d+f} = k$$

$$\text{L.H.S.} = \text{R.H.S.}$$

$$\frac{a^2b + c^2d + e^2f}{ab^2 + cd^2 + ef^2} = \frac{a+c+e}{b+d+f}$$

پس

### مشق 3.6

1- اگر  $a : b = c : d$  ( $a, b, c, d \neq 0$ ) تو ثابت کیجیے کہ

$$(i) \quad \frac{4a-9b}{4a+9b} = \frac{4c-9d}{4c+9d}$$

$$(ii) \quad \frac{6a-5b}{6a+5b} = \frac{6c-5d}{6c+5d}$$

$$(iii) \quad \frac{a}{b} = \sqrt{\frac{a^2 + c^2}{b^2 + d^2}}$$

$$(iv) \quad a^6 + c^6 : b^6 + d^6 = a^3c^3 : b^3d^3$$

$$(v) \quad p(a+b) + qb : p(c+d) + qd = a : c$$

$$(vi) \quad a^2 + b^2 : \frac{a^3}{a+b} = c^2 + d^2 : \frac{c^3}{c+d}$$

$$(vii) \quad \frac{a}{a-b} : \frac{a+b}{b} = \frac{c}{c-d} : \frac{c+d}{d}$$

2- اگر  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$  ( $a, b, c, d, e, f \neq 0$ ) تو ثابت کیجیے کہ

$$(i) \quad \frac{a}{b} = \sqrt{\frac{a^2 + c^2 + e^2}{b^2 + d^2 + f^2}}$$

$$(ii) \quad \frac{ac+ce+ea}{bd+df+fb} = \left[ \frac{ace}{bdf} \right]^{2/3}$$

$$(iii) \quad \frac{ac}{bd} + \frac{ce}{df} + \frac{ea}{fb} = \frac{a^2}{b^2} + \frac{c^2}{d^2} + \frac{e^2}{f^2}$$



### (ii) 3.4 تفسیر پر مشتمل روز مسرہ زندگی کے سوالات

**مثال 1:** ایک مستطیلی شہتیر کی طاقت "s" کا اس کی چوڑائی b اور گہرائی d کے مربع میں تغیر راست ہے۔ اگر ایک

شہتیر 9 سم چوڑا اور 12 سم گہرا 1200 پونڈ وزن اٹھاتا ہو تو 12 سم چوڑا اور 9 سم گہرا شہتیر کتنا وزن اٹھائے گا؟

$$s \propto bd^2$$

**حل:** مشترک تغیر سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ

$$s = kbd^2$$

(i)

یعنی

مساوات (i) میں  $s = 1200$ ،  $b = 9$  اور  $d = 12$  درج کرنے سے

$$k(9)(12)^2 = 1200$$

$$k = \frac{1200}{9 \times 144} = \frac{25}{27}$$

$$s = \frac{25}{27} bd^2$$

مساوات (i) میں  $k = \frac{25}{27}$  درج کرنے سے

اب اوپر دی ہوئی مساوات میں  $b = 12$  اور  $d = 9$  درج کرنے سے

$$s = \frac{25}{27} (12)(9)^2 = \frac{25(12)(9)(9)}{27} = 900$$

پس  $s = 900$  پونڈ ہے۔

**مثال 2:** ایک تار میں برقی رو کا برقی قوت محرکہ E میں تغیر راست اور مزاحمت R میں تغیر معکوس ہے۔ اگر

ایمپیئر  $I = 32$ ، جبکہ وولٹز  $E = 128$  اور اوہمز  $R = 80$  جب وولٹز  $E = 150$  اور اوہمز  $R = 180$  ہو تو I معلوم کیجیے۔

$$I \propto \frac{E}{R}$$

**حل:** مشترک تغیر سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ

$$I = \frac{kE}{R}$$

(i)

یعنی

مساوات (i) میں  $I = 32$ ،  $E = 128$  اور  $R = 80$  درج کرنے سے

$$32 = \frac{k(128)}{80} \Rightarrow \frac{32 \times 80}{128} = k \Rightarrow k = 2$$

$$I = \frac{2E}{R}$$

مساوات (i) میں  $k = 2$  درج کرنے سے

اب اوپر دی ہوئی مساوات میں  $E = 150$  اور  $R = 180$  درج کرنے سے

$$I = \frac{2(150)}{180} = \frac{50}{3}$$

پس  $I = \frac{50}{3}$  ایمپیئر ہے۔

### مشق 3.7

- 1- ایک مکعب کے سطحی رقبہ  $A$  کا اس کے ایک کنارہ کی لمبائی  $l$  کے مربع میں تغیر راست ہے۔ اور  $27$  مربع یونٹس  $A =$  جبکہ  $3$  یونٹس  $l =$  ہو تو معلوم کیجیے۔
  - (i) جب  $4$  یونٹس  $l =$
  - (ii) جب  $12$  مربع یونٹس  $A =$
- 2- ایک کرہ کے سطحی رقبہ  $S$  کا اس کے رداس  $r$  کے مربع میں تغیر راست ہے اور  $S = 16\pi$  جب  $r = 2$  ہو۔  $r$  معلوم کیجیے جب  $S = 36\pi$  ہو۔
- 3- ہکس کے قانون میں ایک سپرنگ کو کھینچنے والی قوت  $F$  کا اس کے کھچاؤ کی مقدار  $S$  سے تغیر راست ہے اور  $32$  پونڈ  $F =$  جب  $1.6$  انچ  $S =$  معلوم کیجیے۔
  - (i) جب  $50$  یونٹ  $F =$
  - (ii) جب  $0.8$  انچ  $S =$
- 4- کسی دیے ہوئے منبع سے روشنی کی شدت  $I$  کا اس سے فاصلہ  $d$  کے مربع میں تغیر معکوس ہے۔ اگر روشنی کی شدت منبع سے  $12$  فٹ کے فاصلہ پر  $20$  کینڈل پاور ہو تو منبع سے  $8$  فٹ کے فاصلہ پر روشنی کی شدت معلوم کیجیے۔
- 5- ایک جسم میں مائع کے دباؤ  $P$  کا اس کی گہرائی  $d$  میں تغیر راست ہے۔ اگر  $5$  فٹ بلندی والے مائع کے ایک حصہ کا تالاب کی تہہ پر دباؤ  $2.25$  پونڈ فی مربع انچ ہو تو  $9$  پونڈ فی مربع انچ دباؤ لگانے کے لیے مائع کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟
- 6- مزدوری خرچہ  $c$  کا مزدوروں کی تعداد  $n$  اور دنوں کی تعداد  $d$  میں تغیر مشترک ہے اگر  $800$  مزدوروں کا  $13$  دن کا خرچ  $286000$  روپے ہو تو  $600$  مزدوروں کا  $18$  دن کا خرچ کیا ہوگا؟
- 7- ایک ستون کے بوجھ  $c$  کا اس کے قطر  $d$  کی چوتھی قوت میں تغیر راست اور اس کی لمبائی  $l$  کے مربع میں تغیر معکوس ہے۔ اگر  $63$  ٹن بوجھ،  $16$  انچ ستون کو  $30$  فٹ تک برداشت کر سکتا ہے تو  $28$  ٹن کا بوجھ برداشت کرنے والا  $4$  انچ کا ستون کتنا بلند ہوگا؟
- 8- ایک لفٹ کے بوجھ اٹھانے کے لئے مخصوص وقت  $T$  کا وزن  $w$  گہرائی  $d$  کے ساتھ تغیر راست اور موٹر کی قوت  $p$  کے ساتھ تغیر معکوس ہے۔ اگر وزن  $500$  پونڈ،  $40$  فٹ تک اٹھانے کے لیے  $4$  ہارس پاور موٹر کو  $25$  سیکنڈ کی ضرورت ہو تو  $40$  سیکنڈ میں  $800$  پونڈ وزن کو  $120$  فٹ تک اٹھانے کے لیے کتنی قوت درکار ہوگی؟
- 9- ایک جسم کی حرکی توانائی (K.E) کا جسم کی کمیت " $m$ " اور اس کی رفتار " $v$ " کے مربع میں تغیر مشترک ہے۔ اگر  $45$  پونڈ کمیت اور  $24$  فٹ فی سیکنڈ والے جسم کی حرکی توانائی  $4320$  فٹ فی پونڈ ہو تو  $44$  فٹ فی سیکنڈ سے سفر کرنے والی  $3000$  پونڈ وزن کی گاڑی کی حرکی توانائی معلوم کیجیے۔



### متفرق مشق 3

کثیر الانتخابی سوالات

1- دیے گئے سوالات کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست کے لیے (✓) لگائیں۔

- (i) نسبت  $a : b$  میں  $a$  کہلاتا ہے۔  
 (a) تعلق (b) پہلی رقم (c) دوسری رقم (d) کوئی نہیں
- (ii) نسبت  $x : y$  میں  $y$  کہلاتا ہے۔  
 (a) تعلق (b) پہلی رقم (c) دوسری رقم (d) کوئی نہیں
- (iii) تناسب  $a : b :: c : d$  میں  $a$  اور  $d$  کہلاتے ہیں۔  
 (a) وسطین (b) طرفین (c) چوتھا تناسب (d) کوئی نہیں
- (iv) تناسب  $a : b :: c : d$  میں  $b$  اور  $c$  کہلاتے ہیں۔  
 (a) وسطین (b) طرفین (c) چوتھا تناسب (d) کوئی نہیں
- (v) مسلسل تناسب  $a : b = b : c$ ،  $ac = b^2$ ،  $a$  اور  $c$  کے درمیان  $b$  \_\_\_\_\_ تناسب کہلاتا ہے۔  
 (a) تیسرا (b) چوتھا (c) وسط (d) کوئی نہیں
- (vi) مسلسل تناسب  $a : b = b : c$  میں  $a$  اور  $b$  سے  $c$  \_\_\_\_\_ تناسب کہلاتا ہے۔  
 (a) تیسرا (b) چوتھا (c) وسط (d) کوئی نہیں
- (vii) تناسب  $4 : x :: 5 : 15$  میں  $x$  معلوم کیجیے۔  
 (a)  $\frac{75}{4}$  (b)  $\frac{4}{3}$  (c)  $\frac{3}{4}$  (d) 12
- (viii) اگر  $u \propto v^2$  تو  
 (a)  $u = v^2$  (b)  $u = kv^2$  (c)  $uv^2 = k$  (d)  $uv^2 = 1$
- (ix) اگر  $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$  تو  
 (a)  $y^2 = \frac{k}{x^3}$  (b)  $y^2 = \frac{1}{x^3}$  (c)  $y^2 = x^2$  (d)  $y^2 = kx^3$
- (x) اگر  $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$  تو  
 (a)  $u = wk^2$  (b)  $u = vk^2$  (c)  $u = w^2k$  (d)  $u = v^2k$

(xi)  $x^2$  اور  $y^2$  کا تیسرا تناسب ہے۔

$$\frac{y^2}{x^4} \quad (d) \quad \frac{y^4}{x^2} \quad (c) \quad x^2y^2 \quad (b) \quad \frac{y^2}{x^2} \quad (a)$$

(xii)  $x : y :: v : w$  میں چوتھا تناسب  $w$  ہے۔

$$\frac{x}{vy} \quad (d) \quad xyv \quad (c) \quad \frac{vy}{x} \quad (b) \quad \frac{xy}{v} \quad (a)$$

(xiii) اگر  $a : b = x : y$  ہو تو ابدال نسبت ہے۔

$$\frac{a}{b} = \frac{x}{y} \quad (b) \quad \frac{a}{x} = \frac{b}{y} \quad (a)$$

$$\frac{a-b}{x} = \frac{x-y}{y} \quad (d) \quad \frac{a+b}{b} = \frac{x+y}{y} \quad (c)$$

(xiv) اگر  $a : b = x : y$  ہو تو عکس نسبت ہے۔

$$\frac{a}{a-b} = \frac{x}{x-y} \quad (b) \quad \frac{a}{x} = \frac{b}{y} \quad (a)$$

$$\frac{b}{a} = \frac{y}{x} \quad (d) \quad \frac{a+b}{b} = \frac{x+y}{y} \quad (c)$$

(xv) اگر  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  ہو تو ترکیب نسبت ہے۔

$$\frac{a}{a-b} = \frac{c}{c-d} \quad (b) \quad \frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d} \quad (a)$$

$$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} \quad (d) \quad \frac{ad}{bc} \quad (c)$$

## 2- درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔

- (i) نسبت کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔
- (ii) تناسب کی تعریف کیجیے۔
- (iii) تغیر راست کی تعریف کیجیے۔
- (iv) تغیر معکوس کی تعریف کیجیے۔
- (v) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت بیان کیجیے۔
- (vi) اگر  $6 : x :: 3 : 5$  تو  $x$  معلوم کیجیے۔
- (vii) اگر  $x$  اور  $y^2$  میں تغیر معکوس ہو اور  $x = 27$  جب  $y = 4$  کی قیمت معلوم کیجیے جب  $x = 3$  ہو۔
- (viii) اگر  $u$  اور  $v$  میں تغیر معکوس ہو اور  $u = 8$  جب  $v = 3$  کی قیمت معلوم کیجیے جب  $u = 12$  ہو۔
- (ix) 6، 7، 8 کا چوتھا تناسب معلوم کیجیے۔
- (x) 16 اور 49 کا وسطیٰ تناسب معلوم کیجیے۔
- (xi) 28، 4 کا تیسرا تناسب معلوم کیجیے۔
- (xii) اگر  $y \propto \frac{x^2}{z}$  اور  $y = 28$  جب  $x = 7$ ،  $z = 2$  ہو تو  $y$  معلوم کیجیے۔



(xiii) اگر  $z \propto xy$  اور  $z = 36$  جب  $x = 2, y = 3$  ہو تو  $z$  معلوم کیجیے۔

(xiv) اگر  $w \propto \frac{1}{v^2}$  اور  $w = 2$  جب  $v = 3$  ہو تو  $w$  معلوم کیجیے۔

### 3- خالی جگہ پُر کریں۔

(i) نسبت  $\frac{(x+y)(x^2+xy+y^2)}{x^3-y^3}$  آسان ترین شکل میں \_\_\_\_\_ ہے۔

(ii) نسبت  $x : y$  میں  $x$  کو \_\_\_\_\_ کہتے ہیں۔

(iii) نسبت  $a : b$  میں  $b$  کو \_\_\_\_\_ کہتے ہیں۔

(iv) تناسب  $x : y :: a : b$  میں  $a$  اور  $y$  کو \_\_\_\_\_ کہتے ہیں۔

(v) تناسب  $m : n :: p : q$  میں  $p$  اور  $q$  کو \_\_\_\_\_ کہتے ہیں۔

(vi) تناسب  $7 : 4 :: p : 8$  میں  $p =$  \_\_\_\_\_

(vii) اگر  $9 : 12 :: m : 6$  تو  $m =$  \_\_\_\_\_

(viii) اگر  $x$  اور  $y$  میں تغیر راست ہو تو  $x =$  \_\_\_\_\_

(ix) اگر  $v$  اور  $u^3$  میں تغیر راست ہو تو  $u^3 =$  \_\_\_\_\_

(x) اگر  $w$  اور  $p^2$  میں تغیر معکوس ہو تو  $k =$  \_\_\_\_\_

(xi)  $12, 4$  کا تیسرا تناسب \_\_\_\_\_ ہے۔

(xii)  $15, 6, 5$  کا چوتھا تناسب \_\_\_\_\_ ہے۔

(xiii)  $4m^2n^4$  اور  $p^6$  کا وسطیٰ تناسب \_\_\_\_\_ ہے۔

(xiv)  $4, m, 9$  کا مسلسل تناسب \_\_\_\_\_ ہے۔

## خلاصہ

دو ہم قسم مقداروں کے درمیان تعلق **نسبت** کہلاتا ہے۔

تناسب بیان کردہ دو نسبتوں کی برابری کو ظاہر کرتا ہے۔

اگر دو نسبتیں  $a : b$  اور  $c : d$  برابر ہوں۔ تو ہم ان کو  $a : b = c : d$  لکھ سکتے ہیں۔

اگر دو مقداروں کے درمیان تعلق اس طرح کا ہو کہ ایک مقدار کے بڑھنے (کم ہونے) سے دوسری مقدار اسی نسبت سے بڑھے (کم ہو) تو ایسے تغیر کو **تغیر راست** کہتے ہیں۔

اگر دو مقداروں کے درمیان جس میں ایک مقدار کے بڑھنے (کم ہونے سے) اور دوسری مقدار اسی نسبت سے کم ہو (بڑھے) تو ایسا تعلق **تغیر معکوس** کہلاتا ہے۔  
تناسب کے مسئلے:

(1) **مسئلہ عکس نسبت:**

$$b : a = d : c \text{ تو } a : b = c : d$$

(2) **مسئلہ ابدال نسبت:**

$$a : c = b : d \text{ تو } a : b = c : d$$

(3) **مسئلہ ترکیب نسبت:**

$$\text{اگر } a : b = c : d \text{ ہو تو}$$

$$a + b : b = c + d : d \quad (i)$$

$$a : a + b = c : c + d \quad (ii)$$

اور

(4) **مسئلہ تفصیل نسبت:**

$$\text{اگر } a : b = c : d \text{ ہو تو}$$

$$a - b : b = c - d : d \quad (i)$$

$$a : a - b = c : c - d \quad (ii)$$

اور

(5) **مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت:**

$$\text{اگر } a : b = c : d \text{ ہو تو}$$

$$a + b : a - b = c + d : c - d$$

ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات میں راست اور معکوس تغیروں کے ملنے سے **مشترک تغیر** بنتا ہے۔

**K-طریقہ**

$$c = dk \text{ اور } a = bk \quad \text{یا} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \text{ تو } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \quad (a)$$

$$c = fk \text{ اور } c = dk, a = bk \text{ ہو تو} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k \quad (b)$$



## جزوی کسریں

## (PARTIAL FRACTIONS)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

- واجب کسر، غیر واجب کسر اور ناطق کسر کی تعریف کرنا۔
- ایک الجبری کسر کو جزوی کسروں میں تحلیل کرنا جب الجبری کسر کا نسب نامہ مشتمل ہو:

  - غیر مکرر یک درجی اجزائے ضربی پر
  - مکرر یک درجی جزو ضربی پر
  - غیر مکرر دو درجی جزو ضربی پر
  - مکرر دو درجی جزو ضربی پر

## 4.1 کسر (Fraction)

دو اعداد یا دو الجبری جملوں کی نسبت کو **کسر** کہتے ہیں نسبت کو بار (—) سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم مقسوم علیہ (Dividend) کو بار کے اوپر اور تقسیم کنندہ (Divisor) کو بار کے نیچے لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر،  $\frac{x^2+2}{x-2}$  ایک کسر ہے جبکہ  $x-2 \neq 0$  اور اگر  $x-2=0$  ہو تو ہم کسر  $\frac{x^2+2}{x-2}$  کی تعریف نہیں کر سکتے کیونکہ  $x-2=0$  ہو تو  $x=2$  دی گئی کسر کے نسب نما (Denominator) کو صفر (Zero) کر دیتا ہے۔

### 4.1.1 ناطق کسر (Rational Fraction)

$\frac{N(x)}{D(x)}$  قسم کا جملہ **ناطق کسر** کہلاتا ہے جبکہ  $N(x)$  اور  $D(x)$  متغیر  $x$  میں حقیقی عددی سروں کے ساتھ کثیر رتمیاں ہوں۔ جملے میں کثیر رتمی  $D(x) \neq 0$ ۔ مثال کے طور پر  $\frac{x^2+3}{(x+1)^2(x+2)}$  اور  $\frac{2x}{(x-1)(x+2)}$  ناطق کسریں ہیں۔

### 4.1.2 واجب کسر (Proper Fraction)

اگر کسی ناطق کسر  $\frac{N(x)}{D(x)}$  میں  $N(x)$  اور  $D(x)$  متغیر  $x$  میں کثیر رتمیاں ہوں اور کثیر رتمی  $N(x)$  کا درجہ کثیر رتمی  $D(x)$  سے کم ہو، جبکہ  $D(x) \neq 0$  ہو تو ایسی کسر **واجب کسر** کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر،  $\frac{2x-3}{x^2+4}$ ،  $\frac{2}{x+1}$  اور  $\frac{3x^2}{x^3+1}$  واجب کسور ہیں۔

### 4.1.3 غیر واجب کسر (Improper Fraction)

اگر کسی ناطق کسر  $\frac{N(x)}{D(x)}$  میں کثیر رتمی  $N(x)$  کا درجہ کثیر رتمی  $D(x)$  کے درجے کے برابر ہو یا زیادہ ہو تو ایسی کسر کو **غیر واجب کسر** کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر،  $\frac{5x}{x+2}$ ،  $\frac{3x^2+2}{x^2+7x+12}$  اور  $\frac{6x^4}{x^3+1}$  غیر واجب کسور ہیں۔ کسی بھی غیر واجب کسر کو تقسیم کے عمل کے ذریعے ایک کثیر رتمی اور ایک واجب کسر کے مجموعے کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجہ سے بڑا ہو یا برابر ہو تو ہم  $N(x)$  کو  $D(x)$  سے تقسیم کر کے حاصل قسمت کثیر رتمی  $Q(x)$  اور ایک باقی کثیر رتمی  $R(x)$  حاصل کر سکتے ہیں جبکہ  $R(x)$  کا درجہ  $D(x)$  کے درجہ سے کم ہوتا ہے۔

پس  $\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$  جبکہ  $Q(x)$  حاصل قسمت کثیر رتمی اور  $\frac{R(x)}{D(x)}$  واجب کسر ہے۔ مثال کے طور پر  $\frac{x^2+1}{x+1}$  ایک غیر واجب کسر ہے۔



اس لیے  
 یہاں غیر واجب کسر  $\frac{x^2+1}{x+1}$  کو ایک حاصل قسمت کثیر رقی  $Q(x) = x - 1$  اور ایک واجب کسر  $\frac{2}{x+1}$  میں  
 تحلیل کیا گیا ہے۔

**مثال 1:**  $\frac{x^3 - x^2 + x + 1}{x^2 + 5}$  کو واجب کسر میں تبدیل کریں۔

**حل:** فرض کریں کہ  $D(x) = x^2 + 5$  اور  $N(x) = x^3 - x^2 + x + 1$

$$\begin{array}{r} x-1 \\ x^2+5 \overline{) x^3-x^2+x+1} \\ \underline{-x^3} \quad \pm 5x \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -x^2-4x+1 \\ \mp x^2 \quad \mp 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -4x+6 \end{array}$$

$$\frac{x^3 - x^2 + x + 1}{x^2 + 5} = (x - 1) + \frac{-4x + 6}{x^2 + 5}$$

لہذا

سرگرمی: واجب اور غیر واجب کسروں کو علیحدہ علیحدہ کریں۔

$$(i) \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 2} \quad (ii) \frac{2x + 5}{(x + 1)(x + 2)} \quad (iii) \frac{x^3 + x^2 + 1}{x^3 - 1} \quad (iv) \frac{2x}{(x - 1)(x - 2)}$$

سرگرمی: مندرجہ ذیل غیر واجب کسروں کو واجب کسروں میں تبدیل کریں۔

$$(i) \frac{3x^2 - 2x - 1}{x^2 - x + 1} \quad (ii) \frac{6x^3 + 5x^2 - 6}{2x^2 - x - 1}$$

## 4.2 کسر کی جزوی کسور میں تحلیل

### Resolution of Fraction into Partial Fractions

ذیل میں تین کسریں دی گئی ہیں جن کے شروع میں جمع یا تفریق کا نشان ہے۔ ہم آسانی سے ان تینوں کسروں کو جمع کر کے ایک کسر بنا سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+1} + \frac{4}{x} &= \frac{x(x+1) - 2x(x-1) + 4(x-1)(x+1)}{x(x-1)(x+1)} \quad \text{پس} \\ &= \frac{x^2 + x - 2x^2 + 2x + 4x^2 - 4}{x(x-1)(x+1)} = \frac{3x^2 + 3x - 4}{x(x-1)(x+1)} \end{aligned}$$

دی ہوئی کسروں کی مختصر ترین شکل میں کسر  $\frac{3x^2 + 3x - 4}{x(x-1)(x+1)}$  حاصل کسر کہلاتی ہے۔ دی گئی کسور

$\frac{1}{x-1}$ ،  $-\frac{2}{x+1}$  اور  $\frac{4}{x}$  کسر  $\frac{3x^2 + 3x - 4}{x(x-1)(x+1)}$  کے اجزاء ہیں۔ ان کسروں کو جزوی کسور کہتے ہیں۔ اس یونٹ میں ہم دی ہوئی حاصل کسر کی جزوی کسریں معلوم کریں گے۔ ہر واجب کسر  $\frac{N(x)}{D(x)}$ ،  $D(x) \neq 0$  کو ہم الجبری کسروں کے مجموعے میں مندرجہ ذیل طریقے سے تحلیل کر سکتے ہیں۔

#### 4.2.1 الجبری کسر کو جزوی کسور میں تحلیل کرنا جب $D(x)$ غیر مکرر ایک درجی اجزائے ضربی پر مشتمل ہو۔

**پہلا طریقہ (Rule I)** اگر ایک درجی جزو ضربی  $(ax + b)$ ،  $D(x)$  کا جزو ضربی ہو تو جزوی کسر  $\frac{A}{ax + b}$  کی شکل میں ہوگی جب کہ مستقل مقدار  $A$  معلوم کرنا ہوتی ہے۔

$\frac{N(x)}{D(x)}$  میں کثیر رقی  $D(x)$  کو اس طرح لکھ سکتے ہیں۔

$$D(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2) \dots (a_nx + b_n)$$

یہاں تمام اجزائے ضربی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

$$\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{A_1}{a_1x + b_1} + \frac{A_2}{a_2x + b_2} + \frac{A_3}{a_3x + b_3} + \dots + \frac{A_n}{a_nx + b_n}$$

یہاں مستقل مقداریں  $A_1, A_2, \dots, A_n$  معلوم کرنا ہوتی ہیں۔ دی ہوئی مثال سے واضح ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ان مقداروں کو معلوم کر سکتے ہیں۔

**مثال 1:**  $\frac{5x + 4}{(x - 4)(x + 2)}$  کو جزوی کسروں میں تبدیل (تحلیل) کریں۔

$$\frac{5x + 4}{(x - 4)(x + 2)} = \frac{A}{x - 4} + \frac{B}{x + 2} \quad \text{حل: فرض کریں کہ (i)}$$

دونوں طرف  $(x - 4)(x + 2)$  سے ضرب دینے سے

$$5x + 4 = A(x + 2) + B(x - 4) \quad \text{(ii)}$$

مساوات (ii) ایک کلیہ (مماثلت) ہے جو کہ  $x$  کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہے لہذا  $x = 4$  اور  $x = -2$  کے لیے بھی درست ہے۔

مساوات (ii) میں  $x - 4 = 0$  یا  $x = 4$  رکھنے سے ( $A$  کے متناظرہ جزو ضربی)

$$5(4) + 4 = A(4 + 2) \Rightarrow \boxed{A = 4}$$

مساوات (ii) میں  $x + 2 = 0$  یا  $x = -2$  رکھنے سے ( $B$  کے متناظرہ جزو ضربی)

$$5(-2) + 4 = B(-2 - 4) \Rightarrow -6B = -6 \Rightarrow \boxed{B = 1}$$



پس  $\frac{1}{x+2}$ ،  $\frac{4}{x-4}$  مطلوبہ جزوی کسریں ہیں۔

$$\frac{5x+4}{(x-4)(x+2)} = \frac{4}{x-4} + \frac{1}{x+2} \quad \text{لہذا}$$

یہ طریقہ "زیر کا طریقہ" کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب مخارج  $D(x)$  میں ایک درجی اجزائے ضربی ہوں۔

### مثالت (Identity)

مثالت ایک ایسی مساوات ہوتی ہے جو مساوات میں موجود متغیر کی ہر قیمت کے لیے درست ہوتی ہے۔  
مثال کے طور پر  $2(x+1) = 2x + 2$  اور  $\frac{2x^2}{2} = x^2$  مماثلتیں ہیں کیونکہ یہ مساواتیں  $x$  کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہیں۔

**مثال 2:**  $\frac{1}{3+x-2x^2}$  کو جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

**حل:**  $\frac{1}{3+x-2x^2}$  کو ہم آسانی کے لیے  $\frac{-1}{2x^2-x-3}$  لکھ سکتے ہیں۔

$$D(x) = 2x^2 - x - 3 = 2x^2 - 3x + 2x - 3 \quad \text{یہاں مخارج}$$

$$= x(2x-3) + 1(2x-3) = (x+1)(2x-3)$$

$$\frac{-1}{2x^2-x-3} = \frac{-1}{(x+1)(2x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{2x-3} \quad \text{فرض کریں کہ}$$

$$-1 = A(2x-3) + B(x+1) \quad \text{دونوں طرف } (x+1)(2x-3) \text{ سے ضرب دینے سے}$$

مساوات کے طرفین میں موجود  $x$  کے عددی سروں اور مستقل مقداًروں کو برابر رکھنے سے، ہم حاصل کرتے ہیں۔

$$2A + B = 0 \quad (i) \quad \text{اور} \quad -3A + B = -1 \quad (ii)$$

(i) اور (ii) کو حل کرنے سے  $A = \frac{1}{5}$  اور  $B = -\frac{2}{5}$  حاصل ہوتے ہیں۔

$$\frac{1}{3+x-2x^2} = \frac{1}{5(x+1)} - \frac{2}{5(2x-3)} \quad \text{پس}$$

**نوٹ:**  $\frac{N(x)}{D(x)}$  شکل کی تمام ناطق کسروں کو تحلیل کرنے کا عام طریقہ درج ذیل ہے۔

(i) شمار کنندہ  $N(x)$  کا درجہ نسب نما  $D(x)$  کے درجہ سے کم ہونا چاہیے۔

(ii) اگر  $N(x)$  کی ڈگری (درجہ)  $D(x)$  کی ڈگری سے زیادہ ہو تو تقسیم کا عمل کیا جاتا ہے اور باقی بچنے والی

کسر کو جزوی کسور میں لکھ سکتے ہیں۔

(iii) مستقل مقداروں  $A, B, C$  وغیرہ کا مناسب استعمال کریں۔

(iv) دونوں اطراف کو ذواضعاف اقل سے ضرب دیں۔

(v) دونوں طرف رقوں کو ترتیب نزولی میں لکھیں۔

(vi) دونوں طرف  $x$  کی ایک جیسی طاقتوں کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے مستقل مقداروں کی تعداد کے برابر مساواتیں حاصل ہوتی ہیں۔

(vii) ان مساواتوں کو حل کرنے سے ہم مستقل مقداروں کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

## مشق 4.1

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

1.  $\frac{7x-9}{(x+1)(x-3)}$

2.  $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$

3.  $\frac{3x-1}{x^2-1}$

4.  $\frac{x-5}{x^2+2x-3}$

5.  $\frac{3x+3}{(x-1)(x+2)}$

6.  $\frac{7x-25}{(x-4)(x-3)}$

7.  $\frac{x^2+2x+1}{(x-2)(x+3)}$

8.  $\frac{6x^3+5x^2-7}{3x^2-2x-1}$

4.2.2 کس کی تحلیل جب  $D(x)$  مکرر ایک درجی جزو ضربی پر مشتمل ہو

دوسرا طریقہ (Rule II)

اگر کوئی ایک درجی جزو ضربی  $(ax+b)$ ،  $D(x)$  کی  $n$  مرتبہ جزو ضربی ہو تو جزوی کسور اس شکل میں ہوں گی۔

$$\frac{A_1}{(ax+b)} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \dots + \frac{A_n}{(ax+b)^n}$$

یہاں  $A_1, A_2, \dots, A_n$  مستقل مقداریں ہیں اور  $n \geq 2$  مثبت صحیح عدد ہے۔

$$\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{A_1}{(ax+b)} + \frac{A_2}{(ax+b)^2} + \dots + \frac{A_n}{(ax+b)^n} \quad \text{اس لیے}$$

مستقل مقداروں کو معلوم کرنے اور کس کو جزوی کسروں میں تحلیل کرنے کا طریقہ کار درج ذیل مثال میں واضح

کیا گیا ہے۔

مثال:  $\frac{1}{(x-1)^2(x-2)}$  کو جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

$$\frac{1}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2}$$

حل: فرض کریں کہ

طرفین کو  $(x-1)^2(x-2)$  سے ضرب دینے سے

$$1 = A(x-1)(x-2) + B(x-2) + C(x-1)^2$$

$$\Rightarrow A(x^2-3x+2) + B(x-2) + C(x^2-2x+1) = 1 \quad (i)$$



چونکہ (i) ایک ایسی مساوات ہے جو متغیر  $x$  کی ہر قیمت کے لیے درست ہے۔

(i) میں  $x - 1 = 0$  یا  $x = 1$  درج کرنے سے

$$B(1 - 2) = 1 \Rightarrow -B = 1 \text{ یا } B = -1$$

(i) میں  $x - 2 = 0$  یا  $x = 2$  رکھنے سے

$$C(2 - 1)^2 = 1 \Rightarrow C = 1$$

(i) میں دونوں اطراف میں موجود  $x^2$  کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے

$$A + C = 0 \Rightarrow A = -C \Rightarrow A = -1$$

$$\frac{-1}{x-1}, \frac{1}{x-1^2}, \frac{1}{(x-2)}$$

$$\frac{1}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{پس}$$

اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ

1- ہم مستقل مقدار کی قیمت معلوم کرنے کے لیے زیروز کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔

2- زیروز کا طریقہ استعمال کرنے کے بعد  $x$  کی ایک جیسی قوتوں کے عددی سروں کا موازنہ کر سکتے ہیں۔

## مشق 4.2

حبزوی کسور میں تحلیل کریں۔

1.  $\frac{x^2 - 3x + 1}{(x-1)^2(x-2)}$

2.  $\frac{x^2 + 7x + 11}{(x+2)^2(x+3)}$

3.  $\frac{9}{(x-1)(x+2)^2}$

4.  $\frac{x^4 + 1}{x^2(x-1)}$

5.  $\frac{7x+4}{(3x+2)(x+1)^2}$

6.  $\frac{1}{(x-1)^2(x+1)}$

7.  $\frac{3x^2 + 15x + 16}{(x+2)^2}$

8.  $\frac{1}{(x^2-1)(x+1)}$

4.2.3 کسور کو تحلیل کرنا جب  $D(x)$  غیر مکررات ابل تحویل حبزوضربی پر مشتمل ہو۔

تیسرا طریقہ (Rule III)

اگر  $D(x)$  میں دودرجی حبزوضربی  $ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ )، موجود ہو تو حبزوی کسر  $\frac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)}$  طرز کی ہو

گی جبکہ  $A$  اور  $B$  مستقل مقداریں ہیں جو کہ معلوم کرنا ہوتی ہیں۔

مثال:  $\frac{11x+3}{(x-3)(x^2+9)}$  کو حبزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

**حل:** فرض کریں کہ  $\frac{11x+3}{(x-3)(x^2+9)} = \frac{A}{(x-3)} + \frac{Bx+C}{x^2+9}$

طرفین کو  $(x-3)(x^2+9)$  سے ضرب دینے سے

$$11x+3 = A(x^2+9) + (Bx+C)(x-3)$$

$$\Rightarrow 11x+3 = A(x^2+9) + B(x^2-3x) + C(x-3) \quad (i)$$

چونکہ (i) ایک مماثلت ہے۔ اس میں  $x=3$  رکھنے سے

$$33+3 = A(9+9) \Rightarrow 18A = 36 \Rightarrow A = 2$$

(i) میں  $x^2$  اور  $x$  کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے

$$A+B=0 \Rightarrow B=-2$$

$$-3B+C=11 \Rightarrow -3(-2)+C=11 \Rightarrow C=5$$

اس لیے  $\frac{-2x+5}{x^2+9}$  اور  $\frac{2}{x-3}$  مطلوبہ جزوی کسور ہیں۔

$$\frac{11x+3}{(x-3)(x^2+9)} = \frac{2}{x-3} + \frac{-2x+5}{x^2+9} \quad \text{پس}$$

### مشق 4.3

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

1.  $\frac{3x-11}{(x+3)(x^2+1)}$
2.  $\frac{3x+7}{(x^2+1)(x+3)}$
3.  $\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}$
4.  $\frac{9x-7}{(x+3)(x^2+1)}$
5.  $\frac{3x+7}{(x+3)(x^2+4)}$
6.  $\frac{x^2}{(x+2)(x^2+4)}$
7.  $\frac{1}{x^3+1}$  [اشارہ:  $\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}$ ]
8.  $\frac{x^2+1}{x^3+1}$

**4.2.4** کس کو تحلیل کرنا جب  $D(x)$  مسکرات ابل تحویل جزو ضربی پر مشتمل ہو۔

**چوتھا طریقہ (Rule IV)**

اگر  $D(x)$  میں دو درجی جزو ضربی  $(ax^2+bx+c)^2$  جبکہ  $a \neq 0$  موجود ہو تو جزوی کسور کو یوں لکھتے ہیں۔

$$\frac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)} + \frac{Cx+D}{(ax^2+bx+c)^2}$$

مستقل مقداروں  $A, B, C, D$  کو عام طریقے سے معلوم کرتے ہیں۔

**مثال 1:**  $\frac{x^3-2x^2-2}{(x^2+1)^2}$  کو جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

**حل:** ایک واجب کسر ہے کیونکہ نسب نما کی ڈگری (درجہ) شمار کنندہ کی ڈگری سے بڑی ہے۔

جزوی کسریں



$$\frac{x^3 - 2x^2 - 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 1)^2}$$

فرض کریں کہ

طرفین کو  $(x^2 + 1)^2$  سے ضرب دینے سے

$$x^3 - 2x^2 - 2 = (Ax + B)(x^2 + 1) + Cx + D$$

$$x^3 - 2x^2 - 2 = A(x^3 + x) + B(x^2 + 1) + Cx + D$$

(i)

$x, x^2, x^3$  کے عددی سروں (Coefficients) اور مستقل مقداًروں کو برابر رکھنے سے ہم حاصل کرتے ہیں۔

$$A = 1$$

$x^3$  کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے

$$B = -2$$

$x^2$  کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے

$$A + C = 0 \Rightarrow C = -1$$

$x$  کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے

$$B + D = -2$$

مستقل مقداًروں کو برابر کرنے سے

$$D = -2 - B = -2 - (-2) = -2 + 2 = 0 \Rightarrow D = 0$$

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x - 2}{x^2 + 1} + \frac{-x + 0}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x - 2}{x^2 + 1} - \frac{x}{(x^2 + 1)^2}$$

پس

**مثال 2:**  $\frac{2x + 1}{(x - 1)(x^2 + 1)^2}$  کو جزوی کسور میں تحلیل کریں۔

**حل:** فرض کریں کہ  $\frac{2x + 1}{(x - 1)(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} + \frac{Dx + E}{(x^2 + 1)^2}$

طرفین کو  $(x - 1)(x^2 + 1)^2$  سے ضرب دینے سے

$$2x + 1 = A(x^2 + 1)^2 + (Bx + C)(x - 1)(x^2 + 1) + (Dx + E)(x - 1) \quad (i)$$

اب ہم زیر و کا طریقہ استعمال کرتے ہیں  $x - 1 = 0$  یا  $x = 1$  رکھنے سے

$$3 = A(1 + 1)^2 \Rightarrow A = \frac{3}{4}$$

ساوات (i) کی رقموں کو ترتیب نزولی میں لکھنے سے

$$2x + 1 = A(x^4 + 2x^2 + 1) + Bx(x^3 - x^2 + x - 1) + C(x^3 - x^2 + x - 1) + D(x^2 - x) + E(x - 1)$$

$$2x + 1 = A(x^4 + 2x^2 + 1) + B(x^4 - x^3 + x^2 - x) + C(x^3 - x^2 + x - 1) + D(x^2 - x) + E(x - 1)$$

$$2x + 1 = (A + B)x^4 + (-B + C)x^3 + (2A + B - C + D)x^2 + (-B + C - D + E)x + (A - C - E)$$

طرفین میں  $x^4, x^3, x^2, x$  اور  $x$  کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے

$$A + B = 0 \Rightarrow B = -\frac{3}{4}$$

$x^4$  کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے

$$-B + C = 0 \Rightarrow C = \frac{-3}{4}$$

$x^3$  کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے

$$2A + B - C + D = 0 \Rightarrow D = \frac{-3}{2}$$

$x^2$  کے عددی سروں کو برابر رکھنے سے

$$-B + C - D + E = 2 \quad x \text{ کے عددی سروں کو برابر رکھتے سے}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{3}{4} + \frac{3}{2} + E = 2 \Rightarrow E = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4(x-1)} \text{ اور } \frac{-\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}}{x^2 + 1}, \frac{-\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}}{(x^2 + 1)^2} \text{ مطلوبہ جزوی کسور ہیں۔}$$

$$\frac{2x+1}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{3}{4(x-1)} - \frac{3(x+1)}{4(x^2+1)} - \frac{(3x-1)}{2(x^2+1)^2} \quad \text{پس}$$

## مشق 4.4

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

1.  $\frac{x^3}{(x^2+4)^2}$
2.  $\frac{x^4+3x^2+x+1}{(x+1)(x^2+1)^2}$
3.  $\frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)^2}$
4.  $\frac{x^2}{(x-1)(x^2+1)^2}$
5.  $\frac{x^4}{(x^2+2)^2}$
6.  $\frac{x^5}{(x^2+1)^2}$

## مفروق مشق 4

کثیرالاعتدالی سوالات

1-

دیے گئے سوالات کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست کے لیے (✓) لگائیں۔

(i) مماثلت  $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$  کی \_\_\_\_\_ کے لیے درست ہے۔

(a) ایک قیت (b) دو قیمتوں

(c) تمام قیمتوں (d) کسی کے لیے نہیں

(ii) تقابل  $\frac{N(x)}{D(x)}$  قسم کا \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔ جبکہ  $D(x) \neq 0$  نیز  $N(x)$  اور  $D(x)$  کثیر رقمیاں ہیں۔

(a) مماثلت (b) مساوات

(c) کسر (d) ان میں سے کوئی نہیں

(iii) کسر جس میں شمار کنندہ کا درجہ مخرج کے درجہ سے زیادہ ہو \_\_\_\_\_ کہلاتی ہے۔

(a) واجب کسر (b) غیر واجب کسر

(c) مساوات (d) ان میں سے کوئی نہیں



(iv) کسر جس شمار کنندہ کی ڈگری مخرج کی ڈگری سے کم ہو \_\_\_\_\_ کہلاتی ہے۔

(a) مساوات (b) غیر واجب کسر

(c) مماثلت (d) واجب کسر

(v)  $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$  ایک \_\_\_\_\_ ہے۔

(a) غیر واجب کسر (b) مساوات

(c) واجب کسر (d) ان میں سے کوئی نہیں

(vi)  $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$  ایک \_\_\_\_\_ ہے۔

(a) یک درجی مساوات (b) مساوات

(c) مماثلت (d) ان میں سے کوئی نہیں

(vii)  $\frac{x^3+1}{(x-1)(x+2)}$  ایک \_\_\_\_\_ ہے۔

(a) واجب کسر (b) غیر واجب کسر

(c) مماثلت (d) مستقل رقم

(viii)  $\frac{x-2}{(x-1)(x+2)}$  کی جزوی کسور \_\_\_\_\_ قسم کی ہوتی ہیں۔

(a)  $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$  (b)  $\frac{Ax}{x-1} + \frac{B}{x+2}$

(c)  $\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x+2}$  (d)  $\frac{Ax+B}{x-1} + \frac{C}{x+2}$

(ix)  $\frac{x+2}{(x+1)(x^2+2)}$  کی جزوی کسور \_\_\_\_\_ قسم کی ہوتی ہیں۔

(a)  $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x^2+2}$  (b)  $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2}$

(c)  $\frac{Ax+B}{x+1} + \frac{C}{x^2+2}$  (d)  $\frac{A}{x+1} + \frac{Bx}{x^2+2}$

(x)  $\frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}$  کی جزوی کسور \_\_\_\_\_ قسم کی ہوتی ہیں۔

(a)  $\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}$  (b)  $1 + \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x-1}$

(c)  $1 + \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}$  (d)  $\frac{Ax+B}{(x+1)} + \frac{C}{x-1}$

## 2- درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔

- (i) ناطق کسر کی تعریف کریں۔  
(ii) واجب کسر کیا ہوتی ہے؟  
(iii) غیر واجب کسر کیا ہوتی ہے؟  
(iv) جزوی کسر کیا ہوتی ہیں؟  
(v)  $\frac{x-2}{(x+2)(x+3)}$  کی جزوی کسر کس طرح بنائی جاسکتی ہیں؟  
(vi)  $\frac{1}{x^2-1}$  کو جزوی کسر میں تحلیل کریں۔  
(vii)  $\frac{3}{(x+1)(x-1)}$  کی جزوی کسر معلوم کریں۔  
(viii)  $\frac{x}{(x-3)^2}$  کو جزوی کسر میں تحلیل کریں۔  
(ix)  $\frac{x}{(x+a)(x-a)}$  کی جزوی کسر کس طرح بنائی جاسکتی ہیں؟  
(x) کیا  $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$  ایک مماثلت ہے؟

## خلاصہ

کسر دو اعداد یا الجبرائی جملوں کی نسبت ہوتی ہے۔

قسم کی کسر جس میں  $N(x)$  اور  $D(x)$  حقیقی عددی سروں کے ساتھ کثیر رقیماں ہوں جبکہ  $D(x) \neq 0$

ناطق کسر کہلاتی ہے۔ ہر کسری جملے کو دو کثیر رقیموں کی نسبت میں ظاہر کر سکتے ہیں۔

ناطق کسر  $\frac{N(x)}{D(x)}$  جبکہ  $D(x) \neq 0$ ، واجب کسر کہلاتی ہے اگر شمار کنندہ میں کثیر رقی  $N(x)$  کا درجہ نسب نما میں

کثیر رقی  $D(x)$  کے درجہ سے کم ہو۔

ناطق کسر  $\frac{N(x)}{D(x)}$  جبکہ  $D(x) \neq 0$ ، غیر واجب کسر کہلاتی ہے اگر شمار کنندہ میں کثیر رقی  $N(x)$  کا درجہ نسب نما

میں کثیر رقی  $D(x)$  کے درجہ سے زیادہ ہو یا برابر ہو۔

جزوی کسر: حاصل کسر  $\frac{N(x)}{D(x)}$  جبکہ  $D(x) \neq 0$  کی تحلیل جب:

(a)  $D(x)$ ، غیر مکرر ایک درجی اجزائے ضربی پر مشتمل ہو۔

(b)  $D(x)$ ، مکرر ایک درجی جزو ضربی پر مشتمل ہو۔

(c)  $D(x)$ ، غیر مکرر، دو درجی جزو ضربی پر مشتمل ہو۔

(d)  $D(x)$ ، مکرر دو درجی جزو ضربی پر مشتمل ہو۔



# سیٹ اور تفاعل

## (SETS AND FUNCTIONS)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

- سیٹ
- سیٹوں  $P, O, E, Z, W, N$  اور  $Q$  کی دہرائی کرنا۔
- سیٹوں پر عوامل  $(\cup, \cap, \setminus, \dots)$  کی پہچان کرنا۔
- سیٹوں پر یونین، تقاطع، فرق اور کمپلیمنٹ کا عمل درآمد کرنا۔
- دو یا تین سیٹوں کے یونین اور تقاطع کی مندرجہ ذیل خصوصیات کو ثابت کرنا۔
  - یونین کی خاصیت مبادلہ
  - تقاطع کی خاصیت مبادلہ
  - یونین کی خاصیت تلازم
  - تقاطع کی خاصیت تلازم
  - یونین کی تقاطع پر خاصیت تقسیمی
  - تقاطع کی یونین پر خاصیت تقسیمی
  - ڈی مارگنز کے قوانین
- دیے ہوئے سیٹوں کی بنیادی خصوصیات کو صحیح ثابت کرنا۔
- وین ڈایا گرام کے ذریعہ مندرجہ ذیل خصوصیات کو ظاہر کرنا۔
  - سیٹوں کا یونین اور تقاطع
  - سیٹ کا کمپلیمنٹ
- وین ڈایا گرام کے ذریعہ مندرجہ ذیل کو صحیح ثابت کرنا۔
  - سیٹوں کے یونین اور تقاطع کا قانون مبادلہ
  - ڈی مارگنز کے قوانین

- قانون ملازم
- قانون تقسیمی

• مرتب جوڑوں اور کار تیسری ضربی سیٹ کی پہچان کرنا۔

• ثنائی ربط کی تعریف کرنا اور اس کے ڈومین سیٹ اور رینج سیٹ کی پہچان کرنا۔

• تقابل (فنکشن) کی تعریف اور اس کے ڈومین سیٹ، کوڈومین سیٹ، اور رینج سیٹ کی پہچان کرنا۔

• مندرجہ ذیل کا عملی طور واضح کرنا۔

• ان ٹو تقابل

• ون۔ ون تقابل

• ان ٹو اور ون۔ ون تقابل (ان جیکٹیو فنکشن)

• آن ٹو تقابل (سر جیکٹیو فنکشن)

• ون۔ ون اور آن ٹو تقابل (بائی جیکٹیو فنکشن)

• جانچنا کہ دیا ہوا ربط تقابل ہے یا نہیں۔

• ون۔ ون مطابقت اور ون۔ ون تقابل کے درمیان فرق کو ظاہر کرنا۔

• اوپر دیے گئے تمام تصورات کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے کے لیے کافی سوال مشقوں میں شامل کرنا۔



## 5.1 سیٹ (SET)

واضح اشیا کا مجموعہ، سیٹ کہلاتا ہے اور سیٹ کو A, B, C وغیرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

### 5.1.1(i) چند اہم سیٹ (Some Important Sets):

سیٹ تھیوری میں، ہم عام طور پر درج ذیل اعداد کے سیٹوں کو بنیادی علامتوں سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\} = \text{قدرتی اعداد کا سیٹ}$$

$$W = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\} = \text{مکمل اعداد کا سیٹ}$$

$$Z = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\} = \text{صحیح اعداد کا سیٹ}$$

$$E = \{0, \pm 2, \pm 4, \dots\} = \text{تمام جفت اعداد کا سیٹ}$$

$$O = \{\pm 1, \pm 3, \pm 5, \dots\} = \text{تمام طاق اعداد کا سیٹ}$$

$$P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\} = \text{مفرد اعداد کا سیٹ}$$

$$Q = \{x \mid x = \frac{m}{n}, \text{ جبکہ } m, n \in Z \text{ اور } n \neq 0\} = \text{تمام ناطق اعداد کا سیٹ}$$

$$Q' = \{x \mid x \neq \frac{m}{n}, \text{ جبکہ } m, n \in Z \text{ اور } n \neq 0\} = \text{تمام غیر ناطق اعداد کا سیٹ}$$

$$R = Q \cup Q' = \text{تمام حقیقی اعداد کا سیٹ}$$

### 5.1.1(ii) سیٹوں پر عوامل (Union, Intersection, ... ) کی پہچان

Recognize operations on sets (Union, Intersection, ... ):

#### (a) سیٹوں کا یونین (Union of sets)

دو سیٹوں A اور B کا یونین سیٹ ان تمام ارکان پر مشتمل ہوتا ہے جو A میں یا B میں یا دونوں میں ہوں۔ اس کو  $A \cup B$  لکھتے ہیں اور A یونین B پڑھتے ہیں۔

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ یا } x \in B \text{ یا } x \in A \text{ اور } B\} \quad \text{پس}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{اور} \quad B = \{4, 5, 6, 7\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

مثال کے طور پر، اگر  
تو

#### (b) سیٹوں کا تقاطع (Intersection of sets)

دو سیٹوں A اور B کا تقاطع ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو A اور B کے تمام مشترک ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو  $A \cap B$  لکھتے ہیں اور A تقاطع B پڑھتے ہیں۔

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ اور } x \in B\}$$

پس

$$x \in A \cap B \Rightarrow x \in A \text{ اور } x \in B$$

ظاہر ہے کہ

$$A = \{a, b, c, d\} \quad \text{اور} \quad B = \{c, d, e, f\}$$

مثال کے طور پر، اگر

$$A \cap B = \{c, d\}$$

تو

### (c) سیٹوں کا فرق (Difference of sets)

اگر  $A$  اور  $B$  دو سیٹ ہوں تو ان کے فرق  $A - B$  یا  $A \setminus B$  کو یوں بیان کرتے ہیں۔

$$A - B = \{x | x \in A \text{ اور } x \notin B\}$$

$$B - A = \{x | x \in B \text{ اور } x \notin A\}$$

اسی طرح

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

مثال کے طور پر، اگر

$$B = \{2, 4, 5, 6, 8\}$$

اور

$$A - B = \{1, 2, 3, 4, 5\} - \{2, 4, 5, 6, 8\} = \{1, 3\}$$

تو

$$B - A = \{2, 4, 5, 6, 8\} - \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{6, 8\}.$$

اور

### (d) سیٹ کا مکمل (Complement of a set)

اگر  $U$  ایک یونیورسل سیٹ ہو اور  $A$  اس کا تحتی سیٹ ہو تو  $A$  کے مکمل سیٹ میں  $U$  کے وہ تمام ارکان شامل ہوتے ہیں جو سیٹ  $A$  کے رکن نہیں ہوتے۔ اس کو  $A'$  یا  $A^c$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$A' = U - A = \{x | x \in U \text{ اور } x \notin A\}$$

اس لیے

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 10\} \quad \text{اور} \quad A = \{2, 4, 6, 8\}$$

مثال کے طور پر، اگر

$$A' = U - A = \{1, 2, 3, \dots, 10\} - \{2, 4, 6, 8\} = \{1, 3, 5, 7, 9, 10\}$$

تو

### 5.1.1 (iii) سیٹوں پر عوامل کا سرانجام دینا (Perform operations on sets)

**مثال:** اگر  $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ ,  $A = \{2, 3, 5, 7\}$ ,  $B = \{3, 5, 8\}$  تو معلوم کریں۔

$$(i) A \cup B$$

$$(ii) A \cap B$$

$$(iii) A - B$$

$$(iv) A' \text{ اور } B'$$

**حل:**

$$(i) A \cup B = \{2, 3, 5, 7\} \cup \{3, 5, 8\} = \{2, 3, 5, 7, 8\}$$

$$(ii) A \cap B = \{2, 3, 5, 7\} \cap \{3, 5, 8\} = \{3, 5\}$$

$$(iii) A \setminus B = \{2, 3, 5, 7\} \setminus \{3, 5, 8\} = \{2, 7\}$$

$$(iv) A' = U - A = \{1, 2, 3, \dots, 10\} - \{2, 3, 5, 7\} = \{1, 4, 6, 8, 9, 10\}$$

$$B' = U - B = \{1, 2, 3, \dots, 10\} - \{3, 5, 8\} = \{1, 2, 4, 6, 7, 9, 10\}$$



## مشق 5.1

- 1- اگر  $Y = \{2, 4, 5, 9\}$  اور  $X = \{1, 4, 7, 9\}$  ہو تو معلوم کریں۔
- (i)  $X \cup Y$  (ii)  $X \cap Y$  (iii)  $Y \cup X$  (iv)  $Y \cap X$
- 2- اگر  $X =$  مفرد اعداد جو 17 سے چھوٹے یا برابر ہوں، کا سیٹ  
 پہلے 12 قدرتی اعداد کا سیٹ  $Y =$  اور  
 تو مندرجہ ذیل معلوم کریں۔
- (i)  $X \cup Y$  (ii)  $Y \cup X$  (iii)  $X \cap Y$  (iv)  $Y \cap X$
- 3- اگر  $T = O^+$ ,  $Y = Z^+$ ,  $X = \phi$  ہو تو معلوم کریں۔
- (i)  $X \cup Y$  (ii)  $X \cup T$  (iii)  $Y \cup T$   
 (iv)  $X \cap Y$  (v)  $X \cap T$  (vi)  $Y \cap T$
- 4- اگر  $U = \{x \mid x \in N \wedge 3 < x \leq 25\}$
- $X = \{x \mid x \in P \wedge 8 < x < 25\}$  اور  $Y = \{x \mid x \in W \wedge 4 \leq x \leq 17\}$  تو قیمتیں معلوم کریں۔
- (i)  $(X \cup Y)'$  (ii)  $X' \cap Y'$  (iii)  $(X \cap Y)'$  (iv)  $X' \cup Y'$
- 5- اگر  $X = \{2, 4, 6, \dots, 20\}$  اور  $Y = \{4, 8, 12, \dots, 24\}$  ہو تو مندرجہ ذیل معلوم کریں۔
- (i)  $X - Y$  (ii)  $Y - X$
- 6- اگر  $A = N$  اور  $B = W$  ہو تو قیمت معلوم کریں۔
- (i)  $A - B$  (ii)  $B - A$

### 5.1.2 (iv) یونین اور تقاطع کی خصوصیات (Properties of Union and Intersection)

#### (a) یونین کی خاصیت مبادلہ (Commutative property of union)

دو سیٹوں  $A$  اور  $B$  کے لیے ثابت کریں کہ  $A \cup B = B \cup A$

#### ثبوت (Proof)

- فرض کریں کہ  $x \in A \cup B$
- $\Rightarrow x \in A$  یا  $x \in B$  (سیٹوں کے یونین کی تعریف کے مطابق)
- $\Rightarrow x \in B$  یا  $x \in A$
- $\Rightarrow x \in B \cup A$
- $\Rightarrow A \cup B \subseteq B \cup A$  (i)
- اب فرض کریں کہ  $y \in B \cup A$
- $\Rightarrow y \in B$  یا  $y \in A$  (سیٹوں کے یونین کی تعریف کے مطابق)

$$\Rightarrow y \in A \text{ یا } y \in B$$

$$\Rightarrow y \in A \cup B$$

$$\Rightarrow B \cup A \subseteq A \cup B$$

(ii)

مساوات (i) اور (ii) کی رو سے

$$A \cup B = B \cup A$$

(مساوی سیٹوں کی تعریف کے مطابق)

### (b) تقاطع کی خاصیت مبادلہ (Commutative property of intersection)

دو سیٹوں A اور B کے لیے ثابت کریں کہ  $A \cap B = B \cap A$

**ثبوت (Proof)**

فرض کریں کہ

$$x \in A \cap B$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ اور } x \in B \quad (\text{سیٹوں کے تقاطع کی تعریف کے مطابق})$$

$$\Rightarrow x \in B \text{ اور } x \in A$$

$$\Rightarrow x \in B \cap A$$

$$A \cap B \subseteq B \cap A$$

(i) اس لیے

$$y \in B \cap A$$

اب فرض کریں کہ

$$\Rightarrow y \in B \text{ اور } y \in A \quad (\text{سیٹوں کے تقاطع کی تعریف کے مطابق})$$

$$\Rightarrow y \in A \text{ اور } y \in B$$

$$\Rightarrow y \in A \cap B$$

$$B \cap A \subseteq A \cap B$$

(ii) اس لیے

مساوات (i) اور (ii) کی رو سے

$$A \cap B = B \cap A$$

(مساوی سیٹوں کی تعریف کے مطابق)

### (c) یونین کی خاصیت تلازم (Associative property of union)

کوئی سے تین سیٹوں A، B اور C کے لیے ثابت کریں کہ  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

**ثبوت (Proof)**

فرض کریں کہ

$$x \in (A \cup B) \cup C$$

$$\Rightarrow x \in (A \cup B) \text{ یا } x \in C$$

$$\Rightarrow (x \in A \text{ یا } x \in B) \text{ یا } x \in C$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ یا } x \in B \cup C$$

$$\Rightarrow x \in A \cup (B \cup C)$$



$$\Rightarrow (A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C) \quad (i)$$

$$A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C \quad (ii) \quad \text{اسی طرح}$$

مساوات (i) اور (ii) کی رو سے

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

(d) **تقاطع کی حسانیت تلازم (Associative property of intersection)**

کوئی سے تین سیٹوں A، B اور C کے لیے ثابت کریں کہ  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

**ثبوت (Proof)**

فرض کریں کہ

$$x \in (A \cap B) \cap C$$

$$\Rightarrow x \in (A \cap B) \text{ اور } x \in C$$

$$\Rightarrow (x \in A \text{ اور } x \in B) \text{ اور } x \in C$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ اور } (x \in B \text{ اور } x \in C)$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ اور } x \in B \cap C$$

$$\Rightarrow x \in A \cap (B \cap C)$$

$$(A \cap B) \cap C \subseteq A \cap (B \cap C) \quad (i) \quad \text{اس لیے}$$

$$A \cap (B \cap C) \subseteq (A \cap B) \cap C \quad (ii) \quad \text{اسی طرح}$$

مساوات (i) اور (ii) کی رو سے

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

(e) **یونین کی تقاطع پر حسانیت تقسیمی (Distributive property of  $\cup$  over  $\cap$ )**

کوئی سے تین سیٹوں A، B اور C کے لیے ثابت کریں کہ  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

**ثبوت (Proof)**

فرض کریں کہ

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ یا } x \in B \cap C$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ یا } (x \in B \text{ اور } x \in C)$$

$$\Rightarrow (x \in A \text{ یا } x \in B) \text{ اور } (x \in A \text{ یا } x \in C)$$

$$\Rightarrow x \in A \cup B \text{ اور } x \in A \cup C$$

$$\Rightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\Rightarrow A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad (i)$$

اسی طرح فرض کریں کہ  $y \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow y \in (A \cup B) \text{ اور } y \in (A \cup C) \\
&\Rightarrow (y \in A \text{ یا } y \in B) \text{ اور } (y \in A \text{ یا } y \in C) \\
&\Rightarrow y \in A \text{ یا } (y \in B \text{ اور } y \in C) \\
&\Rightarrow y \in A \text{ یا } y \in B \cap C \\
&\Rightarrow y \in A \cup (B \cap C) \\
&\Rightarrow (A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C) \quad (ii)
\end{aligned}$$

مساوات (i) اور (ii) کی رو سے

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

### (f) تقاطع کی یونین پر حاکمیت تقسیمی (Distributive property of $\cap$ over $\cup$ )

کوئی سے تین سیٹوں  $A$ ،  $B$  اور  $C$  کے لیے ثابت کریں کہ  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

**ثبوت (Proof)**

فرض کریں کہ

$$\begin{aligned}
&x \in A \cap (B \cup C) \\
&\Rightarrow x \in A \text{ اور } x \in B \cup C \\
&\Rightarrow x \in A \text{ اور } (x \in B \text{ یا } x \in C) \\
&\Rightarrow (x \in A \text{ اور } x \in B) \text{ یا } (x \in A \text{ اور } x \in C) \\
&\Rightarrow (x \in A \cap B) \text{ یا } (x \in A \cap C) \\
&\Rightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \\
&\Rightarrow A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (i)
\end{aligned}$$

اسی طرح

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C) \quad (ii)$$

مساوات (i) اور (ii) کی رو سے

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

### (g) ڈی مارگن کے قوانین (De-Morgan's laws)

دو سیٹوں  $A$  اور  $B$  کے لیے ثابت کریں کہ

$$(a) (A \cup B)' = A' \cap B' \quad (b) (A \cap B)' = A' \cup B'$$

**ثبوت (Proof)**

$$\begin{aligned}
&x \in (A \cup B)' \quad (a) \text{ فرض کریں کہ} \\
&\Rightarrow x \notin A \cup B \quad (\text{سیٹ کے مکملینٹ کی تعریف کے مطابق}) \\
&\Rightarrow x \notin A \text{ اور } x \notin B \\
&\Rightarrow x \in A' \text{ اور } x \in B' \\
&\Rightarrow x \in A' \cap B' \quad (\text{سیٹ کے تقاطع کی تعریف کے مطابق})
\end{aligned}$$



$$\Rightarrow (A \cup B)' \subseteq A' \cap B' \quad (i)$$

$$A' \cap B' \subseteq (A \cup B)' \quad (ii) \text{ اسی طرح}$$

$$(A \cup B)' = A' \cap B' \quad \text{مساوات (i) اور (ii) کو استعمال کرتے ہوئے}$$

$$x \in (A \cap B)' \quad \text{فرض کریں کہ} \quad (b)$$

$$\Rightarrow x \notin A \cap B$$

$$\Rightarrow x \notin A \text{ یا } x \notin B$$

$$\Rightarrow x \in A' \text{ یا } x \in B'$$

$$\Rightarrow x \in A' \cup B'$$

$$\Rightarrow (A \cap B)' \subseteq A' \cup B' \quad (i)$$

$$y \in A' \cup B'$$

فرض کریں کہ

$$\Rightarrow y \in A' \text{ یا } y \in B'$$

$$\Rightarrow y \notin A \text{ یا } y \notin B$$

$$\Rightarrow y \notin A \cap B$$

$$\Rightarrow y \in (A \cap B)'$$

$$\Rightarrow A' \cup B' \subseteq (A \cap B)' \quad (ii)$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

مساوات (i) اور (ii) سے ثابت ہوا کہ

## مشق 5.2

$$X = \{1, 3, 5, 7, \dots, 19\} \text{ ، } Y = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots, 20\} \quad \text{اگر} \quad -1$$

$$Z = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\} \text{ اور } Z \text{ ہو تو مندرجہ ذیل معلوم کریں۔}$$

$$(i) \quad X \cup (Y \cap Z)$$

$$(ii) \quad (X \cup Y) \cup Z$$

$$(iii) \quad X \cap (Y \cap Z)$$

$$(iv) \quad (X \cap Y) \cap Z$$

$$(v) \quad X \cup (Y \cap Z)$$

$$(vi) \quad (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$$

$$(vii) \quad X \cap (Y \cup Z)$$

$$(viii) \quad (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ ، } B = \{2, 4, 6, 8\} \text{ اور } C = \{1, 4, 8\} \quad \text{اگر} \quad -2$$

ہو تو مندرجہ ذیل کو ثابت کریں۔

$$(i) \quad A \cap B = B \cap A$$

$$(ii) \quad A \cup B = B \cup A$$

$$(iii) \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$(iv) \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \text{ ، } A = \{1, 3, 5, 7, 9\} \text{ اور } B = \{2, 3, 5, 7\} \quad \text{اگر} \quad -3$$

ڈی مارگن قوانین کی تصدیق کریں۔

$$(A \cap B)' = A' \cup B' \quad \text{اور} \quad (A \cup B)' = A' \cap B'$$

یعنی

4- اگر  $U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ ،  $X = \{1, 3, 7, 9, 15, 18, 20\}$  اور  $Y = \{1, 3, 5, \dots, 17\}$  تو ثابت کریں کہ

(i)  $X - Y = X \cap Y'$

(ii)  $Y - X = Y \cap X'$

(v) 5.1.2 دیے ہوئے سیٹوں کی مدد سے بنیادی خصوصیات کو صحیح ثابت کرنا:

(Verify the fundamental properties for given sets)

(a)  $A$  اور  $B$ ،  $U$  کے کوئی سے دو تختی سیٹ ہوں تو  $A \cup B = B \cup A$  (مبادلہ کافتانون)

مثال کے طور پر  $A = \{1, 3, 5, 7\}$  اور  $B = \{2, 3, 5, 7\}$

پہلے

$$A \cup B = \{1, 3, 5, 7\} \cup \{2, 3, 5, 7\} = \{1, 2, 3, 5, 7\}$$

تو

$$B \cup A = \{2, 3, 5, 7\} \cup \{1, 3, 5, 7\} = \{1, 2, 3, 5, 7\}$$

اور

$$A \cup B = B \cup A$$

پس ثابت ہوا کہ

(b) تقاطع کی خاصیت مبادلہ: (Commutative property of intersection)

$$A = \{1, 3, 5, 7\} \text{ اور } B = \{2, 3, 5, 7\}$$

مثال کے طور پر

$$A \cap B = \{1, 3, 5, 7\} \cap \{2, 3, 5, 7\} = \{3, 5, 7\}$$

تو

$$B \cap A = \{2, 3, 5, 7\} \cap \{1, 3, 5, 7\} = \{3, 5, 7\}$$

اور

$$A \cap B = B \cap A$$

پس ثابت ہوا کہ

(c) اگر  $A, B$  اور  $C$ ،  $U$  کے تختی سیٹ ہوں تو  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$  (تلازم کافتانون)

$$A = \{1, 2, 4, 8\}, B = \{2, 4, 6\} \text{ اور } C = \{3, 4, 5, 6\}$$

فرض کریں کہ

$$\text{L.H.S} = (A \cup B) \cup C$$

تو

$$= (\{1, 2, 4, 8\} \cup \{2, 4, 6\}) \cup \{3, 4, 5, 6\}$$

$$= \{1, 2, 4, 6, 8\} \cup \{3, 4, 5, 6\}$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$

$$\text{R.H.S} = A \cup (B \cup C)$$

اور

$$= \{1, 2, 4, 8\} \cup (\{2, 4, 6\} \cup \{3, 4, 5, 6\})$$

$$= \{1, 2, 4, 8\} \cup \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S.}$$

پس سیٹوں کا یونین خاصیت تلازم رکھتا ہے۔

(d) اگر  $A, B$  اور  $C$ ،  $U$  کے تختی سیٹ ہوں تو  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$  (تلازم کافتانون)

$$A = \{1, 2, 4, 8\}, B = \{2, 4, 6\} \text{ اور } C = \{3, 4, 5, 6\}$$

فرض کریں کہ



$$L.H.S = (A \cap B) \cap C$$

$$= (\{1, 2, 4, 8\} \cap \{2, 4, 6\}) \cap \{3, 4, 5, 6\}$$

$$= \{2, 4\} \cap \{3, 4, 5, 6\} = \{4\}$$

$$R.H.S = A \cap (B \cap C)$$

$$= \{1, 2, 4, 8\} \cap (\{2, 4, 6\} \cap \{3, 4, 5, 6\})$$

$$= \{1, 2, 4, 8\} \cap \{4, 6\} = \{4\}$$

$$L.H.S = R.H.S$$

پس سیٹوں کا تقاطع خاصیت تلازم رکھتا ہے۔

**تقسیمی قوانین (Distributive laws)**

(e) یونین کی سیٹوں کے تقاطع پر خاصیت تقسیمی:

اگر  $B$  اور  $C$  یونیورسل سیٹ  $U$  کے تحتی سیٹ ہوں تو  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

فرض کریں کہ  $C = \{3, 4, 5, 6\}$  اور  $B = \{2, 4, 6\}$ ,  $A = \{1, 2, 4, 8\}$

$$L.H.S = A \cup (B \cap C)$$

$$= \{1, 2, 4, 8\} \cup (\{2, 4, 6\} \cap \{3, 4, 5, 6\})$$

$$= \{1, 2, 4, 8\} \cup \{4, 6\} = \{1, 2, 4, 6, 8\}$$

$$R.H.S = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$= (\{1, 2, 4, 8\} \cup \{2, 4, 6\}) \cap (\{1, 2, 4, 8\} \cup \{3, 4, 5, 6\})$$

$$= \{1, 2, 4, 6, 8\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$

$$= \{1, 2, 4, 6, 8\}$$

$$L.H.S = R.H.S$$

(f) تقاطع کی سیٹوں کے یونین پر خاصیت تقسیمی:

( $\cap$  is distributive over  $\cup$  of sets)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 20\}$$

$$B = \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}$$

$$C = \{3, 9, 15, 21, 27, 33\}$$

$$L.H.S = A \cap (B \cup C)$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 20\} \cap (\{5, 10, 15, 20, 25, 30\} \cup \{3, 9, 15, 21, 27, 33\})$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 20\} \cap \{3, 5, 9, 10, 15, 20, 21, 25, 27, 30, 33\}$$

$$= \{3, 5, 9, 10, 15, 20\}$$

$$\text{R.H.S} = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$= (\{1, 2, 3, 4, \dots, 20\} \cap \{5, 10, 15, 20, 25, 30\}) \\ \cup (\{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 20\} \cap \{3, 9, 15, 21, 27, 33\}) \\ = \{5, 10, 15, 20\} \cup \{3, 9, 15\} = \{3, 5, 9, 10, 15, 20\}$$

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S.}$$

(g) ڈی مارگن کے قوانین (De Morgan's laws)

$$(A \cap B)' = A' \cup B' \text{ اور } (A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$$

فرض کریں کہ

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\} \Rightarrow A' = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow B' = \{7, 8, 9, 10\}$$

$$A \cap B = \{2, 4, 6, 8, 10\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ = \{2, 4, 6\}$$

اب

$$\text{L.H.S} = (A \cap B)' = U - (A \cap B)$$

تو

$$= \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\} - \{2, 4, 6\}$$

$$= \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}$$

$$\text{R.H.S} = A' \cup B'$$

اور

$$= \{1, 3, 5, 7, 9\} \cup \{7, 8, 9, 10\}$$

$$= \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}$$

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$$

فرض کیا کہ

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\} \Rightarrow A' = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow B' = \{7, 8, 9, 10\}$$

$$A \cup B = \{2, 4, 6, 8, 10\} \cup \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$$

اب

$$\text{L.H.S} = (A \cup B)' = U - (A \cup B)$$

$$= \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\} - \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$$

$$= \{7, 9\}$$

$$\text{R.H.S} = A' \cap B' = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \{7, 8, 9, 10\}$$

اور

$$= \{7, 9\}$$

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$




### 5.1.3 وین ڈایا گرام (Venn Diagram)

برطانوی ریاضی دان جان وین (1834-1923) نے یونیورسل سیٹ  $U$  کے لیے مستطیل کو پہلی دفعہ استعمال کیا اور اس کے تحت سیٹوں  $A$  اور  $B$  کو اس کے اندر بند شکلوں کے طور پر استعمال کیا۔


(i) 5.1.3 وین ڈایا گرام کو سیٹوں کے یونین اور تقاطع کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرنا  
(a) سیٹوں کے یونین اور تقاطع:

غیر متراکب سیٹوں کے لیے




شکل 1

متراکب سیٹوں کے لیے



شکل 2


$A \subseteq B$




شکل 3

$A \cup B$


$A \cap B$



شکل 4



شکل 5




شکل 6

(اشکال 1 سے 6 تک خطوں کو افقی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔)


(b) سیٹ کا مکملیمینٹ (Complement of set)

$U - A = A'$  کو افقی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔




(vii) 5.1.3 وین ڈایا گرام کو قانون مبادلہ کی تصدیق کے لیے استعمال کرنا:

(a) سیٹوں کے یونین اور تقاطع کے لیے قانون مبادلہ:





$A \cup B$  کو افقی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔



$B \cup A$  کو عمودی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔

دونوں صورتوں میں خطے برابر ہیں۔ پس  $A \cup B = B \cup A$



$A \cap B$  کو افقی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$B \cap A$  کو عمودی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔



دونوں صورتوں میں خطے برابر ہیں۔ پس  $A \cap B = B \cap A$

(b) ڈی مارگن کے قوانین (De Morgan's laws)

(i)  $(A \cup B)' = A' \cap B'$



(ii)  $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(i)  $(A \cup B)' = A' \cap B'$



شکل 2:  $B'$  کو عمودی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔

شکل 1:  $A'$  کو افقی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔



شکل 4:  $(A \cup B)'$  کو ترچھے قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔


شکل 3:  $A' \cap B'$  کو مربعوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

اشکال 3 اور 4 کے خطے برابر ہیں


پس  $(A \cup B)' = A' \cap B'$



(ii)  $(A \cap B)' = A' \cup B'$




شکل 6:  $U - (A \cap B) = (A \cap B)'$  کو افقی، عمودی قطعات خط اور مربعوں کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔



شکل 5:  $A' \cup B'$  کو افقی، عمودی قطعات خط اور مربعوں کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔  
اشکال 5 اور 6 کے خطے برابر ہیں۔


پس  $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(c) قانون تلازم (Associative law)



شکل 2


$A \cup (B \cap C)$  کو شکل 2 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 1


$(A \cup B) \cup C$  کو شکل 1 میں دکھایا گیا ہے۔  
اشکال 1 اور 2 کے خطے برابر ہیں۔

پس  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cap C)$



شکل 4

$A \cap (B \cap C)$  کو شکل 4 میں ڈبل کراسنگ قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔




شکل 3

$(A \cap B) \cap C$  کو شکل 3 میں ڈبل کراسنگ قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔


اشکال 3 اور 4 کے خطے برابر ہیں۔

پس  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$


(d) متانوں تقسیمی (Distributive law):




شکل 2:  $A \cup B$  کو شکل میں افقی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔



شکل 1:  $A \cup (B \cap C)$  کو شکل میں افقی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔




شکل 4:  $(A \cup B) \cap (A \cup C)$  کو شکل میں ڈبل کر اسنگ قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔




شکل 3:  $A \cup C$  کو شکل میں عمودی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔  
اشکال 1 اور 4 کے خطے برابر ہیں۔

پس  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$




شکل 6:  $A \cap (B \cup C)$  کو شکل میں عمودی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔



شکل 5:  $B \cup C$  کو شکل میں عمودی قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔





شکل 7:  $(A \cap B) \cup (A \cap C)$  کو شکل میں تریچھے قطعات خط سے ظاہر کیا گیا ہے۔

اشکال 6 اور 7 کے خطے برابر ہیں۔

پس  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

### مشق 5.3

1- اگر  $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$ ,  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  اور  $B = \{1, 4, 7, 10\}$  ہو تو مندرجہ ذیل سوالات کو صحیح ثابت کریں۔

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (i) $A - B = A \cap B'$          | (ii) $B - A = B \cap A'$        |
| (iii) $(A \cup B)' = A' \cap B'$ | (iv) $(A \cap B)' = A' \cup B'$ |
| (v) $(A - B)' = A' \cup B$       | (vi) $(B - A)' = B' \cup A$     |

2- اگر  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B = \{1, 4, 7, 10\}$

اور  $C = \{1, 5, 8, 10\}$  ہو تو مندرجہ ذیل سوالات کو صحیح ثابت کریں۔

- |  |
|--|
| (i) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$            |
| (ii) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$           |
| (iii) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ |
| (iv) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$  |

3- اگر  $U = N$  تو  $A = \emptyset$  اور  $B = P$  کو استعمال کرتے ہوئے ڈی مارگن قوانین کی تصدیق کریں۔

4- اگر  $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$ ,  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  اور  $B = \{2, 3, 4, 5, 8\}$

ہو تو مندرجہ ذیل سوالات کو دین ڈایا گرام سے ثابت کریں۔

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (i) $A - B = A \cap B'$          | (ii) $B - A = B \cap A'$        |
| (iii) $(A \cup B)' = A' \cap B'$ | (iv) $(A \cap B)' = A' \cup B'$ |
| (v) $(A - B)' = A' \cup B$       | (vi) $(B - A)' = B' \cup A$     |

## 5.1.4 (viii) مترتب جوڑے اور کارٹیزی حاصل ضرب

### (Ordered pairs and Cartesian product)

#### 5.1.4 (a) مترتب جوڑے (Ordered pairs)

کوئی سے دو اعداد  $x$  اور  $y$  کو  $(x, y)$  کی شکل میں لکھنے کو **مترتب جوڑا** کہا جاتا ہے۔ مترتب جوڑے  $(x, y)$  میں اعداد کی ترتیب بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جس میں  $x$  پہلا رکن اور  $y$  دوسرا رکن ہے۔ مثال کے طور پر  $(3, 2)$  مختلف ہے  $(2, 3)$  سے صاف ظاہر ہے کہ  $(x, y) \neq (y, x)$  جب تک کہ  $x \neq y$

یاد رہے کہ

$$(x, y) = (s, t) \text{ اگر } x = s \text{ اور } y = t$$

#### 5.1.4 (b) کارٹیزی حاصل ضرب (Cartesian product)

دو غیر خالی سیٹوں  $A$  اور  $B$  کے کارٹیزی حاصل ضرب  $A \times B$  میں تمام مترتب جوڑے  $(x, y)$  شامل ہوتے ہیں جبکہ  $x \in A$  اور  $y \in B$  ہو۔

**مثال:** اگر  $A = \{1, 2, 3\}$  اور  $B = \{2, 5\}$  تو  $A \times B$  اور  $B \times A$  معلوم کریں۔

$$A \times B = \{(1, 2), (1, 5), (2, 2), (2, 5), (3, 2), (3, 5)\}$$

سیٹ  $A$  کے 3 ارکان ہیں اور سیٹ  $B$  کے 2 ارکان ہیں۔

پس  $3 \times 2 = 6$  مترتب جوڑے  $A \times B$  رکھتا ہے۔

$$B \times A = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3)\}$$

$$A \times B \neq B \times A.$$

بلاشبہ

## 5.4 مشق

1- اگر  $A = \{a, b\}$  اور  $B = \{c, d\}$  تو  $A \times B$  اور  $B \times A$  معلوم کریں۔

2- اگر  $A = \{0, 2, 4\}$ ،  $B = \{-1, 3\}$ ، تو  $A \times B$ ،  $B \times A$ ،  $A \times A$ ،  $B \times B$  معلوم کریں۔

3-  $a$  اور  $b$  معلوم کریں اگر

$$(i) (a - 4, b - 2) = (2, 1) \quad (ii) (2a + 5, 3) = (7, b - 4)$$

$$(iii) (3 - 2a, b - 1) = (a - 7, 2b + 5)$$

4-  $X$  اور  $Y$  معلوم کریں اگر  $X \times Y = \{(a, a), (b, a), (c, a), (d, a)\}$

5- اگر  $X = \{a, b, c\}$  اور  $Y = \{d, e\}$  تو مندرجہ ذیل ضربی سیٹوں کے ارکان کی تعداد معلوم کریں۔

$$(i) X \times Y \quad (ii) Y \times X \quad (iii) X \times X$$



## 5.2 شنائی ربط (Binary Relation)

اگر  $A$  اور  $B$  کوئی سے دو غیر خالی سیٹ ہوں اور  $R \subseteq A \times B$  تو سب سیٹ  $R$  میں  $A$  اور  $B$  میں **شنائی ربط** کہلاتا ہے۔ کیونکہ  $R$  میں ہر مترتب جوڑے کے پہلے اور دوسرے رکن کے درمیان کچھ تعلق ہوتا ہے۔

ربط کے ڈومین سیٹ میں ہر مترتب جوڑے کا پہلا رکن شامل ہوتا ہے۔ اور اسکو **Dom R** سے ظاہر کرتے ہیں۔  
ربط کے رینج سیٹ میں ہر مترتب جوڑے کا دوسرا رکن شامل ہوتا ہے۔ اسے **Range R** سے ظاہر کرتے ہیں۔

**مثال 1:** اگر  $B = \{2, 4, 6, 8\}$ ،  $A = \{2, 3, 4, 5\}$  اور

$$R : A \rightarrow B = \{x R y \mid y = 2x \wedge x \in A, y \in B\}$$

$$R = \{(2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$$

**حل:**

$$\text{Dom } R = \{2, 3, 4\} \subseteq A \quad \text{اور} \quad \text{Range } R = \{4, 6, 8\} \subseteq B$$

**مثال 2:** فرض کیا  $B = \{1, 2, 3, 5\}$ ،  $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$\text{ربط بنانے سے } R : A \rightarrow B = \{x R y \mid x + y = 6 \wedge x \in A, y \in B\}$$

معلوم کریں۔

$$R = \{(1, 5), (3, 3), (4, 2)\}$$

**حل:**

$$\text{Dom } R = \{1, 3, 4\} \subseteq A \quad \text{اور} \quad \text{Range } R = \{2, 3, 5\} \subseteq B$$

## 5.3 تفاعل یا مپنگ (Function or mapping)

(i) فرض کریں کہ  $A$  اور  $B$  دو غیر خالی سیٹ ہوں تو ربط ' $f: A \rightarrow B$ ' تفاعل کہلاتا ہے۔

اگر (i)  $\text{Dom } f = A$  (ii) ہر  $x \in A$  میں ہو۔  $f$  کے صرف ایک ہی مترتب جوڑے کا پہلا رکن ہوتا ہے۔

**متبادل تعریف (Alternate Definition)**

فرض کریں کہ  $A$  اور  $B$  دو غیر خالی سیٹ ہیں تو ربط ' $f: A \rightarrow B$ ' تفاعل کہلاتا ہے۔

اگر (i)  $\text{Dom } f = A$

(ii) ہم  $A$  کے ہر رکن  $x$  کے لیے  $B$  کے کسی رکن  $y$  سے یکتا تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ جیسے  $y = f(x) \in B$


**فلکشن کے ڈومین سیٹ، کوڈومین سیٹ اور رینج سیٹ**

**(Domain, Co-domain and Range Foundation):**

اگر  $f: A \rightarrow B$  ایک تفاعل ہو تو  $A$  تفاعل  $f$  کا ڈومین سیٹ اور  $B$  تفاعل  $f$  کا کوڈومین سیٹ کہلاتے ہیں۔

$f$  کا ڈومین سیٹ،  $f$  کے مترتب جوڑوں کے تمام پہلے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے اور  $f$  کا رینج سیٹ،  $f$  کے مترتب جوڑوں کے تمام دوسرے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔

**مثال:** فرض کریں کہ  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  اور  $A = \{0, 1, 2, 3\}$



تفاعل  $f: A \rightarrow B$  ہے جب کہ

$$f = \{(x, y) \mid y = x + 1 \wedge \forall x \in A, y \in B\}$$



$$f = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$$

$$\text{Dom } f = \{0, 1, 2, 3\} = A$$

$$\text{Range } f = \{1, 2, 3, 4\} \subseteq B.$$

مندرجہ ذیل روابط کی مثالیں ہیں نہ کہ تفاعلوں کی۔

g ایک فنکشن نہیں ہے کیونکہ  $a \in A$ ، سیٹ B میں دو ایجنز رکھتا ہے اور h فنکشن نہیں ہے کیونکہ  $d \in A$ ، سیٹ B میں کوئی ایجن نہیں رکھتا۔




(ii) 5.3 مندرجہ ذیل کا اظہار کرنا (Demonstrate the following)

(a) ان ٹو تفاعل (Into function)

$f: A \rightarrow B$  ان ٹو فنکشن کہلاتا ہے اگر  $B$  کا کم از کم ایک رکن، سیٹ A کے کسی بھی رکن کا عکس نہ ہو یعنی

$$\text{Range } f \subset B$$

مثال کے طور پر ہم  $f: A \rightarrow B$  کو بطور تفاعل بیان کرتے ہیں جو کہ



$$f = \{(0, 1), (1, 1), (2, 3), (3, 2)\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4\} \text{ اور } A = \{0, 1, 2, 3\} \text{ یہاں}$$

f ایک ان ٹو تفاعل (فنکشن) ہے۔


(b) ون-ون تفاعل (One-One function)

ایک فنکشن  $f: A \rightarrow B$  ون-ون فنکشن کہلاتا ہے۔ اگر A کے تمام ارکان کے واضح عکس (Image)

B میں ہوں۔



یعنی  $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \in A$  یا  $\forall x_1 \neq x_2 \in A \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$



مثال کے طور پر اگر  $A = \{0, 1, 2, 3\}$  اور

تب  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  کو بطور تفاعل  $f: A \rightarrow B$

بیان کرتے ہیں۔ جو کہ


$$f = \{(x, y) \mid y = x + 1, \forall x \in A, y \in B\} \\ = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$$

$f$ ، ون۔ ون تفاعل (فکشن) ہے۔

(c) ان ٹو اور ون۔ ون تفاعل (فکشن) (ان جیکٹیو فکشن) (Injective function)

تفاعل  $f$  جس کی (b) میں بحث کی گئی ہے۔ ان ٹو تفاعل بھی ہے۔ پس  $f$  ایک ان ٹو اور ون۔ ون تفاعل (فکشن) ہے۔

(d) آن ٹو یا سر جیکٹیو تفاعل (Surjective function)



ایک تفاعل  $f: A \rightarrow B$  آن ٹو فکشن کہلاتا ہے

اگر سیٹ B کا ہر رکن، سیٹ A کے کم از کم ایک رکن کا امیج

ہو۔ یعنی  $\text{Range } f = B$

مثال کے طور پر اگر  $A = \{0, 1, 2, 3\}$  اور

جبکہ  $B = \{1, 2, 3\}$  تو  $f: A \rightarrow B$

$$f = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$$

یہاں  $\text{Range } f = \{1, 2, 3\} = B$

پس  $f$  ایک آن ٹو تفاعل (فکشن) کو ظاہر کرتا ہے۔

(e) بائی جیکٹیو تفاعل یا ون ٹو ون مطابق تفاعل (Bijective function)

ایک تفاعل  $f: A \rightarrow B$  بائی جیکٹیو فکشن

کہلاتا ہے اگر تفاعل  $f$  ون۔ ون اور آن ٹو ہو۔

مثال کے طور پر اگر  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  اور

تو  $B = \{2, 3, 4, 5\}$  تفاعل  $f: A \rightarrow B$  کو اس طرح

بیان کرتے ہیں۔

$$f = \{(x, y) \mid y = x + 1, \forall x \in A, y \in B\}$$

$$f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$$

بلاشبہ یہ تفاعل ون۔ ون ہے کیونکہ A کے تمام واضح ارکان کے واضح عکس B میں ہیں۔ یہ آن ٹو تفاعل بھی ہے کیونکہ B کا ہر رکن کم از کم A کے ایک رکن کا عکس ہے۔

**نوٹ:**

(i) ہر فنکشن ایک ربط ہے لیکن اس کا معکوس درست نہیں۔

(ii) ہر فنکشن ون۔ ون نہیں ہوتا۔


(iii) ہر فنکشن آن۔ ٹو نہیں ہوتا۔

**مثال:** فرض کرو کہ  $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  ،  $A = \{1, 2, 3\}$

ہم تفاعل اس طرح بیان کرتے ہیں  $f: A \rightarrow B = \{(x, y) \mid y = 2x, \forall x \in A, y \in B\}$

$f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6)\}$

یہ تفاعل (فنکشن) ون۔ ون ہے لیکن آن ٹو نہیں ہے۔



**5.3 (iii) جانچنا آیا کہ دیا ہوا ربط ایک تفاعل ہے:**

**(Examine whether a given relation is a function):**

ایک ربط جس کی ڈومین کے ہر رکن  $x$  کا یکتا عکس اس کی رینج میں ہو تو ایسا ربط، تفاعل ہوتا ہے۔

**5.3 (iv) ون ٹو ون مطابقت اور ون ون تفاعل (فنکشن) کے درمیان موازنہ کرنا۔**

**(Differentiate between one-to-one correspondence and one-one function)**

ایک تفاعل  $f$  سیٹ  $A$  سے سیٹ  $B$  پر ون۔ ون ہوتا ہے اگر  $A$  کے تمام واضح ارکان کے واضح عکس  $B$  میں ہوں اور  $f$  کی ڈومین سیٹ  $A$  کے برابر ہو اور رینج  $B$  میں ہو۔ دو سیٹوں  $A$  اور  $B$  کے درمیان ون ٹو ون مطابقت میں ہر ایک سیٹ کا ہر رکن دوسرے سیٹ کے رکن سے منسلک ہوتا ہے۔ اگر سیٹ  $A$  اور  $B$  متناہی ہوں تو ان سیٹوں میں ارکان کی تعداد ایک جتنی ہوتی ہے۔ یعنی

$$n(A) = n(B)$$



## مشق 5.5


- 1- اگر  $M = \{3, 4\}$ ,  $L = \{a, b, c\}$  ہو تو  $L \times M$  اور  $M \times L$  کے دو ثنائی روابط معلوم کریں۔
- 2- اگر  $Y = \{-2, 1, 2\}$  ہو تو  $Y \times Y$  کے لیے دو ثنائی روابط بنائیں۔ ان کی ڈومین اور رینج بھی معلوم کریں۔
- 3- اگر  $L = \{a, b, c\}$  اور  $M = \{d, e, f, g\}$  ہو تو درج ذیل ہر ایک کے دو ثنائی روابط معلوم کریں۔
- (i)  $L \times L$  (ii)  $L \times M$  (iii)  $M \times M$
- 4- اگر  $M$  کے 5 ارکان ہوں تو  $M$  میں ثنائی روابط کی تعداد معلوم کریں۔
- 5- اگر  $M = \{y \mid y \in P \wedge y < 10\}$ ,  $L = \{x \mid x \in N \wedge x \leq 5\}$  تو مندرجہ ذیل کے لیے  $L$  سے  $M$  پر روابط بنائیں۔

- (i)  $R_1 = \{(x, y) \mid y < x\}$  (ii)  $R_2 = \{(x, y) \mid y = x\}$
- (iii)  $R_3 = \{(x, y) \mid x + y = 6\}$  (iv)  $R_4 = \{(x, y) \mid y - x = 2\}$

نیز ہر ربط کی ڈومین اور رینج لکھیں۔

- 6- مندرجہ ذیل میں سے روابط، ان ٹو تفاعل، ون۔ ون تفاعل، آن ٹو تفاعل اور بائی جیکٹیو تفاعل کی نشاندہی کریں۔ نیز ان کے ڈومین سیٹ اور رینج سیٹ معلوم کریں۔ (i) سے (vi) تک ہر جزو میں کو ڈومین سیٹ کو رینج سیٹ کے برابر لیا گیا ہے۔

- (i)  $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- (ii)  $R_2 = \{(1, 2), (2, 1), (3, 4), (3, 5)\}$
- (iii)  $R_3 = \{(b, a), (c, a), (d, a)\}$
- (iv)  $R_4 = \{(1, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 3), (5, 4)\}$
- (v)  $R_5 = \{(a, b), (b, a), (c, d), (d, e)\}$
- (vi)  $R_6 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 4)\}$



کثیر الانتخابی سوالات

مندرجہ ذیل سوالات کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست کے لیے (۷) لگائیں۔

(i) واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے۔

- (a) تختی سیٹ (b) پاور سیٹ  
(c) سیٹ (d) ان میں سے کوئی نہیں

(ii)  $Q = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0 \right\}$  سیٹ کہلاتا ہے۔

(a) مکمل اعداد (b) قدرتی اعداد

(c) غیر ناطق اعداد (d) ناطق اعداد

(iii) سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے۔

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 4

(iv) سیٹ جس میں کوئی رکن نہ ہو، کہلاتا ہے۔

(a) تختی سیٹ (b) خالی سیٹ

(c) یکتا سیٹ (d) سپر سیٹ

(v)  $\{x \mid x \in W \wedge x \leq 101\}$  کہلاتا ہے۔

(a) غیر متناہی سیٹ (b) تختی سیٹ

(c) خالی سیٹ (d) متناہی سیٹ

(vi) سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو، کہلاتا ہے۔

(a) خالی سیٹ (b) پاور سیٹ

(c) یکتا سیٹ (d) تختی سیٹ

(vii) خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے۔

(a)  $\phi$  (b)  $\{a\}$

(c)  $\{\phi, \{a\}\}$  (d)  $\{\phi\}$



(viii) {1, 2, 3} کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔

4 (a) 6 (b)

8 (c) 9 (d)

(ix) اگر  $A \subseteq B$  ہو تو  $A \cup B$  برابر ہوتا ہے۔

A (a) B (b)

$\phi$  (c) ان میں سے کوئی نہیں (d)

(x) اگر  $A \subseteq B$  ہو تو  $A \cap B$  برابر ہوتا ہے۔

A (a) B (b)

$\phi$  (c) ان میں سے کوئی نہیں (d)

(xi) اگر  $A \subseteq B$  ہو تو  $A - B$  برابر ہوتا ہے۔

A (a) B (b)

$\phi$  (c)  $B - A$  (d)

(xii)  $(A \cup B) \cup C$  برابر ہوتا ہے۔

$A \cap (B \cup C)$  (a)  $(A \cup B) \cap C$  (b)

$A \cup (B \cup C)$  (c)  $A \cap (B \cap C)$  (d)

(xiii)  $A \cup (B \cap C)$  برابر ہوتا ہے۔

$(A \cup B) \cap (A \cup C)$  (a)  $A \cap (B \cap C)$  (b)

$(A \cap B) \cup (A \cap C)$  (c)  $A \cup (B \cup C)$  (d)

(xiv) اگر A اور B غیر مشترک سیٹ ہوں تو  $A \cup B$  برابر ہوتا ہے۔

A (a) B (b)

$\phi$  (c)  $B \cup A$  (d)

(xv) اگر سیٹ A میں ارکان کی تعداد 3 اور سیٹ B میں 4 ہو تو  $A \times B$  میں ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔

3 (a) 4 (b)

12 (c) 7 (d)

(xvi) اگر سیٹ  $A$  میں ارکان کی تعداد 3 اور  $B$  میں 2 ہو تو  $A \times B$  کے ثنائی روابط کی تعداد ہوتی ہے۔

(a)  $2^3$  (b)  $2^6$

(c)  $2^8$  (d)  $2^2$

(xvii) اگر  $R = \{(0, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4)\}$  ہو تو  $\text{Dom } R$  ہوتی ہے۔

(a)  $\{0, 3, 4\}$  (b)  $\{0, 2, 3\}$

(c)  $\{0, 2, 4\}$  (d)  $\{2, 3, 4\}$

(xviii) اگر  $R = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 4)\}$  ہو تو  $\text{Range } R$  ہوتی ہے۔

(a)  $\{1, 2, 4\}$  (b)  $\{3, 2, 4\}$

(c)  $\{1, 2, 3, 4\}$  (d)  $\{1, 3, 4\}$

(xix) نقطہ  $(-1, 4)$  ربع میں ہوتا ہے۔

(a) I (b) II

(c) III (d) IV

(xx) ربط  $\{(1, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4)\}$  مندرجہ ذیل میں کونسا ہے؟

(a) آن ٹو (فکشن) تفاعل (b) ان ٹو (فکشن) تفاعل

(c) (فکشن) تفاعل نہیں ہے (d) ون۔ ون (فکشن) تفاعل

**2- درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔**

(i) تختی سیٹ کی تعریف بیان کریں اور ایک مثال بھی دیں۔

(ii) سیٹ  $\{a, b\}$  کے تمام تختی سیٹ لکھیں۔

(iii)  $A \cap B$  کو وین ڈیاگرام سے ظاہر کریں اگر  $A \subseteq B$  ہو۔

(iv)  $A \cap (B \cup C)$  کو وین ڈیاگرام سے ظاہر کریں۔

(v) دو سیٹوں کے تقاطع کی تعریف کریں۔

(vi) تفاعل کی تعریف کریں۔

(vii) ون۔ ون تفاعل کی تعریف کریں۔

(viii) آن۔ ٹو تفاعل کی تعریف کریں۔

(ix) بائی جیکٹو تفاعل کی تعریف کریں۔

(x) ڈی مارگن کے قوانین لکھیں۔



### 3- حتمی جگہ پر کریں۔

(i) اگر  $A \subseteq B$  تو  $A \cup B =$  \_\_\_\_\_

(ii) اگر  $A \cap B = \emptyset$  تو  $A$  اور  $B$  \_\_\_\_\_ ہیں۔

(iii) اگر  $A \subseteq B$  اور  $B \subseteq A$  تو \_\_\_\_\_

(iv)  $A \cap (B \cup C) =$  \_\_\_\_\_

(v)  $A \cup (B \cap C) =$  \_\_\_\_\_

(vi)  $U$  کا کمپلیمنٹ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(vii)  $\phi$  کا کمپلیمنٹ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(viii)  $A \cap A^c =$  \_\_\_\_\_

(ix)  $A \cup A^c =$  \_\_\_\_\_

(x) \_\_\_\_\_  $= \{x \mid x \in A \text{ اور } x \notin B\}$

(xi) نقطہ  $(-5, -7)$  \_\_\_\_\_ ربع میں ہے۔

(xii) نقطہ  $(4, -6)$  \_\_\_\_\_ ربع میں ہے۔

(xiii)  $x$ -axis پر ہر نقطہ کا  $y$  کو آرڈینیٹ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(xiv)  $y$ -axis پر ہر نقطہ کا  $x$  کو آرڈینیٹ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(xv) وین ڈایا گرام پہلی دفعہ \_\_\_\_\_ نے استعمال کی۔

(xvi)  $\{(a, b), (b, c), (c, d)\}$  کی ڈومین ہوتی ہے۔

(xvii)  $\{(a, a), (b, b), (c, c)\}$  کی رینج ہوتی ہے۔

(xviii)  $A \times A$  کا سب سیٹ  $A$  میں \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔

(xix) اگر  $f: A \rightarrow B$  ہو تو  $f$  ایک \_\_\_\_\_ تفاعل ہے۔

(xx) ربط  $\{(a, b), (b, c), (a, d)\}$  ایک تفاعل \_\_\_\_\_ ہے۔

## خلاصہ

◀ واضح اشیاء کے مجموعہ کو سیٹ کہتے ہیں۔

◀ دو سیٹوں  $A$  اور  $B$  کا یونین ایسے ارکان پر مشتمل سیٹ ہوتا ہے جو  $A$  میں یا  $B$  میں یا دونوں میں ہوں۔ اس کو  $A \cup B$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

◀ دو سیٹوں  $A$  اور  $B$  کا تقاطع دونوں سیٹوں کے مشترک ارکان پر مشتمل سیٹ ہوتا ہے۔ اس کو  $A \cap B$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ علامتی طور پر اسے  $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ اور } x \in B\}$  لکھتے ہیں۔

سیٹ  $B$  اور  $A$  کے فرق کو  $A - B$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس سیٹ میں  $B$  کے وہ ارکان ہوتے ہیں جو  $A$  میں نہیں ہوتے۔

$U$  کے لحاظ سے سیٹ  $A$  کے **کمپلیمنٹ سیٹ** میں  $U$  کے وہ تمام ارکان ہوتے ہیں جو  $A$  میں نہیں ہوتے۔ اس کو  $A^C = A' = U - A$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

برطانوی ریاضی دان جان وین (1834-1923) نے یونیورسل سیٹ  $U$  کے لیے مستطیل کو پہلی دفعہ استعمال کیا اور اس کے تحتی سیٹوں  $A$  اور  $B$  کو اس کے اندر بند اشکال کے طور پر استعمال کیا۔

ایک مترتب جوڑے کے ارکان کو ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ جس میں ارکان کی ترتیب کی پابندی کی جاتی ہے۔

دو غیر خالی سیٹوں  $A$  اور  $B$  کی کارٹیسی حاصل ضرب میں تمام مترتب جوڑے  $(x, y)$  ہوتے ہیں۔ جب کہ  $x \in A, y \in B$  تو اس سیٹ کو  $A \times B$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

اگر  $A$  اور  $B$  دو غیر خالی سیٹ ہوں اور  $R \subseteq A \times B$  تو تحتی سیٹ  $A \times B$  سے  $B$  میں **ثانی ربط** کہلاتا ہے۔

اگر دو غیر خالی سیٹ  $A$  اور  $B$  ہوں تو ربط  $f: A \rightarrow B$  **تفاعل** کہلاتا ہے اگر

$$\text{Dom } f = A \quad (\text{i})$$

(ii) ہر رکن  $x$  جو  $A$  میں ہو،  $f$  کے صرف ایک ہی مترتب جوڑے کا پہلا رکن ہوتا ہے۔

$f$  کا ڈومین سیٹ  $f$  کے مترتب جوڑوں کے پہلے تمام ارکان پر مشتمل ہوتا ہے اور  $f$  کا رینج سیٹ  $f$  کے مترتب جوڑوں کے تمام دوسرے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔

ایک تفاعل  $f: A \rightarrow B$  **ان ٹو تفاعل** کہلاتا ہے اگر  $B$  کا کم از کم ایک رکن سیٹ  $A$  کے کسی رکن کا عکس (ایمچ) نہ ہو۔ یعنی  $\text{Range } f \subseteq B$

ایک تفاعل  $f: A \rightarrow B$  **آن ٹو تفاعل** کہلاتا ہے اگر سیٹ  $B$  کا ہر رکن سیٹ  $A$  کے کم از کم ایک رکن کا عکس ہو یعنی  $\text{Range } f = B$

ایک تفاعل  $f: A \rightarrow B$  **ون۔ ون تفاعل** کہلاتا ہے اگر سیٹ  $A$  کے تمام واضح ارکان کے واضح عکس سیٹ  $B$  میں ہوں۔

$f: A \rightarrow B$  **بائی جیکٹیو تفاعل** کہلاتا ہے۔ اگر تفاعل  $f$  ون۔ ون اور آن ٹو ہو۔



# بنیادی شماریات

## (BASIC STATISTICS)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

- تعددی تقسیم کی تشکیل
- کالمی نقشہ کی تشکیل یکساں اور غیر یکساں جماعتی وقفہ کے ساتھ
- تعددی کثیر الاضلاع کی تشکیل
- مجموعی تعددی تقسیم کی تشکیل
- مجموعی تعددی کثیر الاضلاع کی تشکیل
- حسابی اوسط (غیر گروہی اور گروہی مواد کیلئے) معلوم کرنا
- حسابی اوسط کی بنیادی تعریف اور ضربی حسابی اوسط سے انحراف کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے
- حسابی اوسط کی خصوصیات کی پہچان
- وزنی حسابی اوسط اور حرکتی (حسابی) اوسط معلوم کرنا
- وسطانیہ، اور عادی کو بذریعہ گراف معلوم کرنا
- سعت، تغیریت اور معیاری انحراف معلوم کرنا

## 6.1 تعددی تقسیم (Frequency Distribution)

خام مواد کو منظم یک طرفہ جدول کی صورت میں پیش کرنے کو **تعددی تقسیم** کہتے ہیں۔ اس جدول میں تمام مدات / رقوم کو مختلف گروہوں یا جماعتوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر گروہ کے مقابل اس میں آنے والی مدات کی تعداد کو لکھا جاتا ہے۔

### 6.1(i) تعددی تقسیم کی تشکیل: (Construction of Frequency Distribution)

تعددی تقسیم کے مواد کی اقسام کی بنیاد پر دو قسمیں ہیں۔

- (a) غیر مسلسل تعددی تقسیم (b) مسلسل متغیر تعددی تقسیم

### (a) غیر مسلسل تعددی تقسیم: (Discrete Frequency Distribution)

غیر مسلسل تعددی تقسیم تشکیل دینے کا طریقہ کار درج ذیل ہے:

- (i) سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی مد معلوم کریں۔ نیز جدول کے متغیر والے چھوٹی سے بڑی تک تمام مدات کو ترتیب وار کالم میں لکھیں۔

- (ii) مدات کو شمار کر کے مطابقت (ٹیلی نشان) (Tally bar) کی مدد سے ان کی تعداد کو لکھیں۔

- (iii) مطابقت کالم کی مدد سے تعددات کا کالم بنائیں۔

**مثال 1:** پانچ سکوں کو بیس مرتبہ اچھالا گیا اور ہیڈز (Heads) کی تعداد کو نوٹ کیا گیا جو کہ درج ذیل ہے۔  
3, 4, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 3, 4, 2

ہیڈز (Heads) کی تعداد کی تعددی تقسیم بنائیں۔

**حل:** فرض کریں  $X =$  ہیڈز (Heads) کی تعداد

$1 =$  سب سے چھوٹی رقم اور  $5 =$  سب سے بڑی رقم

تعددی تقسیم درج ذیل ہے۔

| ہیڈز (Heads) کی تعداد کی تعددی تقسیم |           |      |
|--------------------------------------|-----------|------|
| X                                    | ٹیلی نشان | تعدد |
| 1                                    | III       | 3    |
| 2                                    | NN III    | 8    |
| 3                                    | NN        | 5    |
| 4                                    | III       | 3    |
| 5                                    | I         | 1    |



## (b) مسلسل تعددی تقسیم: (Continuous Frequency Distribution)

مسلسل تعددی تقسیم تشکیل دینے کا طریقہ کار درج ذیل ہے:

(i) سعت معلوم کریں جبکہ

سب سے چھوٹی مد - سب سے بڑی مد = سعت

(سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی مد کا فرق)

(ii) گروہوں کی تعداد کا فیصلہ کریں۔ عموماً یہ تعداد 5 اور 20 کے درمیان کوئی ساعدہ ہو سکتا ہے اور اس کو

'k' سے ظاہر کرتے ہیں۔ سعت کے زیادہ ہونے سے گروہ بھی زیادہ ہوں گے۔ عام طور پر اس کا انحصار سعت پر ہوتا ہے۔

(iii) گروہی یا جماعتی وقفہ کو بذریعہ کلیہ نکالیں۔ اس کو 'h' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

جماعتی وقفہ  $h$  ، جماعتوں کی تعداد  $k$

$$h = \frac{\text{سعت}}{k} \quad (\text{کلیہ استعمال کریں جب 'h' نہ دیا ہو})$$

**نوٹ:** تخمینہ کے کلیہ میں  $h$  کو معلوم کرنے کے لیے سہولت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر  $h = 7.1$

یا  $h = 7.9$  کو 8 لیا جاتا ہے۔

(iv) جدول میں جماعتی وقفہ کا کالم بنائیں۔ سب سے چھوٹی مد سے شروع کریں اور جماعتی وقفہ 'k' کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعتی حدود کی مدد سے تمام جماعتی وقفے لکھیں حتیٰ کہ آخری جماعتی وقفہ میں سب سے بڑی مد شامل ہو جائے۔

(v) مواد سے مدت کو بذریعہ مطابقت یعنی ٹیلی نشان (عمودی لائنوں) سے نوٹ کریں۔

(vi) ہر ایک گروہ کے سامنے ٹیلی نشان کو گنا جائے اور پھر اس تعداد کو تعدد کے کالم میں متعلقہ گروہ یا جماعت کے مقابل لکھا جائے۔

**مثال 2:** ایک جماعت دہم 'X' کے چالیس (40) طالب علموں نے ریاضی میں جو نمبرز لیے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

51, 55, 32, 41, 22, 30, 35, 53, 30, 60, 59, 15, 7, 18, 40, 49, 40, 25, 14, 18, 19,

2, 43, 22, 39, 26, 34, 19, 10, 17, 47, 38, 13, 30, 34, 54, 10, 21, 51, 52

10 کا جماعتی وقفہ لے کر ایک تعددی تقسیم تشکیل کریں۔

**حل:** فرض کریں کہ طالب علم کے نمبرز  $X$

اوپر دیے گئے مواد کے مطابق،

سب سے چھوٹی مد = 2 اور سب سے بڑی مد = 60

چونکہ ہمیں جماعتی وقفہ رقم میں دس (10) دیا گیا ہے لہذا ہم آسانی کے لئے زیریں (پچلی) جماعتی حد کو یا تو دو (2) سے شروع کریں گے یا اس کے قریب ترین صحیح عدد صفر (0) سے شروع کریں گے۔ تعددی تقسیم مندرجہ ذیل دو طریقوں سے بنائی جاسکتی ہے۔

**پہلا طریقہ:** ہم اصل مد کو اس کی متعلقہ جماعت / گروہ میں مندرجہ ذیل طریقے سے لکھیں گے۔

| تعدادات | مدات                                   | جماعت / گروہ |
|---------|--|--------------|
| 2       | 2, 7                                   | 0 — 9        |
| 10      | 10, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 19, 19 | 10 — 19      |
| 5       | 21, 22, 22, 25, 26                     | 20 — 29      |
| 9       | 30, 30, 30, 32, 34, 34, 35, 38, 39     | 30 — 39      |
| 6       | 40, 40, 41, 43, 47, 49                 | 40 — 49      |
| 7       | 51, 51, 52, 53, 54, 55, 59             | 50 — 59      |
| 1       | 60                                     | 60 — 69      |

**دوسرا طریقہ:** ہر مد کو اس کے متعلقہ گروہ میں ٹیلی نشان (عمودی لائنوں) کو استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل طریقے سے لکھیں گے۔

| تعدادات | ٹیلی نشان | گروہ / جماعت |
|---------|-----------|--------------|
| 2       | II        | 0 — 9        |
| 10      |           | 10 — 19      |
| 5       |           | 20 — 29      |
| 9       |           | 30 — 39      |
| 6       |           | 40 — 49      |
| 7       |           | 50 — 59      |
| 1       | I         | 60 — 69      |
| 40      |           | کل تعداد     |

**نوٹ:** دوسرا طریقہ عموماً تعددی تقسیم کی تشکیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



## مسل تعددی جدول میں استعمال ہونے والے تصورات

مسل تعددی جدول میں زیادہ تر مندرجہ ذیل اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔

### (a) جماعتی حدود: (Class Limit)

ہر جماعت یا گروہ میں دو قیمتیں ہوتی ہیں ایک چھوٹی اور دوسری بڑی۔ اس گروہ/جماعت کی چھوٹی قیمت کو زیریں/نچلی جماعتی حد اور بڑی قیمت کو بالائی جماعتی حد کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال 2 میں 0, 10, 20, 30 وغیرہ زیریں جماعتی حدود اور 9, 19, 29, 39 وغیرہ بالائی جماعتی حدود ہیں۔

### (b) حقیقی جماعتی حدود: (Class Boundaries)

مسل تعددی تقسیم

جیسا کہ مثال نمبر 2 سے چند حقیقی جماعتی حدیں نیچے دی گئی ہیں۔

| جماعتی حدود | حقیقی جماعتی حدود |
|-------------|-------------------|
| 0 — 9       | -0.5 — 9.5        |
| 10 — 19     | 9.5 — 19.5        |
| 20 — 29     | 19.5 — 29.5       |
| 30 — 39     | 29.5 — 39.5       |

لہذا مثال نمبر 2 میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس کی حقیقی زیریں جماعتی حد 9.5 ہے کیونکہ تمام قیمتیں جو 9.5 سے 10.49 کے درمیان ہیں انہیں 10 ہی سمجھا گیا ہے۔ جبکہ 19 کی بالائی جماعتی حد 19.5 ہے کیونکہ تمام وہ قیمتیں جو 18.5 سے 19.5 کے درمیان ہیں انہیں 19 ہی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کسی جماعت/گروہ میں حقیقی زیریں جماعتی حد اور حقیقی بالائی جماعتی حد کو حقیقی جماعتی حدود کہا جاتا ہے۔ عام طور پر حقیقی جماعتی حدود بنانے کے لئے ہم دوسری جماعت کی زیریں حد اور پہلی جماعت کی بالائی حد کے فرق کو معلوم کر کے اسے '2' پر تقسیم کرتے ہیں اس قیمت کو زیریں جماعتی حد میں سے تفریق کرنے سے حقیقی زیریں جماعتی حد بنتی ہے اور اگر اسی قیمت کو بالائی جماعتی حد میں جمع کر دیا جائے تو بالائی جماعتی حد، حقیقی بالائی جماعتی حد بن جاتی ہے۔ یہی حقیقی بالائی جماعتی حد اگلی کلاس کی حقیقی زیریں جماعتی حد بھی ہوتی ہے۔

### (c) جماعتی نشان اور میانی نقطہ: (Class mark/Mid point)

کسی جماعت کے درمیانی نقطہ کو جماعتی نشان کہا جاتا ہے یہ ہر کلاس کی زیریں اور بالائی جماعتی حد کو جمع کر کے 2 پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

### (d) مجموعی تعدد: (Cumulative Frequency)

مجموعی تعدد کا کالم تعددی کالم سے مرتب کیا جاتا ہے۔ کسی گروپ/کلاس کی بالائی حد سے کم تمام گروپس کے تعدد

(Frequency) کو مجموعی تعدد کہا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا اصطلاحات درج ذیل مثال نمبر 2 کی وضاحت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔

**مثال 3:** مثال نمبر 2 کے مواد کو استعمال کرتے ہوئے حقیقی جماعتی حدود، درمیانی نقطہ / جماعتی نشان اور مجموعی تعدد نکالیں۔

**حل:**

| مجموعی تعددات | تعددات | درمیانی نقطہ / جماعتی نشان | حقیقی جماعتی حدود | جماعتی حدود |
|---------------|--------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 2             | 2      | 4.5                        | -0.5 — 9.5        | 0 — 9       |
| 2 + 10 = 12   | 10     | 14.5                       | 9.5 — 19.5        | 10 — 19     |
| 12 + 5 = 17   | 5      | 24.5                       | 19.5 — 29.5       | 20 — 29     |
| 17 + 9 = 26   | 9      | 34.5                       | 29.5 — 39.5       | 30 — 39     |
| 26 + 6 = 32   | 6      | 44.5                       | 39.5 — 49.5       | 40 — 49     |
| 32 + 7 = 39   | 7      | 54.5                       | 49.5 — 59.5       | 50 — 59     |
| 39 + 1 = 40   | 1      | 64.5                       | 59.5 — 69.5       | 60 — 69     |
|               | 40     |                            |                   | کل تعداد    |

(ii) 6.1 کالمی نقشہ کی تشکیل: (Construction of Histogram)

کالمی نقشہ:

کالمی نقشہ متصلہ مستطیلوں کا گراف ہے جس کو XY-محور پر تشکیل دیا جاتا ہے۔ یہ تعددی تقسیم کا گراف ہے۔ عملی طور پر غیر مسلسل اور مسلسل تعددی تقسیم کو کالمی نقشہ کی مدد سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ بہر حال ان کی تشکیل کے طریقہ کار کو مثالوں کی مدد سے واضح کرتے ہیں۔


مسواوی وقفوں والا کالمی نقشہ:

**مثال 1:** 5 سکوں کو اچھالا گیا جس میں تعددی تقسیم ہیڈز کی تعداد کو ظاہر کر رہی ہے۔ مندرجہ ذیل تعددی تقسیم سے کالمی نقشہ بنائیں۔

| تعددات | (ہیڈز کتنی مرتبہ آیا) X |
|--------|-------------------------|
| 1      | 0                       |
| 3      | 1                       |
| 8      | 2                       |
| 5      | 3                       |
| 3      | 4                       |
| 1      | 5                       |



- حل:** کالمی نقشہ بنانے کے لئے ہم مندرجہ ذیل طریقہ کار اختیار کریں گے۔
- متغیر  $X$  کی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے  $X$  - محور پر مناسب وقفے لے کر نشان لگائیں۔
  - مناسب پیمائش کو استعمال کرتے ہوئے  $Y$  - محور پر تعددات کے نشان لگائیں۔
  - ہر وقفے پر متغیر  $X$  کی قیمتوں کی متعلقہ تعدد سے مطابقت کر کے مستطیل کی اونچائی بنائیں۔
- حاصل شدہ کالمی نقشہ درج ذیل ہے۔




**مثال 2:** مندرجہ ذیل مواد کی مدد سے کالمی نقشہ بنائیں۔

| تعددات | حقیقی جماعتی حدود |
|--------|-------------------|
| 2      | -0.5 — 9.5        |
| 10     | 9.5 — 19.5        |
| 5      | 19.5 — 29.5       |
| 6      | 29.5 — 39.5       |
| 7      | 39.5 — 49.5       |
| 1      | 49.5 — 59.5       |

- حل:** چونکہ یہ ایک مسلسل تعددی تقسیم ہے لہذا ہم کالمی نقشہ مندرجہ ذیل طریقہ کار سے بنائیں گے۔
- $X$  - محور پر مناسب پیمانہ لے کر حقیقی جماعتی حدود کا نشان لگائیں۔
  - $Y$  - محور پر مناسب پیمانے کو استعمال کرتے ہوئے تعددات کا نشان لگائیں۔
  - ہر جماعتی وقفے پر اس گروپ کے متعلقہ تعدد تک مستطیل کی اونچائی بنائیں۔

## کالمی نقشہ



نوٹ:

اوپر دیے گئے گراف میں -0.5 مثبت x-axis کی جانب صرف Histogram (کالمی گراف) کو بہتر سمجھنے کیلئے دیا گیا ہے۔

**غیر مساوی وقفوں والا کالمی نقشہ:**

اگر جماعتی وقفے مساوی نہ ہوں تو ہر جماعتی تعداد کو اس کے جماعتی وقفے کی جسامت پر تقسیم کر کے اونچائی (تعداد) کی تصحیح کی جاتی ہے۔ اگر وقفہ دو گنا ہو جائے تو تعداد کو 2 پر تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ گوشوارے (گراف) کا رقبہ اور دوسرے گوشواروں کے رقبوں کا صحیح تناسب ہو سکے۔ وغیرہ۔


**مثال 3:** مندرجہ ذیل مواد کالمی نقشہ بنائیں۔

| عمریں   | آدمیوں کی تعداد |
|---------|-----------------|
| 20 — 24 | 1               |
| 25 — 29 | 2               |
| 30 — 39 | 26              |
| 40 — 44 | 22              |
| 45 — 49 | 20              |
| 50 — 54 | 15              |
| 55 — 64 | 14              |

**حل:** جیسا کہ جماعتی وقفے غیر مساوی ہیں لہذا ہر مستطیل کی اونچائی کو تعداد کے مساوی نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے ہم ہر تعداد کو جماعتی وقفے کی جسامت پر تقسیم کر کے اونچائیوں میں صحیح تناسب حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل جدول میں ظاہر کیا گیا ہے۔



| عمریں   | حقیقی جماعتی حدود | جماعتی وقفہ (h) | تعدادات | اونچائیوں کا تناسب |
|---------|-------------------|-----------------|---------|--------------------|
| 20 — 24 | 19.5 — 24.5       | 5               | 1       | $1 \div 5 = 0.20$  |
| 25 — 29 | 24.5 — 29.5       | 5               | 2       | $2 \div 5 = 0.4$   |
| 30 — 39 | 29.5 — 39.5       | 10              | 26      | $26 \div 10 = 2.6$ |
| 40 — 44 | 39.5 — 44.5       | 5               | 22      | $22 \div 5 = 4.4$  |
| 45 — 49 | 44.5 — 49.5       | 5               | 20      | $20 \div 5 = 4.0$  |
| 50 — 54 | 49.5 — 54.5       | 5               | 15      | $15 \div 5 = 3.0$  |
| 55 — 64 | 54.5 — 64.5       | 10              | 14      | $14 \div 10 = 1.4$ |



### (iii) 6.1 تعدادی کثیر الاضلاع کی تشکیل: (Construction of Frequency Polygon)

ایک تعدادی کثیر الاضلاع کئی پہلوؤں (اطراف) سے بند دو البادی سطح (اقلیدس) ہے اس کی تشکیل کا طریقہ کار

حسب ذیل ہے۔

**مثال 1:** مندرجہ ذیل مواد سے تعدادی کثیر الاضلاع بنائیں۔

| جماعتی حدود | حقیقی جماعتی حدود | تعدادات |
|-------------|-------------------|---------|
| 10—19       | 9.5—19.5          | 10      |
| 20—29       | 19.5—29.5         | 5       |
| 30—39       | 29.5—39.5         | 9       |
| 40—49       | 39.5—49.5         | 6       |
| 50—59       | 49.5—59.5         | 7       |
| 60—69       | 59.5—69.5         | 1       |

**حل:**

**اقدامات:**

(i) دو ہم جسامتی وقفوں کے اضافی گروہ لیں۔ ایک پہلے گروہ سے پہلے اور دوسرا آخری گروہ کے بعد لیں۔ اور ان

دونوں گروہوں کے درمیانی نقاط معلوم کریں ان گروہوں کے سامنے تعددات صفر ہیں۔

| تعددات | حقیقی جماعتی حدود | جماعتی حدود |
|--------|-------------------|-------------|
| 0      | -0.5 — 9.5        | 0 — 9       |
| 10     | 9.5 — 19.5        | 10 — 19     |
| 5      | 19.5 — 29.5       | 20 — 29     |
| 9      | 29.5 — 39.5       | 30 — 39     |
| 6      | 39.5 — 49.5       | 40 — 49     |
| 7      | 49.5 — 59.5       | 50 — 59     |
| 1      | 59.5 — 69.5       | 60 — 69     |
| 0      | 69.5 — 79.5       | 70 — 79     |

(ii) دی ہوئی تعددی تقسیم کے لیے جماعتی نشان یعنی درمیانی نقاط معلوم کریں۔


| تعددات | جماعتی نشان / درمیانی نقاط |
|--------|----------------------------|
| 0      | 4.5                        |
| 10     | 14.5                       |
| 5      | 24.5                       |
| 9      | 34.5                       |
| 6      | 44.5                       |
| 7      | 54.5                       |
| 1      | 64.5                       |
| 0      | 74.5                       |

(iii) X- محور پر درمیانی نقاط کی نشاندہی کریں اور مناسب پیمانہ مانتے ہوئے Y- محور پر تعددات کو نوٹ کریں۔

(iv) ہر متعلقہ جماعتی نشان / درمیانی نقطہ کو تعددات کے مد مقابل کسی نقطے سے خاکہ بنائیں۔

(v) ان تمام نقاط کو چھوٹی چھوٹی لائنوں سے آپس میں ملا دیں۔





## 6.2 مجموعی تعددی تقسیم: (Cumulative Frequency Distribution)

### 6.2(ii) مجموعی تعددی جدول کی تشکیل

ایک جدول جو بالائی جماعتی حدود کے مد مقابل مجموعی تعددات کو ظاہر کرے، مجموعی تعددی تقسیم کہلاتی ہے۔ یہ کم تر مجموعی تعددی تقسیم بھی کہلاتی ہے۔  
مثال 1: مندرجہ ذیل مواد کے لیے مجموعی تعددی تقسیم بنائیں۔

| جماعت/گروہ | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| تعدادات    | 1       | 2       | 26      | 22      | 20      | 15      | 14      |

حل: مجموعی تعددی تقسیم کی تشکیل درج ذیل ہے۔

| مجموعی تعدادات | حقیقی جماعتی حدود | مجموعی تعدادات  | تعدادات (f) | حقیقی جماعتی حدود |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 0              | 10.5 — 19.5       | 0               | 0           | 10.5 — 19.5       |
| 1              | 19.5 — 24.5       | $0 + 1 = 1$     | 1           | 19.5 — 24.5       |
| 3              | 24.5 — 29.5       | $1 + 2 = 3$     | 2           | 24.5 — 29.5       |
| 29             | 29.5 — 34.5       | $3 + 26 = 29$   | 26          | 29.5 — 34.5       |
| 51             | 34.5 — 39.5       | $29 + 22 = 51$  | 22          | 34.5 — 39.5       |
| 71             | 39.5 — 44.5       | $51 + 20 = 71$  | 20          | 39.5 — 44.5       |
| 86             | 44.5 — 49.5       | $71 + 15 = 86$  | 15          | 44.5 — 49.5       |
| 100            | 49.5 — 54.5       | $86 + 14 = 100$ | 14          | 49.5 — 54.5       |



**6.2(ii) مجموعی تعددی کثیر الاضلاع/ترسیم کی خاکہ کشی**  
**(Cumulative Frequency Polygon/Ogive):**

مجموعی تعددی کثیر الاضلاع/ترسیم کی خاکہ کشی۔

اس میں مندرجہ ذیل اقدامات شامل ہیں۔

(i) حقیقی جماعتی حدود کی  $X$ ۔ محور پر اور مجموعی تعدد کی  $Y$ ۔ محور پر نشان دہی کریں۔

(ii) متعلقہ بالائی جماعتی حدود اور تعددات کو بذریعہ نشان درج کریں یا نوٹ کریں۔

(iii) ان تمام نقاط کو چھوٹی چھوٹی لائنوں سے ملائیے۔

(iv) آخری نقطہ سے ایک عمود  $X$ ۔ محور پر گرا کر اس تصویر کو بند کر دیں۔

**مثال 2:** دیے ہوئے مواد سے مجموعی تعددی کثیر الاضلاع بنائیے۔

| جماعتی حدود | تعددات |
|-------------|--------|
| 4 — 6       | 2      |
| 7 — 9       | 4      |
| 10 — 12     | 8      |
| 13 — 15     | 3      |

**حل:** سب سے پہلے ہم شروع میں ایک گروہ کا اضافہ کریں گے پھر ہم حقیقی جماعتی حدود بنائیں گے اور مجموعی تعددات کو بھی معلوم کریں گے۔


| جماعتی حدود | حقیقی جماعتی حدود | تعددات | مجموعی تعددات |
|-------------|-------------------|--------|---------------|
| 1 — 3       | 0.5 — 3.5         | 0      | 0             |
| 4 — 6       | 3.5 — 6.5         | 2      | $0 + 2 = 2$   |
| 7 — 9       | 6.5 — 9.5         | 4      | $2 + 4 = 6$   |
| 10 — 12     | 9.5 — 12.5        | 8      | $6 + 8 = 14$  |
| 13 — 15     | 12.5 — 15.5       | 3      | $14 + 3 = 17$ |

اب ہم مندرجہ بالا تعددی تقسیم کو کم تر مجموعی تعددی تقسیم کی صورت میں مندرجہ ذیل طریقہ کار سے لکھیں گے۔



| مجموعی تعددات | حقیقی جماعتی حدود |
|---------------|-------------------|
| 0             | 3.5 سے کم         |
| 2             | 6.5 سے کم         |
| 6             | 9.5 سے کم         |
| 14            | 12.5 سے کم        |
| 17            | 15.5 سے کم        |

مجموعی تعددی کثیر الاضلاع درج ذیل ہے۔



## مشق 6.1

- مندرجہ ذیل مواد مختلف خاندانوں میں افراد کی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس مواد کی مدد سے تعددی تقسیم تشکیل کریں اور مجموعی تعددات کو بھی معلوم کریں۔  
9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 12, 8, 9, 10, 6, 7, 7, 11, 4, 4, 8, 4, 3, 2, 7, 9, 10, 9, 7, 6, 9, 5, 7.
- مندرجہ ذیل مواد پنجم جماعت کے 40 طالب علموں کا وزن کر کے حاصل کیا گیا ہے۔ جماعتی وقفے کی جسامت '5' لے کر تعددی تقسیم تشکیل کریں۔ حقیقی جماعتی حدود اور درمیانی نقاط بھی معلوم کریں۔  
34, 26, 33, 32, 24, 21, 37, 40, 41, 28, 28, 31, 33, 34, 37, 23, 27, 31, 31, 36, 29, 35, 36, 37, 38, 22, 27, 28, 29, 31, 35, 35, 40, 21, 32, 33, 27, 29, 30, 23.

مجموعی تعددی تقسیم بھی بنائیں۔

اور

اشارہ: (جماعت اس طرح بنائیں ..... 20—24, 25—29, .....)

3- مندرجہ ذیل مواد ایک سکول کے تیس (30) اساتذہ کی تنخواہوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ 100 روپے کا جماعتی وقفہ (جسامت) لے کر تعددی تقسیم بنائیں۔

450, 500, 550, 580, 670, 1200, 1150, 1120, 950, 1130, 1230, 890, 780, 760, 670, 880, 890, 1050, 980, 970, 1020, 1130, 1220, 760, 690, 710, 750, 1120, 760, 1240.

4- اشارہ: (جماعت اس طرح بنائیں ..... 450—549, 550—649, .....)  
مندرجہ ذیل مواد کسی شہر کی (31) مقامی / مضافاتی جگہوں پر روازنہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ (تعطیل) کے دورانیے کے گھنٹوں کو ظاہر کرتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ دورانیہ پر 2 گھنٹوں کا جماعتی وقفہ لے کر تعددی تقسیم بنائیں۔

6, 12, 5, 7, 8, 3, 6, 7, 10, 2, 14, 11, 12, 8, 6, 8, 9, 7, 11, 6, 9, 12, 13, 10, 14, 7, 6, 10, 11, 14, 12.

اور مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔

(i) زیادہ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے بتائیں۔

(ii) کم سے کم لوڈ شیڈنگ کے وقفے بتائیں۔

5- اشارہ: (کلاس کا کالم اس طرح بنائیں ..... 2—3, 4—5, 6—7, .....)  
مندرجہ ذیل مواد جو کہ طالبعلموں کے اوزان (کلو گرام) ہیں اس مواد کے ذریعے کالمی نقشہ اور تعددی کثیر الاضلاع بنائیں۔

| تعدادات (طالبعلموں کی تعداد) | وزن / اوزان |
|------------------------------|-------------|
| 5                            | 20—24       |
| 8                            | 25—29       |
| 13                           | 30—34       |
| 22                           | 35—39       |
| 15                           | 40—44       |
| 10                           | 45—49       |
| 8                            | 50—54       |



### 6.3 مرکزی رجحان کے پیمانے (Measures of Central Tendency)

**تعارف:**

ہم پڑھ چکے ہیں کہ مواد کو ایک جامع شکل میں تعددی تقسیم اور گرافنی اظہار کے ساتھ پیش کیا گیا تو معلومات کو با آسانی سمجھ لیا گیا۔ مواد میں دی گئی معلومات کو ہم مزید مختصر طریقہ سے صرف ایک نمائندہ قدر کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ مواد کے ارد گرد تقریباً مرکزی قیمت ہوتی ہے۔ یہ نمائندہ قدر متغیر کی تقسیم کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ اس قیمت کو اوسط یا مرکزی قیمت کہتے ہیں۔ مرکزی قیمت نکالنے کے لیے استعمال ہونے والے پیمانوں کو مرکزی رجحان کے پیمانے کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مندرجہ ذیل مرکزی رجحان کے پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1- حسابی اوسط   | 2- وسطانیہ      |
| 3- عادیہ        | 4- اقلیدی اوسط  |
| 5- ہم آہنگ اوسط | 6- چہارمی مقدار |
- ان پیمانوں کو مختلف صورتوں میں مواد کی نوعیت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔

#### 6.3(i) (a) حسابی اوسط (Arithmetic Mean)

حسابی اوسط وہ قیمت ہے جو تمام مدات کے مجموعہ کو مدات کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پس حسابی اوسط کو  $\bar{X}$  سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسے یوں معلوم کیا جاتا ہے۔

$$n = (\bar{X}) = \frac{\sum X}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{\text{تمام مدات کا مجموعہ}}{\text{تمام مدات کی تعداد}}$$

#### حسابی اوسط نکالنے کا طریقہ:

مواد کی دو اقسام ہیں۔ گروہی مواد اور غیر گروہی مواد۔ مواد کی ان دو اقسام کے لیے حسابی اوسط معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن کی وضاحت مندرجہ ذیل اقسام سے کی جا رہی ہے۔

#### غیر گروہی مواد:

غیر گروہی مواد سے حسابی اوسط نکالنے کے تین طریقے ہیں۔ اور وہ تین طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔

#### (i) براہ راست طریقہ (تعریف کے مطابق):

براہ راست طریقہ میں ہم مندرجہ ذیل کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

$$\text{تمام مدات کا مجموعہ} = \bar{X} = \frac{\sum X}{n} = \text{تمام مدات کی تعداد}$$

**مثال 1:** سات طالبعلموں نے ریاضی میں جو نمبرز لیے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اس مواد کی مدد سے حسابی اوسط معلوم کریں اور جواب کی وضاحت / تشریح بھی کریں۔

| طالبعلموں کی تعداد | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| حاصل کردہ نمبرز    | 45 | 60 | 74 | 58 | 65 | 63 | 49 |

**حل:** فرض کیا  $X =$  طالبعلم کے نمبرز

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\text{تمام مدات کا مجموعہ}}{\text{تمام مدات کی تعداد}} = \frac{\sum X}{n} \\ \text{حسابی اوسط } (\bar{X}) &= \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_7}{7} \\ \text{حسابی اوسط} &= \frac{45 + 60 + 74 + 58 + 65 + 63 + 49}{7} = \\ &= \frac{414}{7} = 59.14 \text{ نمبرز}\end{aligned}$$

**وضاحت:** چونکہ مواد کی اکائی نمبرز ہیں اس لیے جواب بھی نمبرز میں ہی ہو گا۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سات طالبعلموں میں سے ہر ایک طالبعلم نے اوسطاً 59 نمبرز لیے ہیں۔

**(ii) بالواسطہ، مختصر یا کوڈنگ طریقہ:**

بالواسطہ طریقے کے تحت حسابی اوسط کو نکالنے کے دو اصول ہیں۔ یہ اصول اس وقت استعمال کئے جاتے ہیں جب مواد یا تو بہت بڑی قیمتوں پر مشتمل ہو یا مدات کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ ان اصولوں کے تحت حسابی اوسط کو نکالنا نہایت آسان ہے۔ یہ اصول نظریاتی ہیں اور عملاً استعمال نہیں کئے جاتے کیونکہ بہت بڑے مواد سے حسابی اوسط نکالنے کے لئے شمار یاتی سافٹ ویئر موجود ہیں۔ تاہم طالبعلموں کو ان اصولوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ وہ اصول مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) فرضی یا عارضی حسابی اوسط استعمال کرنا

(ii) فرضی یا عارضی حسابی اوسط استعمال کرنا اور متغیر کی پیمائش / سکیل کو تبدیل کرنا۔

متغیر کی پیمائش / سکیل کو تبدیل کر کے فرضی یا عارضی حسابی اوسط استعمال کرنا کسی متغیر کی قیمت اور مستقل مقدار

'A' کے فرق کو انحراف کہا جاتا ہے۔ مثلاً

$$X = (x_i - \bar{X}) = (X_i - \bar{X}) \quad , i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{مستقل مقدار } A \text{ سے انحراف} = (x_i - A) = (X_i - A) \quad , i = 1, 2, \dots, n$$



مندرجہ ذیل فارمولے بالواسطہ طریقے کے تحت استعمال ہوتے ہیں۔

$$(i) \quad \bar{X} = A + \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n}$$

$$(ii) \quad \bar{X} = A + \frac{\sum_{i=1}^n u_i}{n} \times h$$

یہاں پر

$D_i = (x_i - A)$ ، اور  $A$  کوئی فرضی قیمت ہے جو کہ فرضی یا عارضی اوسط کہلاتی ہے۔

اور  $u_i = \frac{(x_i - A)}{h}$  جبکہ  $h$  گروہی یا جماعتی وقفے کی جسامت

**مثال 2:** پانچ (5) اساتذہ کی تنخواہیں درج ذیل ہیں۔ براہ راست طریقہ اور بالواسطہ طریقے کو استعمال کرتے ہوئے حسابی اوسط معلوم کریں اور ان کے جوابات کا موازنہ بھی کریں۔  
11500, 12400, 15000, 14500, 14800.

**حل:** براہ راست طریقہ : (Direct Method)

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{5} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5} \\ &= \frac{11500 + 12400 + 15000 + 14500 + 14800}{5} \\ &= \frac{68200}{5} = 13640 \text{ روپے} \end{aligned}$$

بالواسطہ طریقہ : (Indirect Method)

فرض کیا

$$A = 13,000$$

$$D_i = (x_i - 13,000)$$

$$h = 100$$

$$u_i = \frac{x_i - A}{100}$$

درج ذیل جدول حسابی اوسط نکالنے کے لیے درکار ہے۔

| $X$                  | $D_i = (x_i - 13000)$ | $u_i = \frac{(x_i - A)}{100}$ |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 11500                | -1500                 | -15                           |
| 12400                | -600                  | -6                            |
| 15000                | 2000                  | 20                            |
| 14500                | 1500                  | 15                            |
| 14800                | 1800                  | 18                            |
| $\Sigma x_i = 68200$ | $\Sigma D_i = 3200$   | $\Sigma u_i = 32$             |

(i) مختصر طریقہ : (Short Method)

$$\bar{X} = 13000 + \frac{3200}{5} = 13000 + 640 = 13640 \text{ روپے}$$

(ii) کوڈنگ طریقہ : (Coding Method)

$$\bar{X} = A + \frac{\sum u_i}{n} \times h$$

$$\bar{X} = 13000 + \frac{32}{5} \times 100 = 13640 \text{ روپے}$$

گروہی مواد:

تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کو گروہی مواد کہا جاتا ہے۔ گروہی مواد کے لیے براہ راست اور بالواسطہ طریقوں کے فارمولے مندرجہ ذیل ہیں۔

(a) براہ راست طریقہ:

$$\bar{X} = \frac{\sum fx_i}{\sum f} = \frac{\sum fX}{\sum f}$$

(b) بالواسطہ طریقہ:

$$(i) \quad \bar{X} = A + \frac{\sum fD}{\sum f}$$

$$(ii) \quad \bar{X} = A + \frac{\sum fu}{\sum f} \times h$$

جبکہ 'X = x<sub>i</sub>' کسی کلاس یا گروہ کے درمیانی نقطے کو ظاہر کر رہا ہے اگر جماعتی وقفہ دیا ہوا ہو۔ اور 'h' جماعتی وقفے کی جسامت کو ظاہر کر رہا ہے۔

**مثال 3:** مندرجہ ذیل تعددی تقسیم کے لیے براہ راست طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے حسابی اوسط معلوم کریں۔

| تعدادات | X ('Heads' کی تعداد) |
|---------|----------------------|
| 3       | 1                    |
| 8       | 2                    |
| 5       | 3                    |
| 3       | 4                    |
| 1       | 5                    |



**حل :** ہم حسابی اوسط مندرجہ ذیل طریقہ سے معلوم کریں گے۔

| $X$      | $f$             | $fX$             |
|----------|-----------------|------------------|
| 1        | 3               | 3                |
| 2        | 8               | 16               |
| 3        | 5               | 15               |
| 4        | 3               | 12               |
| 5        | 1               | 5                |
| کل تعداد | $\Sigma f = 20$ | $\Sigma fX = 51$ |

$$\bar{X} = \frac{\Sigma fX}{\Sigma f} = \frac{51}{20} = 2.55 \text{ یا } 3 \text{ Heads}$$

(چونکہ Head غیر مسلسل متغیر ہے)

**مثال 4:** مندرجہ ذیل مواد ثانی کے ڈبوں کے وزن (گرام) کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان ڈبوں کے وزن کا حسابی اوسط معلوم کریں۔

| تعدادات         | جماعت / گروہ<br>اوزان (گراموں میں) |
|-----------------|------------------------------------|
| 2               | 0 — 9                              |
| 10              | 10 — 19                            |
| 5               | 20 — 29                            |
| 9               | 30 — 39                            |
| 6               | 40 — 49                            |
| 7               | 50 — 59                            |
| 1               | 60 — 69                            |
| $\Sigma f = 40$ | کل تعداد                           |

**حل :** سب سے پہلے ہم ہر گروہ کا درمیانی نقطہ معلوم کریں گے اور پھر حسابی اوسط معلوم کریں گے۔

| جماعت / گروہ<br>اوزان (گراموں میں) | تعدادات<br>$f$ | درمیانی نقاط<br>( $X$ ) | $fX$             |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 0 — 9                              | 2              | 4.5                     | 9                |
| 10 — 19                            | 10             | 14.5                    | 145              |
| 20 — 29                            | 5              | 24.5                    | 122.5            |
| 30 — 39                            | 9              | 34.5                    | 310.5            |
| 40 — 49                            | 6              | 44.5                    | 267              |
| 50 — 59                            | 7              | 54.5                    | 381.5            |
| 60 — 69                            | 1              | 64.5                    | 64.5             |
| کل تعداد                           | $\sum f = 40$  |                         | $\sum fX = 1300$ |

$$\bar{X} = \frac{\sum fX}{\sum f} = \frac{1300}{40} = 32.5 \text{ گرام (حسابی اوسط)}$$

**مثال 5:** مثال نمبر 4 کے مواد کو استعمال کرتے ہوئے عارضی حسابی اوسط کی قیمت  $X = 34.5$  لے کر مختصر فارمولا سے حسابی اوسط معلوم کریں۔

**حل :** ہم مندرجہ ذیل فارمولے استعمال کریں گے۔

$$(i) \quad \bar{X} = A + \frac{\sum fD}{\sum f}$$

$$(ii) \quad \bar{X} = A + \frac{\sum fu}{\sum f} \times h$$

جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے  $A = 34.5$  اور ہم نے دیکھا کہ تعدوی تقسیم میں ہر جماعتی وقفے کی جسامت '10' ہے لہذا ہم  $h = 10$  لیتے ہیں اور ہم مندرجہ ذیل طریقے سے جدول بناتے ہیں۔

| جماعت / گروہ | تعدادات<br>$f$ | $X$  | $D = X - 34.5$ | $u = (X - A)/10$ | $fD$            | $fu$           |
|--------------|----------------|------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 0 — 9        | 2              | 4.5  | -30            | -3               | -60             | -6             |
| 10 — 19      | 10             | 14.5 | -20            | -2               | -200            | -20            |
| 20 — 29      | 5              | 24.5 | -10            | -1               | -50             | -5             |
| 30 — 39      | 9              | 34.5 | 0              | 0                | 0               | 0              |
| 40 — 49      | 6              | 44.5 | 10             | 1                | 60              | 6              |
| 50 — 59      | 7              | 54.5 | 20             | 2                | 140             | 14             |
| 60 — 69      | 1              | 64.5 | 30             | 3                | 30              | 3              |
| کل تعداد     | 40             |      |                |                  | $\sum fD = -80$ | $\sum fu = -8$ |



اوپر والے فارمولوں میں قیمتیں درج کرنے سے

$$(i) \quad \bar{X} = 34.5 + \frac{-80}{40} = 34.5 - 2 = 32.5 \text{ گرام}$$

$$(ii) \quad \bar{X} = 34.5 + \frac{-8}{40} \times 10 = 34.5 - 2 = 32.5 \text{ گرام}$$

لہذا تینوں طریقوں سے جواب ایک جیسا ہے۔

### (b) (i) 6.3 وسطانیہ : (Median)

جب مواد کسی ترتیب یعنی بڑھتی یا گھٹتی ہوئی صورت میں ہو تو وسطانیہ وہ قدر ہے جو اس پورے مواد کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے (یعنی مواد کا پچاس فیصد حصہ وسطانی قدر سے پہلے اور پچاس فیصد وسطانی قدر کے بعد ہوتا ہے)۔ وسطانیہ کو 'x' سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم وسطانیہ نکالنے کے لیے مندرجہ ذیل فارمولے استعمال کرتے ہیں۔

**غیر گروہی مواد کے لیے:**

(i) ترتیب دیے ہوئے مواد میں جب مدات کی تعداد طاق ہو تو وسطانیہ مندرجہ ذیل فارمولے سے معلوم کیا جاتا ہے۔

$$\bar{X} = \text{وین قدر} \left( \frac{n}{2} + 1 \right)$$

(ii) ترتیب دیے ہوئے مواد میں جب مدات کی تعداد جفت ہو تو وسطانیہ درمیانی مدات کا حسابی اوسط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسطانیہ  $\frac{n}{2}$  وین اور  $\left( \frac{n}{2} + 1 \right)$  وین قدر کا حسابی اوسط ہے۔

$$\bar{X} = \frac{1}{2} \left[ \text{وین قدر} \frac{n}{2} + \text{وین قدر} \frac{n}{2} + 1 \right]$$

**مثال 1:** ریاضی کے پانچ نمبروں کے ٹیسٹ میں ایک طالب علم نے مندرجہ ذیل نمبرز لیے۔

79 اور 92، 86، 93، 82 نمبروں کے لیے وسطانیہ معلوم کریں۔

**حل:** گریڈز کو ترتیب صعودی میں لکھنے سے

79, 82, 86, 92, 93

$$n = 5$$

چونکہ مدات کی تعداد طاق ہے

$$\bar{X} = \text{وین قدر} \left( \frac{n+1}{2} \right)$$

لہذا

$$\bar{X} = \text{وین قدر} \left( \frac{5+1}{2} \right)$$

تیسری قدر  $\bar{X} =$

$$\bar{X} = 86$$

**مثال 2:** مختلف برینڈ کے چھ جوس کے پیک میں چینی کی مقدار ملی گراموں میں درج ذیل پائی گئی۔

1.9 اور 3.1، 2.9، 2.5، 2.7، 2.3 و وسطانیہ معلوم کریں۔

**حل:** مواد کو ترتیب صعودی میں لکھنے سے

1.9، 2.3، 2.5، 2.7، 2.9، 3.1

چونکہ مدات کی تعداد جفت ہے یعنی  $n = 6$

$$\bar{X} = \frac{1}{2} \left[ \frac{6}{2} \text{ ویں قدر} + \frac{6}{2} \text{ ویں قدر} + 1 \right]$$

$$\bar{X} = \frac{1}{2} \left[ \text{چوتھی قدر} + \text{تیسری قدر} \right]$$

$$\bar{X} = \frac{2.5 + 2.7}{2} = 2.6 \text{ ملی گرام}$$

گروہی مواد (غیر مسلسل):

غیر مسلسل گروہی مواد کے لیے وسطانیہ مندرجہ ذیل طریقے سے نکالا جاتا ہے۔

مجموعی تعددی تقسیم کا کالمی بنائیں۔

مجموعی تعددی تقسیم کو استعمال کرتے ہوئے وسطانی قدر معلوم کریں یعنی ایسی کلاس / گروہ جو  $\left(\frac{n}{2}\right)$  ویں قدر رکھتا ہو۔

**مثال 3:** مندرجہ ذیل تعددی تقسیم کے لیے وسطانیہ معلوم کریں۔

| تعدادات | X |
|---------|---|
| 3       | 1 |
| 8       | 2 |
| 5       | 3 |
| 3       | 4 |
| 1       | 5 |



**حل:** ہم مجموعی تعددی تقسیم کا کالم مندرجہ ذیل طریقے سے بنائیں گے۔

| X        | تعدادات         | مجموعی تعدادات |
|----------|-----------------|----------------|
| 1        | 3               | 3              |
| 2        | 8               | 11             |
| 3        | 5               | 16             |
| 4        | 3               | 19             |
| 5        | 1               | 20             |
| کل تعداد | $\Sigma f = 20$ |                |

اب ایسا گروہ جو  $\left(\frac{n}{2}\right)$  ویں قدر رکھتا ہو = وسطانیہ

ایسا گروہ جو  $\left(\frac{20}{2}\right)$  ویں قدر رکھتا ہو = وسطانیہ

ایسا گروہ/جماعت جو 10 ویں قدر رکھتا ہو = وسطانیہ

= 2 وسطانیہ

**گروہی مواد (مسل):**

مسل گروہی مواد کے لیے وسطانیہ درج ذیل طریقے سے نکالا جاتا ہے۔

حقیقی جماعتی حدود نکالی جائیں۔

مجموعی تعددی تقسیم کا کالم تشکیل دیں۔

مجموعی تعددی تقسیم سے وسطانی جماعت معلوم کریں یعنی وہ جماعت جو  $\left(\frac{n}{2}\right)$  ویں قدر رکھتی ہو۔

اس کے لیے مندرجہ ذیل فارمولا استعمال کریں۔

$$\text{وسطانیہ} = l + \frac{h}{f} \left\{ \frac{n}{2} - c \right\}$$

جہاں

$l$  : وسطانی جماعت کی زیریں جماعتی حدود

$h$  : وسطانی جماعت کے جماعتی وقفے کی جسامت

$f$  : وسطانی جماعت کی تعداد

$c$  : وسطانی جماعت سے پچھلی جماعت کا مجموعی تعداد

**مثال 4:** چالیس (40) طالب علموں نے ایک سوال کو حل کرنے میں جتنا وقت صرف کیا مندرجہ ذیل مواد اس وقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس مواد کی مدد سے وسطانیہ معلوم کریں۔

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 138 | 164 | 150 | 132 | 144 | 125 | 149 | 157 |
| 146 | 158 | 140 | 147 | 136 | 148 | 152 | 144 |
| 168 | 126 | 138 | 176 | 163 | 119 | 154 | 165 |
| 146 | 173 | 142 | 147 | 135 | 153 | 140 | 135 |
| 161 | 145 | 135 | 142 | 150 | 156 | 145 | 128 |

**حل:**

| (a) | مجموعی تعددات | حقیقی جماعتی حدود | تعددات          | جماعتی وقفہ |
|-----|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
|     | 3             | 117.5 – 126.5     | 3               | 118 — 126   |
|     | 8             | 126.5 – 135.5     | 5               | 127 — 135   |
|     | 17            | 135.5 – 144.5     | 9               | 136 — 144   |
|     | 29            | 144.5 – 153.5     | 12              | 145 — 153   |
|     | 34            | 153.5 – 162.5     | 5               | 154 — 162   |
|     | 38            | 162.5 – 171.5     | 4               | 163 — 171   |
|     | 40            | 171.5 – 180.5     | 2               | 172 — 180   |
|     | —             | —                 | $\Sigma f = 40$ | کل تعداد    |

وسطانی جماعت

لہذا

$$(\bar{X}) = l + \frac{h}{f} \left( \frac{n}{2} - c \right)$$

جہاں  $\frac{n}{2} = \frac{40}{2} = 20$ ۔ چونکہ وسطانیہ وہ قدر ہوتی ہے جو مواد کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے یعنی مواد کا (50) پچاس فیصد حصہ وسطانیہ قدر سے پہلے اور پچاس فیصد حصہ وسطانی قدر کے بعد ہوتا ہے۔ چونکہ پہلی تین تعددات کا اور پہلی چار تعددات کا مجموعہ بالترتیب  $3 + 5 + 9 = 17$  اور  $3 + 5 + 9 + 12 = 29$  ہے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وسطانی جماعت چوتھی جماعت میں لہذا

$$l = 144.5 = \text{وسطانی جماعت کی زیریں جماعتی حد}$$

$$c = 17 = \text{وسطانی جماعت سے پچھلی مجموعی تعدد}$$

$$f = 12 = \text{وسطانی جماعت کا تعدد}$$



$$h = 9 = \text{وسطانی جماعت کے جماعتی وقفے کی جسامت}$$

$$\bar{x} = l + \frac{h}{f} \left( \frac{n}{2} - c \right) = 144.5 + \frac{9}{12} (20 - 17)$$

$$\bar{x} = 146.8$$

(c) 6.3(i) عادی (Mode)

کسی سلسلہ یا مواد میں وہ قیمت جو سب سے زیادہ بار آئے عادی کہلاتی ہے۔ عادی کو نکالنے کے لیے مندرجہ ذیل فارمولا استعمال کیا جاتا ہے۔

(الف) غیر گروہی مواد اور غیر مسلسل گروہی مواد

(Ungrouped Data and Discrete Grouped Data)

مواد میں زیادہ بار آنے والی مد = عادی

(ب) گروہی مواد (مسلسل) Grouped Data (Continuous)

گروہی مواد کے تحت عادی کو نکالنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاتے ہیں۔

ایسا گروہ معلوم کریں جس کے سامنے سے بڑا تعدد ہو۔

مندرجہ ذیل فارمولا استعمال کریں۔

$$\bar{x} = l + \frac{f_m - f_1}{2f_m - f_1 - f_2} \times h$$

$l$  : عادی گروہ / جماعت کی حقیقی زیریں حد

جہاں

$h$  : عادی گروہ میں جماعتی وقفہ کی جسامت

$f_m$  : سب سے زیادہ تعدد رکھنے والے گروہ کا تعدد یعنی عادی گروہ کا تعدد

$f_1$  : عادی گروہ سے پہلے والے گروہ کا تعدد

$f_2$  : عادی گروہ کے بعد والے گروہ کا تعدد

مثال 1: مندرجہ ذیل مواد جو توتوں کی جسامت کو ظاہر کر رہا ہے اس مواد کی مد سے عادی معلوم کریں۔

4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 5, 7.5, 8, 8, 8, 6, 5, 6, 5, 7

حل: ہم نے مواد میں سب سے زیادہ بار آنے والی قیمت کو دیکھا اور معلوم کیا کہ

$$= 6 \text{ عادی}$$

**مثال 2:** مندرجہ ذیل تعددی تقسیم کے لیے عادی معلوم کریں۔

| تعدادات | X (ہیڈز کی تعداد) |
|---------|-------------------|
| 3       | 1                 |
| 8       | 2                 |
| 5       | 3                 |
| 3       | 4                 |
| 1       | 5                 |

**حل:** چونکہ دیا ہوا مواد غیر مسلسل گروہی مواد ہے لہذا

$$عادی = 2$$

(چونکہ  $X = 2$  کے لئے تعدد سب سے بڑا ہے یعنی "2 ہیڈز" سب سے زیادہ تعداد دفعہ 8 مرتبہ آیا ہے۔)

**مثال 3:** مندرجہ ذیل مواد ثانی کے ڈبوں کا اوزان (گراموں میں) ظاہر کر رہا ہے۔ عادی معلوم کریں۔

| تعدادات | جماعت / گروہ |
|---------|--------------|
| 2       | 0 — 9        |
| 10      | 10 — 19      |
| 5       | 20 — 29      |
| 9       | 30 — 39      |
| 6       | 40 — 49      |
| 7       | 50 — 59      |
| 1       | 60 — 69      |

**حل:** چونکہ یہ مسلسل گروہی مواد ہے لہذا ہم اس کا عادی درج ذیل طریقہ سے نکالیں گے۔

(الف) سب سے پہلے حقیقی جماعتی حدود معلوم کریں۔

(ب) سب سے بڑا تعدد رکھنے والا گروہ معلوم کریں۔



| تعدادات (f)     | حقیقی جماعتی حدود | گروہ/جماعت |
|-----------------|-------------------|------------|
| 2               | -0.5 — 9.5        | 0 — 9      |
| 10              | 9.5 — 19.5        | 10 — 19    |
| 5               | 19.5 — 29.5       | 20 — 29    |
| 9               | 29.5 — 39.5       | 30 — 39    |
| 6               | 39.5 — 49.5       | 40 — 49    |
| 7               | 49.5 — 59.5       | 50 — 59    |
| 1               | 59.5 — 69.5       | 60 — 69    |
| $\Sigma f = 40$ |                   | کل تعداد   |

→ عادیہ گروہ

مندرجہ بالا جدول سے ہم نے دیکھا

$$\text{عادیہ گروہ} = 9.5 - 19.5$$

$$f_m = 10, l = 9.5, h = 10$$

$$f_1 = 2 \text{ اور } f_2 = 5$$

$$\text{عادیہ} = l + \frac{f_m - f_1}{2f_m - f_1 - f_2} \times h$$

$$\text{عادیہ} = 9.5 + \frac{10 - 2}{2(10) - 2 - 5} \times 10$$

$$\text{عادیہ} = 9.5 + \frac{80}{13} = 9.5 + 6.134$$

$$= 15.654 \text{ گرام}$$

### 6.3(i) (d) اقلیدسی اوسط (Geometric Mean)

کسی متغیر X کی اقلیدسی اوسط سے مراد n-مدات  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  کے حاصل ضرب کا  $n^{\text{th}}$  مثبت رُوت (Root) ہے۔ علامتی طور پر ہم اسے یوں لکھیں گے۔

$$\text{اقلیدسی اوسط (G.M.)} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)^{1/n}$$

مندرجہ بالا فارمولا لوگار تھم کو استعمال کرتے ہوئے یوں بھی لکھا جاسکتا ہے۔

غیر گروہی مواد کے لیے

$$\text{G.M.} = \text{Anti log} \left( \frac{\sum \log X}{n} \right)$$

گروہی مواد کے لیے

$$\text{G.M.} = \text{Anti log} \left( \frac{\sum f \log X}{\sum f} \right)$$

**مثال 1:** مدت 2، 4، 8 کے لئے اقلیدسی اوسط معلوم کریں۔ بذریعہ

(الف) بنیادی فارمولا کی مدد سے

(ب) لوگار تھم فارمولا کی مدد سے

**حل:** (الف) بنیادی فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے

$$(G.M) = (2 \times 4 \times 8)^{1/3} = (64)^{1/3} = 4$$

(ب) لوگار تھم فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے

| X        | log X                    |
|----------|--------------------------|
| 2        | 0.3010                   |
| 4        | 0.6021                   |
| 8        | 0.9031                   |
| کل تعداد | $\Sigma \log X = 1.8062$ |

$$(G.M) = \text{Anti-log} \left( \frac{1.8062}{3} \right)$$

$$= \text{Anti-log} (0.6021) = 4.00003 = 4$$

**مثال 2:** مندرجہ ذیل مواد کی مدد سے اقلیدسی اوسط معلوم کریں۔

| تعدادات (طالبعلموں کی تعداد) | نمبر (فیصد) |
|------------------------------|-------------|
| 28                           | 31 — 40     |
| 31                           | 41 — 50     |
| 12                           | 51 — 60     |
| 9                            | 61 — 70     |
| 5                            | 71 — 80     |

**حل:**

| گروہ     | تعدادات (f)     | X    | log X  | f log X                      |
|----------|-----------------|------|--------|------------------------------|
| 31 — 40  | 28              | 35.5 | 1.5502 | 43.4056                      |
| 41 — 50  | 31              | 45.5 | 1.6580 | 51.398                       |
| 51 — 60  | 12              | 55.5 | 1.7443 | 20.9316                      |
| 61 — 70  | 9               | 65.5 | 1.8162 | 16.3458                      |
| 71 — 80  | 5               | 75.5 | 1.8779 | 9.3895                       |
| کل تعداد | $\Sigma f = 85$ |      |        | $\Sigma f \log X = 141.4705$ |



$$(G.M) = \text{Anti-log} \left( \frac{\sum f \log X}{\sum f} \right)$$

$$G.M = \text{Anti-log} \left( \frac{141.4705}{85} \right)$$

$$= \text{Anti-log} (1.66436) = 46.17 \text{ فیصد نمبر}$$

(Harmonic Mean) ہم آہنگ اوسط 6.3(i) (e)

ہم آہنگ اوسط وہ قیمت ہے جو  $n$  - تہات  $x_1, x_2, \dots, x_n$  کے معکوس یعنی  $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \dots, \frac{1}{x_n}$  کا معکوس وسط ہے۔

علامتی طور پر اسے مندرجہ ذیل طریقہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

غیر گروہی مواد کے لیے فارمولا

$$(H.M) = \frac{n}{\sum \frac{1}{X}}$$

گروہی مواد کے لیے فارمولا

$$(H.M) = \frac{\sum f}{\sum \frac{f}{X}}$$

مثال 1: مندرجہ ذیل مواد کے لیے ہم آہنگ اوسط معلوم کریں۔

|   |    |   |   |   |
|---|----|---|---|---|
| X | 12 | 5 | 8 | 4 |
|---|----|---|---|---|

حل:

| X        | 1/X    |
|----------|--------|
| 12       | 0.0833 |
| 5        | 0.2    |
| 8        | 0.125  |
| 4        | 0.25   |
| کل تعداد | 0.6583 |

$$H.M = \frac{n}{\sum \frac{1}{X}} = \frac{4}{0.6583} = 6.076$$

**مثال 2:** مندرجہ ذیل مواد کو استعمال کرتے ہوئے ہم آہنگ اوسط معلوم کریں۔

| طالب علموں کی تعداد | گروہ/جماعت |
|---------------------|------------|
| 28                  | 31 — 40    |
| 31                  | 41 — 50    |
| 12                  | 51 — 60    |
| 9                   | 61 — 70    |
| 5                   | 71 — 80    |

**حل:**

| جماعت    | تعدادات (f)     | X    | f / X                         |
|----------|-----------------|------|-------------------------------|
| 31 — 40  | 28              | 35.5 | 0.7887                        |
| 41 — 50  | 31              | 45.5 | 0.6813                        |
| 51 — 60  | 12              | 55.5 | 0.2162                        |
| 61 — 70  | 9               | 65.5 | 0.1374                        |
| 71 — 80  | 5               | 75.5 | 0.0662                        |
| کل تعداد | $\Sigma f = 85$ |      | $\frac{\Sigma f}{X} = 1.8898$ |

$$H.M = \frac{\Sigma f}{\frac{\Sigma f}{X}} = \frac{85}{1.8898} = 44.9783$$

(ہم آہنگ اوسط)

### حسابی اوسط کی خصوصیات : (Properties of Arithmetic Mean)

(الف) ایک جیسی مدات مثلاً مستقل مقدار 'k' کا حامل متغیر کا حسابی اوسط بھی وہی مستقل مقدار 'k' ہی ہوتا ہے۔

(ب) مرکز کی تبدیلی حسابی اوسط پر اثر انداز ہوتی ہے۔

(ج) سکیل کی تبدیلی بھی حسابی اوسط پر اثر انداز ہوتی ہے۔

(د) متغیر x کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ صفر ہوتا ہے۔

**مثال 1:** مندرجہ ذیل مدات کا حسابی اوسط معلوم کریں۔

34, 34, 34, 34, 34, 34

**حل:** کیونکہ متغیر x کی تمام مدات ایک جیسی ہیں لہذا پہلی خصوصیت کے مطابق

$$\text{حسابی اوسط} = 34$$

**مثال 2:** متغیر x کی قیمتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ 4, 5, 8, 6, 2

x کا حسابی اوسط معلوم کریں۔ اور حسابی اوسط معلوم کریں جب



(ا) ہندسہ پانچ کو ہر مد میں جمع کریں۔

(ب) ہندسہ 10 کو ہر مد سے ضرب دیں۔

(ج) ثابت کریں حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ صفر ہے۔

**حل :** 'X' کی دی ہوئی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

X: 4 5 8 6 2

ہم یہاں (ا) اور (ب) کے لیے بالترتیب دو متغیر X اور Y کا تعارف کروائیں گے اس لیے درج ذیل جدول تشکیل دیا جائے گا۔

(a)  $Y = X + 5$

لہذا

(b)  $Z = 10X$

|          | X               | $Y = X + 5$     | $Z = 10X$        | $X - \bar{X}$              |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
|          | 4               | 9               | 40               | -1                         |
|          | 5               | 10              | 50               | 0                          |
|          | 8               | 13              | 80               | 3                          |
|          | 6               | 11              | 60               | 1                          |
|          | 2               | 7               | 20               | -3                         |
| کل تعداد | $\Sigma X = 25$ | $\Sigma Y = 50$ | $\Sigma Z = 250$ | $\Sigma (X - \bar{X}) = 0$ |

اوپر والے جدول کے مطابق

$$\bar{X} = \frac{25}{5} = 5 ; \bar{Y} = \frac{50}{5} = 10 ; \bar{Z} = \frac{250}{5} = 50$$

ہم نے نوٹ کیا کہ

(ا)  $\bar{Y} = 10 = 5 + 5 = \bar{X} + 5$

(ب)  $\bar{Z} = 50 = 10(5) = 10\bar{X}$

جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حسابی اوسط مرکز اور سکیل کے تبدیل ہونے سے اثر انداز ہوتی ہے۔

(ج) جدول کے آخری کالم کے مطابق  $\Sigma (X - \bar{X}) = 0$  یعنی حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ صفر ہے۔

**(iii) 6.3 وزنی حسابی اوسط اور حرکت (حسابی) اوسط کے نکالنے کا طریقہ**

**(الف) وزنی حسابی اوسط : (Weighted Arithmetic Mean)**

کسی نمبر کی نسبتاً اہمیت اس کا وزن کہلاتی ہے۔ جب نمبرز  $x_1, x_2, \dots, x_n$  برابر اہمیت کے حامل نہ ہوں تو ہم انہیں مختلف اوزان  $w_1, w_2, w_3, \dots, w_n$  کے ذریعے ان کی اہمیت کے مطابق ملا دیتے ہیں۔

$$\bar{x}_w = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n} = \frac{\sum wx}{\sum w}$$

$\bar{x}_w$  وزنی حسابی اوسط کہلاتا ہے۔

**مثال 1:** مندرجہ ذیل مواد کا جدول ماہانہ آمدنی اور کسی فیکٹری میں ملازمین کی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس مواد کی مدد سے وزنی حسابی اوسط معلوم کریں۔

| ملازمین کی تعداد | ماہانہ آمدنی (روپے) |
|------------------|---------------------|
| 4                | 800                 |
| 22               | 45                  |
| 20               | 100                 |
| 30               | 30                  |
| 80               | 35                  |
| 300              | 15                  |

**حل :** اوپر دی گئی معلومات میں ملازمین کی تعداد وزن (w) اور ماہانہ آمدنی متغیر (x) ہے۔

| ملازمین کی تعداد (w) | ماہانہ آمدنی (x) (روپے) | xw                |
|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 4                    | 800                     | 3200              |
| 22                   | 45                      | 990               |
| 20                   | 100                     | 2000              |
| 30                   | 30                      | 900               |
| 80                   | 35                      | 2800              |
| 300                  | 15                      | 4500              |
| $\sum w = 456$       | —                       | $\sum xw = 14390$ |

$$\bar{x}_w = \frac{\sum xw}{\sum w} = \frac{14390}{456} = 31.5$$

**(ب) حرکتی اوسط : (Moving Average)**

حرکتی اوسط کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ مسلسل اوسط (حسابی اوسط) جو کہ ایک ہی وقت میں یا مہینوں یا سالوں کے تسلسل کے لئے معلوم کی جاتی ہے۔ اگر ہم 3 دن کی حرکتی اوسط معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے 3 دن کی حسابی اوسط معلوم کریں گے پھر ہم پہلے دن کو چھوڑ کر لگاتار بعد میں آنے والے دن کو اس گروہ میں جمع کریں گے۔ ہر تین دنوں کی اوسط کو ان تین دنوں کے درمیان والی جگہ کے مد مقابل لکھیں گے۔ یہ عمل تب تک جاری رہے گا جب تک تمام دن یعنی پہلے دن سے آخری دن تک ختم نہ ہو جائیں۔



**مثال 2:** مندرجہ ذیل حاضری کے ریکارڈ سے تین دن کی حرکتی اوسط معلوم کریں۔

| Week | اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|------|-------|-----|------|-----|--------|------|------|
| 1    | 24    | 55  | 28   | 45  | 51     | 54   | 60   |

**حل:**

| ہفتے اور دن | حاضری | تین دن حرکتی اوسط |                 |
|-------------|-------|-------------------|-----------------|
|             |       | کل تعداد          | اوسط            |
| اتوار       | 24    | —                 | —               |
| پیر         | 55    | 107               | $107/3 = 35.67$ |
| منگل        | 28    | 128               | $128/3 = 42.67$ |
| بدھ         | 45    | 124               | $124/3 = 41.33$ |
| جمعرات      | 51    | 150               | $150/3 = 50.00$ |
| جمعہ        | 54    | 165               | $165/3 = 55.00$ |
| ہفتہ        | 60    | —                 | —               |

پہلی تین قیمتوں کو جمع کر کے 107 آیا جو کہ ان تین قیمتوں کے درمیان لکھا گیا یعنی پیر کے مد مقابل اور پھر پہلی قیمت یعنی 24 کو گرا دیا گیا اور اگلی تین قیمتوں کو جمع کر کے حاصل جمع 128 حاصل ہوا جسے ان تین قیمتوں کے درمیان میں لکھا گیا۔ اسی طرح آگے بھی عمل کیا گیا۔ اور اوسط کے لئے کل تعداد/میزان کو 3 پر تقسیم کر کے جدول کے آخری کالم میں لکھ دیا گیا ہے۔

**(iv) 6.3 وسطانیہ، چہارمی حصہ اور عادیہ کا گراف اظہار**

**(Graphical Location of Median, Quartiles and Mode):**

ہم وسطانیہ، چہارمی حصہ اور عادیہ کے گراف کو درج ذیل مثالوں سے ظاہر کرتے ہیں۔


**مثال 1:** مندرجہ ذیل تعددی تقسیم کو استعمال کرتے ہوئے وسطانیہ اور چہارمی حصہ کی گراف پر نشاندہی کریں۔

| مجموعی تعدادات | حقیقی جماعتی حدود |
|----------------|-------------------|
| 0              | 120 سے کم         |
| 12             | 130 سے کم         |
| 27             | 140 سے کم         |
| 51             | 150 سے کم         |



|    |           |
|----|-----------|
| 64 | 160 سے کم |
| 71 | 170 سے کم |
| 76 | 180 سے کم |
| 80 | 190 سے کم |
| 82 | 200 سے کم |

**حل:** ہم وسطانیہ اور چہارمی حصہ کی گراف پر نشاندہی کے لیے مجموعی تعددی کثیر الاضلاع کو استعمال کریں۔



پیمانہ  
X-محور: ایک چھوٹا سیل = 10  
Y-محور: 5 چھوٹے سیل = 1

$Q_1$  معلوم کرنے کے لیے

(الف)  $\left(\frac{n}{4}\right)$  ویں مد معلوم کریں جو کہ  $\frac{82}{4} = 20.5$  ہے۔

(ب) Y-محور پر 20.5 کی گراف پر نشاندہی کریں اور Y-محور (y-axis) سے افقی لائن کھینچیں جو کہ X-محور (x-axis) کے متوازی ہو اور کثیر الاضلاع کو چھوئے۔

(ج) اُس نقطے سے ایک عمودی لائن کھینچیں جو کہ X-محور کو چھوئے۔

(د) پہلے چوتھائی حصے  $Q_1$  کی قیمت نوٹ کریں جہاں پر لائن X-محور کو ملتی ہے جو کہ 135.17 ہے۔

$Q_2$  یا وسطانیہ معلوم کرنے کے لیے

(الف)  $2\left(\frac{n}{4}\right)$  ویں مد معلوم کریں جو کہ  $2\left(\frac{82}{4}\right) = 41$  ہے۔

(ب) گراف کے Y-محور پر 41 کی نشاندہی کریں اور Y-محور سے افقی لائن کھینچیں جو کہ X-محور کے متوازی ہو اور کثیر الاضلاع کو چھوئے۔

(ج) اُس نقطے سے ایک عمودی لائن کھینچیں جو کہ X-محور کو چھوئے۔



(د) وسطیٰ کی قیمت نوٹ کریں جہاں پر لائن  $X$ -محور کو ملتی ہے جو کہ 145.33 ہے۔

$Q_3$  معلوم کرنے کے لیے

(الف)  $3\left(\frac{n}{4}\right) = 61.5$  جو کہ  $\left(\frac{82}{4}\right) = 61.5$  ہے۔

(ب)  $Y$ -محور پر 61.5 کی گراف پر نشان دہی کریں اور  $Y$ -محور سے افقی لائن کھینچیں جو  $X$ -محور کے متوازی ہو اور کثیر الاضلاع کو چھوئے۔


(ج) اس نقطے سے ایک عمودی لائن کھینچیں جو کہ  $X$ -محور کو چھوئے۔

(د)  $Q_3$  کی قیمت نوٹ کریں جہاں پر لائن  $X$ -محور کو ملتی ہے جو کہ 157.57 ہے۔

مشال 2: مندرجہ ذیل تعددی تقسیم کی مدد سے عادی کی گراف پر نشان دہی کریں۔

| اساتذہ کی تعداد | تخوابیں (روپے) |
|-----------------|----------------|
| 12              | 120 — 130      |
| 15              | 130 — 140      |
| 24              | 140 — 150      |
| 13              | 150 — 160      |
| 7               | 160 — 170      |
| 5               | 170 — 180      |
| 4               | 180 — 190      |
| 2               | 190 — 200      |

حل: کالی نقشہ پر عادی کو  $X$ -محور پر درج ذیل طریقہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔



## اقدامات:

- (i) سب سے اونچی مستطیل معلوم کریں جو عادیہ جماعت / گروہ کو ظاہر کرتی ہے۔
- (ii) اس مستطیل کے اوپر والے بائیں کونے سے ایک لائن اگلی مستطیل کے بائیں اوپر والے کونے کی طرف کھینچیں۔
- (iii) اسی طرح اس مستطیل کے اوپر والے دائیں کونے سے ایک لائن پچھلی مستطیل کے دائیں اوپر والے کونے کی طرف کھینچیں۔
- (iv) اس مستطیل کے اوپر والے سرے سے ایک عمود  $X$ ۔ محور پر گرائیں جو ان دونوں لائنوں کے ہم تقاطع نقطہ سے ہوتا آئے۔
- (v) جہاں پر وہ عمود  $X$ ۔ محور پر ملتا ہے اس نقطے کی قیمت نوٹ کریں۔ یہی اس مواد کا عادیہ کہلائے گا جو کہ دیے ہوئے مواد میں 144 ہے۔

## مشق 6.2

- 1- مرکزی رجحان کے پیمانے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کریں۔
- 2- حسابی اوسط، اقلیدسی اوسط، ہم آہنگ اوسط، وسطانیہ اور عادیہ کی تعریف لکھیں۔
- 3- بلاواسطہ / تعریفی طریقہ سے مندرجہ ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کریں۔
  - (i) 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45.
  - (ii) 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290.
- 4- بالواسطہ (مختصر / کوڈنگ) طریقہ سے مندرجہ بالا سوال نمبر 3 کا مواد استعمال کرتے ہوئے حسابی اوسط معلوم کریں۔
- 5- گیارہویں جماعت میں طالب علموں نے ریاضی میں جو نمبرز لیے وہ حسب ذیل ہیں۔ بلاواسطہ اور بالواسطہ طریقوں سے حسابی اوسط معلوم کریں۔

| تعدادات | جماعت / گروہ |
|---------|--------------|
| 2       | 0—9          |
| 10      | 10—19        |
| 5       | 20—29        |
| 9       | 30—39        |
| 6       | 40—49        |
| 7       | 50—59        |
| 1       | 60—69        |



- 6- مندرجہ ذیل مواد کسی سکول کے بچوں کی عمر کو ظاہر کر رہا ہے بلا واسطہ اور مختصر طریقہ سے فرضی اوسط لے کر حسابی اوسط معلوم کریں۔ (اشارہ 8 = A لیں)

| تعدادات | جماعتی حدود |
|---------|-------------|
| 10      | 4—6         |
| 20      | 7—9         |
| 13      | 10—12       |
| 7       | 13—15       |
| 50      | کل تعداد    |

اور اقلیدسی اوسط اور ہم آہنگ اوسط بھی معلوم کریں۔

- 7- مندرجہ ذیل مواد مختلف خاندانوں میں بچوں کی تعداد کو ظاہر کر رہا ہے۔ وسطانیہ اور عادیہ معلوم کریں۔

9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 12, 8, 9, 10, 6, 7, 7, 11, 4, 4, 8, 4, 3, 2, 7, 9, 10, 9, 7, 6, 9, 5.

- 8- جب پانچ سکوں کو اچھالا گیا تو مندرجہ ذیل تعددی تقسیم ہیڈز کی تعداد کو ظاہر کر رہی ہے۔ عادیہ معلوم کریں اور وسطانیہ بھی معلوم کریں۔

| تعدادات | X (ہیڈز کی تعداد) |
|---------|-------------------|
| 3       | 1                 |
| 8       | 2                 |
| 5       | 3                 |
| 3       | 4                 |
| 1       | 5                 |

- 9- مندرجہ ذیل مواد لڑکوں کے اوزان (کلوگرام) کو ظاہر کر رہا ہے۔ حسابی اوسط، وسطانیہ اور عادیہ معلوم کریں۔

| تعدادات | جماعتی وقفہ |
|---------|-------------|
| 2       | 1—3         |
| 3       | 4—6         |
| 5       | 7—9         |
| 4       | 10—12       |
| 6       | 13—15       |
| 2       | 16—18       |
| 1       | 19—21       |

- 10- ایک طالب علم نے امتحان میں مندرجہ ذیل نمبرز لیے۔

انگلش 73، اردو 82، ریاضی 80، تاریخ 67 اور سائنس 62

(الف) اگر اوزان ان نمبروں کے مطابق بالترتیب 2, 3, 3, 4 اور 2 ہوں تو مناسب اوسط نمبر کیا ہو گا؟

(ب) اگر مساوی اوزان لیے جائیں تو اوسط نمبر کیا ہو گا؟

11- چھٹیوں میں سیر و تفریح پر جانے والے ایک خاندان نے 21.3 لٹر پٹرول 39.90 روپے فی لٹر، 18.7 لٹر پٹرول

42.90 روپے فی لٹر اور 23.5 لٹر پٹرول 40.90 روپے فی لٹر میں خریدا۔ پٹرول کی اوسط فی لٹر قیمت معلوم کریں۔

12- مندرجہ ذیل مواد کی مدد سے سادہ حرکتی اوسط معلوم کریں۔

| سال    | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| قیمتیں | 102  | 108  | 130  | 140  | 158  | 180  | 196  | 210  | 220  | 230  |

13- گراف کی مدد سے مندرجہ ذیل مواد کو استعمال کرتے ہوئے جوابات معلوم کریں اور پھر فارمولوں کی مدد سے ان جوابات کی پڑتال کیجیے۔

(الف) وسطانیہ اور چہارمی حصہ، مجموعی تعددی کثیر الاضلاع کی مدد سے معلوم کریں۔

(ب) کالمی نقشہ بنا کر عادیہ معلوم کریں۔

| تعدادات | حقیقی جماعتی حدود |
|---------|-------------------|
| 2       | 10—20             |
| 5       | 20—30             |
| 9       | 30—40             |
| 6       | 40—50             |
| 4       | 50—60             |
| 1       | 60—70             |

## 6.4 انتشاری پیمانے (Measures of Dispersion)

شماریات میں انتشار کا مطلب کسی مواد میں موجودہ دات کا پھیلاؤ ہے۔ اس پھیلاؤ کو مواد میں مندرجہ ذیل دو طریقوں سے دیکھا جاتا ہے۔

(الف) مواد کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی دودات کے درمیان پھیلاؤ۔

(ب) حسابی اوسط کے ارد گرد دات کا پھیلاؤ۔

انتشار معلوم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم درمیانی قیمت کے ارد گرد ہر آبادی (Population) کی اکائی کے رویہ کو پرکھ سکیں اور یہ دو مواد کا موازنہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔

ایسا پیمانہ جو مواد میں تبدیلی کی حد یا ڈگری معلوم کرنے کے لئے استعمال ہو انتشاری پیمانہ کہلاتا ہے۔

ہم یہاں مطلقاً چند اہم انتشاری پیمانوں کے بارے میں بات کریں گے۔



## (الف) سعت (Range)

دیے گئے مواد میں سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی مد کے فرق کو سعت کہا جاتا ہے۔ اس کی پیمائش کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} \text{چھوٹی قیمت} - \text{بڑی قیمت} &= \text{سعت} \\ &= X_{\max} - X_{\min} = X_m - X_0 \end{aligned}$$

جہاں

$$X_{\max} = X_m = \text{سب سے بڑی مد}$$

$$X_{\min} = X_0 = \text{سب سے چھوٹی مد}$$

مسلل گروہی مواد کے لیے سعت نکالنے کا فارمولا درج ذیل ہے۔

$$\text{سعت} = (\text{پہلے گروہ کی زیریں جماعتی حد}) - (\text{آخری گروہ کی بالائی جماعتی حد})$$

**مثال 1:** طالب علموں کے اوزان کی سعت معلوم کریں۔

110, 109, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103, 62.

**حل:** دیے گئے مواد کے مطابق

$$X_m = \text{سب سے بڑی مد} = 110$$

$$X_0 = \text{سب سے چھوٹی مد} = 49$$

$$\begin{aligned} \text{سعت} &= X_m - X_0 \\ &= 110 - 49 = 61 \end{aligned}$$

**مثال 2:** مندرجہ ذیل تعددی تقسیم کی سعت معلوم کریں۔

| گروہ/جماعت | $f$             |
|------------|-----------------|
| 10 — 19    | 10              |
| 20 — 29    | 7               |
| 30 — 39    | 9               |
| 40 — 49    | 6               |
| 50 — 59    | 9               |
| 60 — 69    | 1               |
| کل تعداد   | $\Sigma f = 40$ |

**حل:** ہم مواد کو استعمال کرتے ہوئے حقیقی جماعتی حدود درج ذیل طریقے سے نکالیں گے۔

| تعدادات | حقیقی جماعتی حدود | گروہ/جماعت |
|---------|-------------------|------------|
| 10      | 9.5—19.5          | 10 — 19    |
| 7       | 19.5—29.5         | 20 — 29    |
| 9       | 29.5—39.5         | 30 — 39    |
| 6       | 39.5—49.5         | 40 — 49    |
| 7       | 49.5—59.5         | 50 — 59    |
| 1       | 59.5—69.5         | 60 — 69    |

(پہلے گروہ کی زیریں جماعتی حد) - (آخری گروہ کی بالائی جماعتی حد) = سعت

$$\text{سعت} = 69.5 - 9.5 = 60$$

### (ب) تغیریت (Variance)

تغیریت وہ قیمت ہے جو کسی مواد میں انحرافات کے مربعوں کو جو کہ حسابی اوسط سے لیے گئے ہوں، اُن کے مجموعہ کو ان کی مدات  $x_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ علامتی طور پر اسے  $S^2$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$X = S^2 = \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}$$

### (ج) معیاری انحراف (Standard Deviation)

معیاری انحراف اس قیمت کا مثبت جذر ہے جو کسی مواد میں انحرافات کے مربعوں کو جو کہ حسابی اوسط سے لیے گئے ہوں اُن کے مجموعہ کو ان کی مدات کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہو۔ مختصراً معیاری انحراف تغیریت کا مثبت جذر ہے۔ علامتی طور پر اسے S.D سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$X = \text{S.D. } (X) = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}}$$

### تغیریت اور معیاری انحراف معلوم کرنے کا طریقہ

ہم گروہی اور غیر گروہی مواد سے تغیریت اور معیاری انحراف نکالنے کے لیے درج ذیل فارمولے استعمال کرتے

ہیں۔

غیر گروہی مواد کے لیے:

تغیریت کا فارمولا

$$\text{Var } (X) = S^2 = \frac{\sum X^2}{n} - \left( \frac{\sum X}{n} \right)^2$$



معیاری انحراف کا فارمولا

$$S.D (X) = S = \sqrt{\left[ \frac{\sum X^2}{n} - \left( \frac{\sum X}{n} \right)^2 \right]}$$

**مثال 3:** چھ طالب علموں کے ریاضی میں حاصل کردہ نمبرز درج ذیل ہیں۔ تغیریت اور معیاری انحراف معلوم کریں۔

| طالب علم | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| نمبرز    | 60 | 70 | 30 | 90 | 80 | 42 |

**حل:** فرض کیا طالب علم کے نمبرز  $X =$

ہم تغیریت اور معیاری انحراف معلوم کرنے کے لیے جدول میں مندرجہ ذیل کالم بنائیں گے۔

|          | $X$              | $X^2$                | $X - \bar{X}$              | $(X - \bar{X})^2$               |
|----------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
|          | 60               | 3600                 | -2                         | 4                               |
|          | 70               | 4900                 | 8                          | 64                              |
|          | 30               | 900                  | -32                        | 1024                            |
|          | 90               | 8100                 | 28                         | 784                             |
|          | 80               | 6400                 | 18                         | 324                             |
|          | 42               | 1764                 | -20                        | 400                             |
| کل تعداد | $\Sigma X = 372$ | $\Sigma X^2 = 25664$ | $\Sigma (X - \bar{X}) = 0$ | $\Sigma (X - \bar{X})^2 = 2600$ |

$$\text{نمبرز } 62 = \frac{\sum X}{n} = \frac{372}{6} = \text{ حسابی اوسط } (\bar{X})$$

$$433.3333 = \text{مربع نمبرز } S^2 = \frac{2600}{6} = \text{تغیریت}$$

فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے

$$S^2 = \frac{25664}{6} - \left( \frac{372}{6} \right)^2 = \text{تغیریت}$$

$$433.3333 = \text{مربع نمبرز } 4277.3333 - 3844 =$$

$$S = \sqrt{4277.3333 - 3844} = \sqrt{433.3333} = \text{معیاری انحراف}$$

$$20.81666 \approx \text{نمبرز}$$

گروہی مواد

تغیریت کا فارمولا

$$S^2 = \frac{\sum fX^2}{\sum f} - \left( \frac{\sum fX}{\sum f} \right)^2$$

$$S = \sqrt{\left[ \frac{\sum fX^2}{\sum f} - \left( \frac{\sum fX}{\sum f} \right)^2 \right]}$$

**مثال 4:** مندرجہ ذیل مواد ثانی کے ڈبوں کے اوزان (گراموں میں) ظاہر کر رہا ہے۔ تغییریت اور معیاری انحراف معلوم کریں۔

| $X$ (gm) | $f$ |
|----------|-----|
| 4.5      | 2   |
| 14.5     | 10  |
| 24.5     | 5   |
| 34.5     | 9   |
| 44.5     | 6   |
| 54.5     | 7   |
| 64.5     | 1   |

**حل:** ہم مندرجہ ذیل جدول بنائیں گے۔

| $X$      | $f$ | $X - \bar{X}$ | $(X - \bar{X})^2$            | $f(X - \bar{X})^2$                | $fX$              | $fX^2$                |
|----------|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.5      | 2   | -28           | 784                          | 1568                              | 9                 | 40.5                  |
| 14.5     | 10  | -18           | 324                          | 3240                              | 145               | 2102.5                |
| 24.5     | 5   | -8            | 64                           | 320                               | 122.5             | 3001.25               |
| 34.5     | 9   | 2             | 4                            | 36                                | 310.5             | 10712.25              |
| 44.5     | 6   | 12            | 144                          | 864                               | 267               | 11881.5               |
| 54.5     | 7   | 22            | 484                          | 3388                              | 381.5             | 20791.75              |
| 64.5     | 1   | 32            | 1024                         | 1024                              | 64.5              | 4160.25               |
| کل تعداد |     |               | $\Sigma(X - \bar{X}) = 2600$ | $\Sigma f(X - \bar{X})^2 = 10440$ | $\Sigma fX = 130$ | $\Sigma fX^2 = 52690$ |

بنیادی فارمولا کے مطابق

$$S^2 = \frac{10440}{40} = 261 \text{ مربع گرام}$$

گروہی مواد والا فارمولا کے مطابق

$$S^2 = \frac{52690}{40} - \left( \frac{1300}{40} \right)^2$$

$$= 1317.25 - (32.5)^2 = 1317.25 - 1056.25$$



$$= \text{مربع گرام } 261 =$$

معیاری انحراف کے فارمولے کے مطابق

$$S = \sqrt{\frac{10440}{40}} = \sqrt{261} = 16.155 \text{ گرام}$$

$$S = \sqrt{\frac{52690}{40} - \left(\frac{1300}{40}\right)^2} = \sqrt{261}$$

$$= 16.155 \text{ گرام}$$

**مثال 5:** طالبعلموں نے شماریات میں جو نمبرز لیے درج ذیل مواد ان نمبروں کو ظاہر کر رہا ہے گروپ A اور گروپ B کی اوسطی تبدیلی کا موازنہ کریں۔

| $X$ = نمبرز (گروپ - اے) | $Y$ = نمبرز (گروپ - بی) |
|-------------------------|-------------------------|
| 60                      | 62                      |
| 70                      | 62                      |
| 30                      | 65                      |
| 90                      | 68                      |
| 80                      | 67                      |
| 40                      | 48                      |

**حل:** اوسط تبدیلی کا موازنہ کرنے کے لیے ہم دونوں گروپوں کا معیاری انحراف معلوم کریں گے۔

| $X$      | $Y$              | $X - \bar{X}$    | $(X - \bar{X})^2$              | $Y - \bar{Y}$ | $(Y - \bar{Y})^2$             |
|----------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 60       | 62               | -2               | 4                              | 0             | 0                             |
| 70       | 62               | 8                | 64                             | 0             | 0                             |
| 30       | 65               | -32              | 1024                           | 3             | 9                             |
| 90       | 68               | 28               | 784                            | 6             | 36                            |
| 80       | 67               | 18               | 324                            | 5             | 25                            |
| 40       | 48               | -20              | 400                            | -14           | 196                           |
| کل تعداد | $\Sigma X = 370$ | $\Sigma Y = 372$ | $\Sigma(X - \bar{X})^2 = 2600$ |               | $\Sigma(Y - \bar{Y})^2 = 266$ |

$$62 \text{ نمبرز} = \bar{X} = \frac{\Sigma X}{n} = \frac{370}{6} = 61.67 \approx 62 \text{ نمبرز} = \bar{X} = \frac{\Sigma X}{n}$$

$$62 \text{ نمبرز} = \bar{Y} = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{372}{6} = 62 \text{ نمبرز} = \bar{Y} = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$S.D(X) = \sqrt{\frac{\Sigma(X - \bar{X})^2}{n}} = \sqrt{\frac{2600}{6}} = \sqrt{433.333}$$

$$= 20.82 \text{ نمبرز}$$

$$S.D (Y) = \sqrt{\frac{\sum (Y - \bar{Y})^2}{n}} = \sqrt{\frac{266}{6}} = \sqrt{44.333}$$

$$= 6.66 \text{ نمبرز}$$

**نوٹ:** ہم نے دیکھا کہ گروپ۔ بی کی تبدیلی کی شرح گروپ۔ اے کی تبدیلی کی شرح سے کم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ گروپ۔ بی کے طالبعلموں کے نمبرز اپنے اوسط نمبروں سے قریب تر ہیں نہ کہ گروپ۔ اے کے طالبعلموں کے نمبرز۔

### مشق 6.3

1- انتشار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کریں۔

2- انتشاری پیمانے کی تعریف اور وضاحت کریں۔

3- سعت، معیاری انحراف اور تغیریت کی تعریف لکھیں۔

4- پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپے میں) درج ذیل ہیں:

11500, 12400, 15000, 14500, 14800.

سعت اور معیاری انحراف معلوم کریں۔

5- (الف) معیاری انحراف 'S'، معلوم کریں۔

(i) 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5

(ii) 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18.

(ب) درج ذیل مواد کا تغیریت معلوم کریں۔

10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2

6- بتیس (32) چیزوں کی لمبائی درج ذیل ہے۔ اس تعدوی تقسیم کی اوسط لمبائی اور معیاری انحراف معلوم کریں۔

| لمبائی  | 20-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| تعدادات | 3     | 6     | 12    | 9     | 2     |

7- مندرجہ ذیل مواد جو کہ نمبروں کو ظاہر کر رہا ہے۔ مواد کی مدد سے سعت معلوم کریں۔

| نمبرز   | (طالبعلموں کی تعداد) تعدادات |
|---------|------------------------------|
| 31 — 40 | 28                           |
| 41 — 50 | 31                           |
| 51 — 60 | 12                           |
| 61 — 70 | 9                            |
| 71 — 75 | 5                            |



## متفرق مشق 6

### کثیر الانتخابی سوالات

-1

دیے گئے سوالات کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست کے لیے (✓) لگائیں۔

گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے۔

(i)

(a) مواد (b) تعددی تقسیم (c) تعددی کثیر الاضلاع

کالمی نقشہ مجموعہ ہے متصل

(ii)

(a) مربعوں کا (b) مستطیلوں کا (c) دائروں کا

تعددی کثیر الاضلاع کئی پہلوؤں کی \_\_\_\_\_ ہے۔

(iii)

(a) بند شکل (b) مستطیل (c) دائرہ

مجموعی تعددی جدول کہلاتا ہے۔

(iv)

(a) تعددی تقسیم (b) مواد (c) کم تر مجموعی تعددی تقسیم

مجموعی تعددی کثیر الاضلاع میں تعددات کو \_\_\_\_\_ کے مد مقابل نقشہ پر ظاہر کیا جاتا ہے۔

(v)

(a) درمیانی نقاط (b) بالائی جماعتی حدود (c) جماعتی حدود

حسابی اوسط ایسا پیمانہ ہے جو متغیر مقدار کی قیمت معلوم کرتا ہے متغیر کی تمام قیمتوں کے مجموعہ کو انکی

(vi)

پر تقسیم کر کے:

(a) تعداد (b) جماعت / گروہ (c) مخرج

انحراف کا مطلب ہے کہ کسی متغیر مقدار کی قیمت سے \_\_\_\_\_ کا فرق۔

(vii)

(a) مستقل مقدار (b) کالمی نقشہ (c) مجموعہ

تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے۔

(viii)

(a) گروہی مواد (b) غیر گروہی مواد (c) کالمی نقشہ

کسی متغیر مقدار کا ایک جیسی مدات مثلاً مستقل مقدار  $k$  کے لیے حسابی اوسط ہوتا ہے۔

(ix)

(a) منفی (b) بذات خود  $k$  (c) صفر

حسابی اوسط \_\_\_\_\_ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

(x)

(a) قیمت (b) نسبت (c) منبع / ماخذ

حسابی اوسط \_\_\_\_\_ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

(xi)

(a) جگہ (b) پیمانہ پیمائش (c) مقدار / خرچہ

(xii) کسی متغیر  $X$  کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(a) صفر (b) ایک (c) ایک جیسا

(xiii)  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  مدات کے حاصل ضرب کا  $n^{\text{th}}$  مثبت جذر / رُوٹ کہلاتا ہے۔

(a) عادہ (b) حسابی اوسط (c) اقلیدی اوسط

(xiv)  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  مدات کے معکوس کا معکوسی حسابی اوسط کہلاتا ہے۔

(a) اقلیدی اوسط (b) وسطانیہ (c) ہم آہنگ اوسط

(xv) کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مد کہلاتی ہے۔

(a) عادہ (b) وسطانیہ (c) ہم آہنگ اوسط

(xvi) ایسا پیمانہ جو مواد کی درمیانی مدتائے، کہلاتا ہے۔

(a) وسطانیہ (b) عادہ (c) حسابی اوسط

(xvii) ایسا پیمانہ جو مواد کو چار حصوں میں تقسیم کرے، کہلاتا ہے۔

(a) عشری حصہ (b) چہارمی حصہ (c) فیصدی حصہ

(xviii) کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔

(a) اوسط (b) انتشار (c) مرکزی رجحان

(xix) ایسا پیمانہ جو مواد میں تبدیلی کی شرح کو معلوم کرے \_\_\_\_\_ کا پیمانہ کہلاتا ہے۔

(a) انتشار (b) مرکزی رجحان (c) اوسط

(xx) کسی مواد کی انتہائی مدات کے فرق کو کہتے ہیں۔

(a) اوسط (b) سعت (c) چہارمی حصہ

(xxi)  $x_i$  مدات کے حسابی اوسط سے انحراف کے مربعوں کے حسابی اوسط کو \_\_\_\_\_ کہا جاتا ہے۔

(a) تغیرت (b) معیاری انحراف (c) سعت

(xxii)  $X_i$  مدات کے حسابی سے انحراف کے مربعوں کے حسابی اوسط کے مثبت جذر کو \_\_\_\_\_ کہتے ہیں۔

(a) ہم آہنگ اوسط (b) سعت (c) معیاری انحراف

**2- درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔**

(i) جماعتی حدود کی تعریف کریں۔

(ii) جماعتی نشان کی تعریف کریں۔

(iii) مجموعی تعدد کسے کہتے ہیں؟

(v) کالمی نقشہ کسے کہتے ہیں؟

(vii) حسابی اوسط کی تعریف کریں۔

(viii) حسابی اوسط کی تین خصوصیات تحریر کریں۔

(vi) مرکزی رجحان کے دو پیمانوں کے نام بتائیں۔

(iv) تعددی تقسیم کی تعریف کریں۔



- (ix) وسطانیہ کی تعریف کریں۔  
 (x) عادہ کی تعریف کریں۔  
 (xi) ہم آہنگ اوسط کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کریں۔  
 (xii) اقلیدی اوسط کی تعریف کریں۔  
 (xiii) سعت کی تعریف کریں۔  
 (xiv) معیاری انحراف کی تعریف کریں۔

## خلاصہ

سعت کسی مواد کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی مد کے فرق کو کہتے ہیں۔

کسی جماعت / گروہ کی چھوٹی اور بڑی قیمت اس کی **جماعتی حدود** کہلاتی ہیں۔

بالائی جماعتی حد تک تعدد کے مجموعہ کو **مجموعی تعدد** کہتے ہیں۔

کسی مواد کو مختلف گروہوں میں ترتیب دے کر اندراجی طریقہ (جدول کی صورت) میں لکھنے کو **تعددی تقسیم** کہتے ہیں۔

**کالمی نقشہ** XY-پلین (سطح) پر تیار کردہ متصلہ مستطیلوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔

**مجموعی تعددی کثیر الاضلاع** مجموعی تعددی تقسیم سے کم تر گراف ہے۔

**حسابی اوسط** ایک ایسا عمل / طریقہ / اپیمانہ ہے جو متغیر کی تمام قیمتوں کے مجموعہ کو اُن کی تعداد پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

کسی متغیر مقدار سے مستقل مقدار کے فرق کو **انحراف** کہا جاتا ہے جیسے  $D_i = x_i - A$

**اقلیدی اوسط** سے مراد  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  مدات کے حاصل ضرب کا مثبت جذر ہے۔

**ہم آہنگ اوسط** سے مراد وہ قیمت ہے جو  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  مدات کے معکوس کا معکوسی حسابی اوسط لینے سے حاصل ہوتی ہے۔

**عادہ** سے مراد وہ قیمت جو کسی مواد میں سب سے زیادہ بار آئے۔

**وسطانیہ** ایک ایسا اپیمانہ ہے جو کسی مواد کی درمیانی مد کا تعین کرتا ہے۔

شاریات میں، **انتشار** سے مراد کسی مواد میں موجود مدات کا پھیلاؤ ہے۔

**تغیرت** وہ قیمت ہے جو کسی مواد میں انحرافات کے مربعوں کو جو کہ حسابی اوسط سے لیے گئے ہوں اُن کے مجموعہ کو مدات کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

**معیاری انحراف** تغیرت کا مثبت جذر ہے۔

# تکونیات

## (INTRODUCTION TO TRIGONOMETRY)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

• زاویہ کی ڈگری، منٹ اور سیکنڈ میں پیمائش کرنا۔

• ڈگری منٹس اور سیکنڈز میں دیے گئے زاویہ کو اعشاریہ کی شکل میں تبدیل کرنا۔

• زاویہ کی ریڈین (Radian) میں تعریف کرنا اور ریڈین اور ڈگری کے درمیان تعلق ثابت کرنا۔

• دائرے کے رداس، قوس اور مرکزی زاویہ کا آپس میں تعلق،  $l = r\theta$  قائم کرنا۔

• دائرے کے قطاع (Sector) کا رقبہ  $\frac{1}{2}r^2\theta$  کے برابر ثابت کرنا۔

• مندرجہ ذیل کی تعریف اور ان کی شناخت کرنا۔

• عمومی زاویے (ہم بازو زاویے)

• زاویہ کی معیاری حالت

• ربعوں (Quadrants) اور ربع زاویوں (Quadrantal Angles) کی پہچان کرنا۔

• تکونیاتی نسبتوں (Trigonometric Ratios) اور ان کی معکوس نسبتوں کی اکائی دائرہ کی مدد سے تعریف کرنا۔

• تکونیاتی نسبتوں  $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ$  اور  $60^\circ$  کی قیمتوں کی یاد تازہ کرنا۔

• مختلف ربعوں میں تکونیاتی نسبتوں کی علامتوں کی پہچان کرنا۔

• مختلف ربعوں (Quadrants) میں تکونیاتی نسبتوں کی قیمت معلوم کرنا اگر ایک تکونیاتی نسبت دی ہوئی ہو۔

• تکونیاتی نسبتوں  $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$  اور  $360^\circ$  کی قیمتیں معلوم کرنا۔

• تکونیاتی مماثلتوں (Trigonometric Identities) کو ثابت کرنا اور مختلف تکونیاتی روابط

(Relationship) کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں استعمال کرنا۔

• زاویہ صعود اور زاویہ نزول معلوم کرنا۔


• روزمرہ زندگی میں ایسے سوالات (مسائل) کو حل کرنا جن میں زاویہ صعود اور زاویہ نزول کا استعمال ہوا ہو۔



## 7.1 زاویہ کی پیمائش (Measurement of an Angle)

دو غیر ہم خط شعاعیں جو کہ ہم سر بھی ہوں ایک زاویہ کا تعین کرتی ہیں۔ شعاعیں زاویہ کے بازو کہلاتی ہیں اور نقطہ جس پر شعاعیں آپس میں ملتی ہیں، زاویہ کا راس (Vertex) کہلاتا ہے۔

یہ بہت آسان ہے اگر ہم ایک شعاع کو (ایک نقطہ کے گرد) ایک سمت سے دوسری سمت میں گھما کر زاویہ بنائیں۔ اس طرح زاویہ بنانے سے شعاع کی پہلی سمت زاویہ کا ابتدائی بازو (Initial arm) اور شعاع کی آخری سمت (زاویہ کا) اختتامی بازو کہلاتی ہے۔ اگر شعاع کی گردش گھڑی کی سمت یا گھڑی مخالف سمت ہو تو زاویہ کی پیمائش بھی مثبت یا منفی ہوتی ہے۔




شکل 7.1

### 7.1(ii) زاویہ کی ساٹھ کے اساس کے نظام میں پیمائش

Measurement of an angle in sexagesimal system (degree, minute and second)

درجہ / ڈگری (Degree)

ہم ایک دائرے کے محیط کو 360 برابر قوسوں (Arcs) میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک قوس دائرہ کے مرکز پر جو زاویہ بناتی ہے وہ ایک ڈگری کہلاتا ہے۔ اس کو ہم  $1^\circ$  سے ظاہر کرتے ہیں۔



شکل 7.1.1

$1^\circ$ ,  $1'$  اور  $1''$  بالترتیب ایک ڈگری، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کو ظاہر کرتے ہیں۔

پس 60 سیکنڈ مل کر ایک منٹ ( $1'$ ) بناتے ہیں۔

60 منٹ مل کر ایک درجہ ( $1^\circ$ ) بناتے ہیں۔

90 درجے مل کر ایک قائمہ زاویہ بناتے ہیں۔

360 درجے مل کر چار قائمہ زاویہ بناتے ہیں۔

$360^\circ$  کا زاویہ ایک دائرے یا ایک مکمل چکر کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی زاویہ کو بنانے کے لیے ہم مستوی


(Coordinate Plane) کا استعمال کرتے ہیں، جہاں زاویہ کی ابتدائی شعاع (Initial Ray) مثبت خط  $x$ -محور ( $x$ -axis) پر

ہوگی اور اس کا راس مبدا (Origin) پر ہوگا۔


**مثال:** مندرجہ ذیل زاویوں کو واضح کیجیے۔

- (a)  $-45^\circ$  (b)  $120^\circ$  (c)  $45^\circ$  (d)  $-270^\circ$


**حل:**




(a)



(b)



(c)



(d)

شکل 7.1.2



7.1(iii)  $S^\circ, M', D^\circ$  میں دیے گئے زاویہ کو اعشاریہ کی شکل میں یا اس کے

برعکس لکھنا

تبدیلی کا یہ عمل مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔

مثال 1: (i)  $25^\circ 30'$  کو اعشاریہ ڈگری میں تبدیل کریں۔

(ii)  $32.25^\circ$  کو  $M', D^\circ$  اور  $S^\circ$  کی شکل میں لکھیے۔

حل:

$$(i) \quad 25^\circ 30' = 25^\circ + \left(\frac{30}{60}\right)^\circ = 25^\circ + 0.5^\circ = 25.5^\circ$$

$$(ii) \quad 32.25^\circ = 32^\circ + 0.25^\circ = 32^\circ + \left(\frac{25}{100}\right)^\circ$$

$$= 32^\circ + \frac{1^\circ}{4} = 32^\circ + \left(\frac{1}{4} \times 60\right)' = 32^\circ 15'$$

مثال 2:  $12^\circ 23' 35''$  کو اعشاریہ ڈگری میں تین درجہ اعشاریہ تک لکھیں۔

حل:

$$12^\circ 23' 35'' = 12^\circ + \frac{23^\circ}{60} + \frac{35^\circ}{60 \times 60} = \left(12^\circ + \frac{23^\circ}{60} + \frac{35^\circ}{3600}\right)$$

$$\approx 12^\circ + .3833^\circ + 0.00972^\circ$$

$$\approx 12.3930^\circ = 12.393^\circ$$

مثال 3:  $45.36^\circ$  کو  $M', D^\circ$  اور  $S^\circ$  کی شکل میں لکھیے۔

حل:

$$(45.36)^\circ = 45^\circ + (.36)^\circ = 45^\circ + \left(\frac{36}{100}\right)^\circ = 45^\circ + \left(\frac{9}{25} \times 60'\right)$$

$$= 45^\circ + 21.6' = 45^\circ + 21' + (0.6 \times 60'')$$

$$= 45^\circ 21' 36''$$


7.1(iii) زاویہ کی ریڈین (Radian) میں پیمائش (دائرہ کی نظام)

Radian measure of an angle (circular system)

زاویہ کی پیمائش کا دوسرا نظام، دائرہ کی نظام (Circular System) بہت اہمیت کا حامل ہے اور ریاضی کی دوسری

اعلیٰ برانچوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔

## ریڈین (Radian)



شکل 7.1.3


جب دائرے پر کسی قوس کی لمبائی اسی دائرے کے نصف قطر کے برابر ہو تو دائرے کے مرکز پر بننے والا زاویہ ایک ریڈین کہلاتا ہے۔

نقطہ O کو مرکز مان کر داس کا ایک دائرہ لیں۔ دائرہ پر نقطہ A سے نقطہ P تک قوس کی لمبائی دائرے کے رداس کے برابر لیں۔ نقطہ O کو نقطہ A اور نقطہ P سے ملا دیں۔ اس طرح حاصل ہونے والا زاویہ  $\angle AOP$  ایک ریڈین کہلاتا ہے، اگر

قوس AP کی لمبائی = رداس OA کی لمبائی،

تو ریڈین  $m\angle AOP = 1$

## ڈگری اور ریڈین کے درمیان تعلق (Relationship Between Degree and Radian)



شکل 7.1.4

ہم جانتے ہیں کہ کسی دائرے کا محیط  $2\pi r$  ہوتا ہے جہاں  $r$  دائرے کا رداس ہے۔ چونکہ دائرہ ایک قوس ہے جس کی لمبائی  $2\pi r$  کے برابر ہوتی ہے۔ ایک مکمل دائرے میں زاویہ کی ریڈین میں پیمائش  $2\pi$  ہے۔

اس لیے  $360^\circ = 2\pi$  ریڈین

$$180^\circ = \pi \text{ ریڈین} \quad (i) \quad \text{یا}$$

اس ربط کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈگری کو ریڈین میں اور ریڈین کو ڈگری میں آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔


$$180^\circ = \pi \text{ ریڈین} \Rightarrow 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ ریڈین},$$

$$x^\circ = x \cdot 1^\circ = x \left( \frac{\pi}{180} \right) \text{ ریڈین} \quad (ii)$$

$$1 \text{ ریڈین} = \left( \frac{180}{\pi} \right)^\circ, \quad y \text{ ریڈین} = y \left( \frac{180}{\pi} \right)^\circ \text{ ڈگری} \quad (iii)$$



ڈگری اور ریڈین میں اہم زاویے



شکل 7.1.5

$$180^\circ = 1 (180^\circ) = \pi \text{ ریڈین}$$

$$90^\circ = \frac{1}{2} (180^\circ) = \frac{\pi}{2} \text{ ریڈین}$$

$$60^\circ = \frac{1}{3} (180^\circ) = \frac{\pi}{3} \text{ ریڈین}$$

$$45^\circ = \frac{1}{4} (180^\circ) = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$30^\circ = \frac{1}{6} (180^\circ) = \frac{\pi}{6} \text{ ریڈین}$$

$$270^\circ = \frac{3}{2} (180^\circ) = \frac{3\pi}{2} \text{ ریڈین}$$

**مثال 4:** درج ذیل زاویوں کو ریڈین میں تبدیل کریں۔

(a)  $15^\circ$  (b)  $124^\circ 22'$

**حل:**

(a)  $15^\circ = 15 \left( \frac{\pi}{180} \text{ ریڈین} \right)$   
 $= \frac{\pi}{12} \text{ ریڈین}$

مساوات (i) کو استعمال کرنے سے

(b)  $124^\circ 22' = \left( 124 + \frac{22}{60} \right)^\circ \approx (124.3666) \left( \frac{\pi}{180} \right) \text{ ریڈین}$   
 $\approx 2.171 \text{ ریڈین}$

**مثال 5:** درج ذیل کو ڈگری میں ظاہر کریں۔

(a)  $\frac{2\pi}{3} \text{ ریڈین}$  (b)  $6.1 \text{ ریڈین}$

**حل:**

(a)  $\frac{2\pi}{3} \text{ ریڈین} = \frac{2\pi}{3} \left( \frac{180}{\pi} \right) \text{ ڈگری}$   
 $= 120^\circ$

(b)  $6.1 \text{ ریڈین} = (6.1) \left( \frac{180}{\pi} \right) \text{ ڈگری} = 6.1 (57.295779) = 349.5043 \text{ ڈگری}$

یاد رکھیے:

$$1 \text{ ریڈین} \approx \left( \frac{180}{3.1416} \right)^\circ \approx 57.295795^\circ \approx 57^\circ 17' 45'', \quad 1^\circ \approx \frac{3.1416}{180} \approx 0.0175 \text{ ریڈین}$$

## مشق نمبر 7.1

1- مندرجہ ذیل زاویوں کو  $xy$  - مستوی میں ظاہر کریں۔

- (i)  $30^\circ$  (ii)  $22\frac{1}{2}^\circ$  (iii)  $135^\circ$  (iv)  $225^\circ$   
 (v)  $-60^\circ$  (vi)  $-120^\circ$  (vii)  $-150^\circ$  (viii)  $-225^\circ$

2- ساٹھ کے اساس میں دیے گئے درج ذیل زاویوں کو اعشاریہ کی شکل میں لکھیے۔

- (i)  $45^\circ 30'$  (ii)  $60^\circ 30' 30''$  (iii)  $125^\circ 22' 50''$

3- مندرجہ ذیل کو  $M'$ ،  $D^\circ$  اور  $S''$  میں لکھیے۔

- (i)  $47.36^\circ$  (ii)  $125.45^\circ$  (iii)  $225.75^\circ$  (iv)  $-22.5^\circ$   
 (v)  $-67.58^\circ$  (vi)  $315.18^\circ$

4- مندرجہ ذیل زاویوں کو ریڈین میں لکھیے۔

- (i)  $30^\circ$  (ii)  $(60)^\circ$  (iii)  $135^\circ$  (iv)  $225^\circ$  (v)  $-150^\circ$   
 (vi)  $-225^\circ$  (vii)  $300^\circ$  (viii)  $315^\circ$

5- مندرجہ ذیل کو ڈگری میں تبدیل کریں۔



- (i)  $\frac{3\pi}{4}$  (ii)  $\frac{5\pi}{6}$  (iii)  $\frac{7\pi}{8}$  (iv)  $\frac{13\pi}{16}$  (v) 3  
 (vi) 4.5 (vii)  $-\frac{7\pi}{8}$  (viii)  $-\frac{13}{16}\pi$

## 7.2 قطاع دائرہ (Sector of a Circle)

(i) کسی دائرے کے محیط کا حصہ، قوس (Arc) کہلاتا ہے۔


(ii) دائرے کے وتر اور قوس کا درمیانی حصہ، قطعہ دائرہ (Segment of a circle) کہلاتا ہے۔

(iii) دو رداسوں اور ایک قوس (arc) کے درمیانی حصے کو قطاع دائرہ (Sector of a circle) کہتے ہیں۔






7.2(ii) اگر کسی دائرے کا رداس  $r$ ، قوس کی لمبائی  $l$  اور قوس کا زاویہ  $\theta$  ہو جو کہ وہ مرکز پر بنتی ہے تو ثابت کیجیے کہ  $l = r\theta$  جبکہ  $\theta$  کی پیمائش ریڈین میں ہے۔



فرض کریں کہ قوس  $AB = l$  دائرہ کے مرکز پر زاویہ  $\theta$  ریڈین بنتی ہے۔ مستوی جیومیٹری کی رو سے مختلف قوسوں سے بننے والے زاویے ان قوسوں کی لمبائی کے متناسب ہوتے ہیں۔

$$\frac{m\angle AOB}{m\angle AOC} = \frac{m\widehat{AB}}{m\widehat{AC}}$$



شکل 7.2.1

$$\Rightarrow \frac{\theta \text{ ریڈین}}{1 \text{ ریڈین}} = \frac{l}{r} \Rightarrow \frac{l}{r} = \theta \quad \text{or} \quad \boxed{l = r\theta}$$

**مثال 1:** ایک دائرے کا رداس 10 میٹر ہو تو

- (a) دائرے کے مرکز پر 1.6 ریڈین کا زاویہ دائرے پر کتنی لمبائی کے برابر قوس بنائے گا؟  
 (b) 60 ڈگری کا زاویہ دائرے کے محیط پر کس لمبائی کی قوس بنائے گا؟

**حل:**

(a)  $\theta = 1.6$  ریڈین،  $r = 10$  میٹر اور  $l = ?$

$$l = r\theta \Rightarrow l = 10 \times 1.6 = 16 \text{ میٹر}$$

(b)  $\theta = 60^\circ = 60 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$  ریڈین

$$l = r\theta = 10 \times \frac{\pi}{3} = \frac{10\pi}{3} \text{ میٹر}$$

**مثال 2:** ایک سائیکل سوار ایک دائرے کے گرد جس کا رداس 15 میٹر ہے، 3.5 چکر لگاتا ہے۔ بتائیے اس نے کتنا سفر طے کیا؟

**حل:**

ہم جانتے ہیں کہ


ایک مکمل چکر میں زاویہ کی مقدار  $2\pi$  ریڈین

$$3.5 = 2\pi \times 3.5$$

$$\text{کل طے کردہ فاصلہ} = l = r\theta = 15 \times 2\pi \times 3.5 \\ = 105\pi \text{ میٹر}$$

## (ii) 7.2 قطاع دائرہ کارقبہ (Area of Circular Sector)

رداس ۳ کا ایک دائرہ لیں اور ایونٹ کے برابر ایک قوس لگائیں جو کہ دائرہ کے مرکز 'O' پر زاویہ  $\theta$  بناتی ہو۔



شکل 7.2.2

$$\pi r^2 = \text{دائرے کا رقبہ}$$

$$2\pi = \text{دائرے کا زاویہ}$$

$$\text{قطاع دائرے کا زاویہ} = \theta \text{ ریڈین}$$

بنیادی جیومیٹری کے اصول کے مطابق درج ذیل تناسب کا کلیہ استعمال کر سکتے ہیں۔

$$\frac{\text{قطاع دائرے AOBP کا رقبہ}}{\text{دائرے کا زاویہ}} = \frac{\text{قطاع دائرے کا رقبہ}}{\text{دائرے کا زاویہ}}$$

$$\frac{\theta}{2\pi} = \frac{\text{قطاع دائرے AOBP کا رقبہ}}{\pi r^2}$$

$$\pi r^2 \times \frac{\theta}{2\pi} = \text{قطاع دائرے AOBP کا رقبہ}$$

$$\boxed{\text{قطاع دائرے کا رقبہ} = \frac{1}{2} r^2 \theta}$$

پس


**مثال 3:** ایک قطاع دائرے کا رقبہ معلوم کریں جس کا رداس 16 سم اور مرکز پر زاویہ  $60^\circ$  ہے۔

**حل:** رداس = 16 سم، زاویہ  $\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$  ریڈین

$$\text{قطاع دائرے کا رقبہ} = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

$$= \frac{1}{2} (16)^2 \left( \frac{\pi}{3} \right)$$

$$= \frac{1}{2} (256) \times \left( \frac{22}{7 \times 3} \right) = 134.1 \text{ cm}^2$$





## مشق نمبر 7.2

1-  $\theta$  معلوم کیجیے جبکہ:

(i)  $l = 2$  سم ,  $r = 3.5$  سم

(ii)  $l = 4.5$  میٹر ,  $r = 2.5$  میٹر

2-  $l$  معلوم کیجیے جبکہ:

(i)  $\theta = 180^\circ$  ,  $r = 4.9$  سم

(ii)  $\theta = 60^\circ 30'$  ,  $r = 15$  ملی میٹر

3-  $r$  معلوم کیجیے جبکہ:

(i)  $l = 4$  سم ,  $\theta = \frac{1}{4}$  ریڈین


(ii)  $l = 52$  سم ,  $\theta = 45^\circ$

4- قوس کی لمبائی معلوم کریں جو دائرہ کے مرکز پر  $1.5$  ریڈین کا زاویہ بناتی ہے جبکہ دائرے کا رداس  $12$  میٹر ہے۔

5- ایک نقطہ دائرے کے گرد  $3.5$  چکر لگا کر کتنا فاصلہ طے کرے گا جبکہ دائرے کا رداس  $10$  میٹر ہے؟

( $3.5\pi = 7\pi$ )



6-  $3$  بجے گھڑی کی سوئیوں کے درمیان دائروی پیمائش میں زاویہ کتنا ہوتا ہے؟



7- قوس  $APB$  کی لمبائی کتنی ہے؟

8- دائرہ جس کا رداس  $12$  سم ہے، قوس، دائرہ کے مرکز پر  $84^\circ$  کا زاویہ بناتی ہے۔ قوس کی لمبائی کیا ہوگی؟


9- قطاع دائرے  $OPR$  کا رقبہ معلوم کریں۔



10- قطاع دائرے کا رداس  $7$  میٹر اور زاویہ  $20^\circ$  ہو تو اس کا رقبہ معلوم کیجیے۔

11- سحر ایک سکرٹ بنا رہی ہے۔ سکرٹ کے گھیرے کی ساخت تصویر میں دکھائی گئی ہے۔ ایک گھیرے کے لیے کتنا

کپڑا درکار ہے؟



12- قطاع دائرے کا رقبہ معلوم کیجیے جبکہ اس کا رداس 10 سم اور زاویہ  $\frac{\pi}{5}$  ریڈین ہے۔


13- ایک قطاع دائرہ کا رقبہ 10 مربع میٹر اور رداس 2 میٹر ہے۔ قطاع دائرے کا زاویہ کتنے ریڈین ہوگا؟

### 7.3 تگونیاتی نسبتیں (Trigonometric Ratios)

#### 7.3(i-a) عمومی زاویے (ہم بازو زاویے) General Angle (Coterminal angle)

زاویہ کو ہم ایک خمدار تیر کے نشان سے ظاہر کرتے ہیں جو زاویہ کی گردش کے ابتدائی بازو سے اختتامی بازو کی طرف سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ زاویے ایک ہی ابتدائی بازو سے شروع ہو کر ایک ہی اختتامی بازو کے متحمل ہو سکتے ہیں۔

ہم زاویہ  $\angle AOB$  کو ابتدائی بازو  $OA$ ، اختتامی بازو  $OB$  اور اس  $O$  کے ساتھ زیر بحث لاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ریڈین  $m \angle AOB = \theta$  جبکہ  $0 \leq \theta \leq 2\pi$



اگر اختتامی بازو ایک، دو یا دو سے زیادہ دفعہ چکر مکمل کرنے کے بعد اپنی ابتدائی حالت میں واپس آ جاتا ہے تو زاویہ کی پیمائش اس طرح ہوگی۔

- |       |                         |                 |
|-------|-------------------------|-----------------|
| (i)   | ریڈین $\theta$          | صفر چکر کے بعد  |
| (ii)  | ریڈین $(2\pi + \theta)$ | ایک چکر کے بعد  |
| (iii) | ریڈین $(4\pi + \theta)$ | دو چکروں کے بعد |

#### کوٹرمینل زاویے (ہم بازو زاویے) (Coterminal Angles)

دو یا دو سے زیادہ زاویے جن کے ابتدائی بازو اور اختتامی بازو ایک جیسے ہوں، کوٹرمینل زاویے کہلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختتامی بازو ہر گردش پر (گھڑی کی سمت یا گھڑی کی مخالف سمت میں)  $2\pi$  ریڈین زاویہ مکمل



کر کے اپنی ابتدائی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔

اگر  $\theta$  ڈگری میں ہو تو  $(360^\circ k + \theta)$  زاویہ  $\theta$  کے ساتھ کوٹرینٹل (ہم بازو) ہو گا جبکہ  $k \in \mathbb{Z}$

اگر  $\theta$  ریڈین میں ہو تو  $2k\pi + \theta$  زاویہ  $\theta$  کے ساتھ کوٹرینٹل ہو گا جبکہ  $k \in \mathbb{Z}$

پس  $2(k)\pi + \theta =$  عمومی زاویہ  $\theta$  جبکہ  $k \in \mathbb{Z}$

**مثال:** مندرجہ ذیل میں سے کون سے زاویے  $120^\circ$  کے ساتھ ہم بازو کوٹرینٹل ہیں؟

$$-\frac{14\pi}{3}, \frac{14\pi}{3}, 480^\circ, -240^\circ$$

**حل:**  $-240^\circ$  زاویہ  $120^\circ$  کے ساتھ ہم بازو ہے کیونکہ ان کا اختتامی بازو ایک ہی ہے۔

$480^\circ = 360^\circ + 120^\circ$  زاویہ  $480^\circ$  ایک مکمل گردش (چکر) کے بعد  $120^\circ$  پر اختتام پذیر ہوتا ہے لہذا  $120^\circ$  کے ساتھ ہم بازو ہے۔

$$\frac{14}{3}\pi \equiv 4\pi + \frac{2\pi}{3} = 720^\circ + 120^\circ$$


پس زاویہ  $\frac{14\pi}{3}$ ،  $120^\circ$  کے ساتھ ہم بازو ہے۔

$$-\frac{14\pi}{3} = -4\pi + \frac{-2\pi}{3} = -720^\circ - 120^\circ$$

پس،  $-\frac{14\pi}{3}$  زاویہ  $120^\circ$  کے ساتھ ہم بازو نہیں ہے۔

### 7.3(i-b) معیاری صورت میں زاویہ (Angle in Standard Position)

اگر عمومی زاویے کا راس (Vertex) مبدا (Origin) پر ہو اور ابتدائی بازو مستوی میں  $x$ -محور کی مثبت سمت میں ہو تو ایسا زاویہ معیاری صورت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ معیاری صورت میں تمام زاویوں کا ابتدائی بازو ایک ہی ہوتا ہے لہذا اختتامی بازو کی حالت / صورت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اگر معیاری صورت میں کسی زاویے کو  $2\pi$  کے ضعف (Multiple) سے کم یا زیادہ کیا جائے تو زاویے کا اختتامی بازو تبدیل نہیں ہوتا۔ کچھ عمومی زاویے جن کا اختتامی بازو تبدیل نہیں ہوتا نیچے تصویر میں دیے گئے ہیں۔



شکل 7.3.1 (a)


**مثال:** درج ذیل زاویوں کو معیاری صورت میں ظاہر کریں۔

(i)  $240^\circ$


(ii)  $490^\circ$

(iii)  $-270^\circ$


**حل:** زاویے شکل 7.3.1(b) میں دکھائے گئے ہیں۔



(i)



(ii)




(iii)

شکل 7.3.1 (b)

### 7.3(ii) ربع اور ربع زاویے (The Quadrants and Quadrantal Angles)

جب  $x$ -محور اور  $y$ -محور ایک دوسرے کو  $90^\circ$  کے زاویے پر کاٹیں تو یہ مستوی کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کو ربع کہتے ہیں۔  $x$ -محور اور  $y$ -محور جہاں ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں وہ نقطہ مبدا (Origin) کہلاتا ہے اور اسے  $O$  سے ظاہر کرتے ہیں۔



$0^\circ$  سے  $90^\circ$  تک زاویے پہلے ربع میں ہوتے ہیں۔

$90^\circ$  سے  $180^\circ$  تک کے زاویے دوسرے ربع میں ہوتے ہیں۔





$180^\circ$  سے  $270^\circ$  تک زاویے تیسرے ربع میں ہوتے ہیں۔

$270^\circ$  سے  $360^\circ$  تک کے زاویے چوتھے ربع میں ہوتے ہیں۔

معیاری صورت میں زاویہ اس ربع میں واقع ہوگا اگر اس کا اختتامی بازو اسی ربع میں واقع ہو۔ شکل 7.3.1 (a) میں  $\alpha, \beta, \gamma$  اور  $\theta$  زاویے بالترتیب پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے ربع میں واقع ہیں۔

### ربع زاویے (Quadrantal Angles)

اگر زاویے کا اختتامی بازو  $x$ -محور یا  $y$ -محور پر ہو تو اس طرح بننے والا زاویہ ربع زاویہ کہلاتا ہے لہذا  $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$  اور  $360^\circ$  کے زاویے ربع زاویے کہلاتے ہیں۔ ربع زاویے نیچے تصویر میں ظاہر کیے گئے ہیں۔



شکل 7.3.2



### (iii) 7.3 اکائی دائرہ کی مدد سے ٹکونیاتی نسبتیں اور ان کے معکوس


#### (Trigonometric ratios and their reciprocals with the help of a unit circle)

بنیادی طور پر چھ ٹکونیاتی نسبتیں ہیں جن کو sine, cosine, tangent, cotangent, secant اور cosecant کہتے ہیں۔ ان نسبتوں کو بیان کرنے کے لیے دائروی طریقہ استعمال کرتے ہیں جو کہ اکائی دائرے پر مشتمل ہے۔

فرض کریں کہ ہم زاویہ کی معیاری صورت کو حقیقی عدد  $\theta$  ریڈین سے ظاہر کرتے ہیں۔

فرض کریں کہ کسی زاویہ  $\theta$  کے اختتامی بازو پر نقطہ  $P(x, y)$  واقع ہے

جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 7.3.3

ہم  $\sin \theta$  کو sine  $\theta$  اور  $\cos \theta$  کو cosine  $\theta$  لکھتے ہیں اور ان کی

تعریف یوں لکھتے ہیں:

$$\sin \theta = \frac{EP}{OP} = \frac{y}{1} \Rightarrow \sin \theta = y$$

$$\cos \theta = \frac{OE}{OP} = \frac{x}{1} \Rightarrow \cos \theta = x \quad \text{اور}$$

$\sin \theta$  اور  $\cos \theta$  اکائی دائرے پر کسی نقطہ  $P(x, y)$  کے  $x$ -محدود اور  $y$ -محدود کہلاتے ہیں۔ مساوات  $x = \cos \theta$

اور  $y = \sin \theta$  کو دائروی یا ٹکونیاتی تفاعل کہتے ہیں جبکہ باقی ٹکونیاتی تفاعل Secant, Cotangent, Tangent اور

Cosecant کو،  $\tan \theta$ ,  $\cot \theta$ ,  $\sec \theta$  اور  $\csc \theta$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$\tan \theta = \frac{EP}{OE} = \frac{y}{x} \Rightarrow \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$


$$y = \sin \theta \quad \text{اور} \quad x = \cos \theta \Rightarrow \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0) \Rightarrow \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad (x \neq 0) \quad \text{اور} \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad (y \neq 0)$$

$$= \frac{1}{\cos \theta} \quad = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta} \quad \text{یا} \quad \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} \\ \cos \theta &= \frac{1}{\sec \theta} \quad \text{یا} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \\ \tan \theta &= \frac{1}{\cot \theta} \quad \text{یا} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} \end{aligned}$$



$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad ; \quad r = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5$$


$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{4}{5} \quad ; \quad \operatorname{cosec} \theta = \frac{5}{4}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{3}{5} \quad ; \quad \sec \theta = \frac{5}{3}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{4}{3} \quad ; \quad \cot \theta = \frac{3}{4}$$

### 7.3(iv) تکوینیاتی نسبتوں کی $30^\circ$ ، $45^\circ$ اور $60^\circ$ کے زاویوں پر قیمتیں:

ایک قائمہ الزاویہ مثلث ABC لیں جس کا زاویہ  $m\angle C = 90^\circ$  کا ہو۔ مثلث کے راسوں A، B اور C کے بالقابل اضلاع کو بالترتیب  $a$ ،  $b$  اور  $c$  سے ظاہر کیا گیا ہے۔



(i)  $45^\circ$  کے زاویے کی تکوینیاتی نسبتیں:

جب  $m\angle A = 45^\circ$  جبکہ  $\frac{\pi}{4} = 45^\circ$  ریڈین، چونکہ کسی مثلث میں تمام زاویوں کا مجموعہ  $= 180^\circ$  اس لیے  $m\angle B = 45^\circ$

تکوینیاتی نسبتوں کی قیمت کا انحصار زاویہ کی مقدار پر ہے نہ کہ مثلث کی جسامت پر۔ آسانی کے لیے ہم  $a = b = 1$  لیتے ہیں۔ اس طرح بننے والی مثلث مساوی الساقین مثلث ہوگی۔



مسئلہ فیثاغورث کے مطابق

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = (1)^2 + (1)^2 = 2$$

$$c^2 = 2 \Rightarrow c = \sqrt{2}$$

دی گئی مثلث کے مطابق



$$\sin 45^\circ = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{a}{c} = \frac{1}{\sqrt{2}} ; \quad \operatorname{cosec} 45^\circ = \frac{1}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2}$$

$$\cos 45^\circ = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{b}{c} = \frac{1}{\sqrt{2}} ; \quad \sec 45^\circ = \frac{1}{\cos 45^\circ} = \sqrt{2}$$

$$\tan 45^\circ = \tan \frac{\pi}{4} = \frac{a}{b} = \frac{1}{1} = 1 ; \quad \cot 45^\circ = \frac{1}{\tan 45^\circ} = 1$$

(ii) جب  $m\angle A = 60^\circ$  یا  $m\angle A = 30^\circ$  ہو۔

ایک مساوی الاضلاع مثلث بنائیں جس میں آسانی کے لیے  $a = b = c = 2$  لیں۔ چونکہ مساوی الاضلاع مثلث میں تمام زاویوں کی مقدار برابر ہوتی ہے اور ان کا مجموعہ  $180^\circ$  ہوتا ہے۔ ہر زاویہ  $60^\circ$  کا ہوتا ہے۔ اس مثلث کے  $\angle A$  کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن مثلث کو دو قائمہ الزاویہ مثلثوں میں تبدیل کرتی ہے جس میں باقی دو زاویے  $30^\circ$  اور  $60^\circ$  کے برابر ہوں گے۔ مثلث کی بلندی  $AD$  مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے معلوم کی جاسکتی ہے۔



### شکل 7.3.6

$$(AD)^2 + (BD)^2 = (AB)^2 \Rightarrow (AD)^2 = (AB)^2 - (BD)^2$$

$$\Rightarrow h^2 = (2)^2 - (1)^2 = 3$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{3}$$

مثلث ADB کے مطابق جبکہ  $m\angle A = 30^\circ$  ہو۔

$$\sin 30^\circ = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{BD}{AB} = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{cosec} 30^\circ = \frac{1}{\sin 30^\circ} = 2$$

$$\cos 30^\circ = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{AD}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sec 30^\circ = \frac{1}{\cos 30^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\tan 30^\circ = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cot 30^\circ = \frac{1}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}$$

مثلث ABD کے مطابق جبکہ  $m\angle B = 60^\circ$ ۔

$$\sin 60^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{1}{\sin 60^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{1}{2}$$

$$\sec 60^\circ = \frac{1}{\cos 60^\circ} = 2$$

$$\tan 60^\circ = \frac{AD}{BD} = \frac{\sqrt{3}}{1}$$

$$\cot 60^\circ = \frac{1}{\tan 60^\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

### 7.3(v) مختلف ربعوں میں ٹکونیاتی نسبتوں کی علامات:

ٹکونیاتی نسبتوں  $\sin \theta$ ,  $\cos \theta$  اور  $\tan \theta$  میں اگر  $\theta$  ربع زاویہ نہ ہو تو کسی ایک خاص ربع میں ہو گا۔ چونکہ  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  ہمیشہ مثبت عدد ہوتا ہے اور اگر  $\theta$  کا ربع معلوم ہو تو ہم کسی بھی ٹکونیاتی نسبت کی علامت معلوم کر سکتے ہیں۔

(i) اگر  $\theta$  پہلے ربع میں ہو اور نقطہ  $P(x, y)$  زاویہ  $\theta$  کے اختتامی بازو پر واقع ہو تو  $x$ -اور  $y$ -محد دونوں مثبت ہوں گے۔ لہذا پہلے ربع میں تمام ٹکونیاتی نسبتیں مثبت ہوں گی۔

(ii) اگر  $\theta$  دوسرے ربع میں ہو تو نقطہ  $P(x, y)$  میں  $x$ -محد منفی اور  $y$ -محد مثبت ہو گا۔

اس لیے  $\cos \theta = \frac{x}{r} < 0$  یا منفی ہے  $\sin \theta = \frac{y}{r} > 0$  یا مثبت ہے

اور  $\tan \theta = \frac{y}{x} < 0$  یا منفی ہے

(iii) جب  $\theta$  تیسرے ربع میں ہو تو نقطہ  $P(x, y)$  کے  $x$ -محد اور  $y$ -محد منفی ہوں گے۔

اس لیے  $\cos \theta = \frac{x}{r} < 0$  یا منفی ہے  $\sin \theta = \frac{y}{r} < 0$  یا منفی ہے

اور  $\tan \theta = \frac{y}{x} > 0$  یا مثبت ہے

(iv) جب  $\theta$  چوتھے ربع میں ہو تو نقطہ  $P(x, y)$  کا  $x$ -محد مثبت اور  $y$ -محد منفی ہو گا۔

اس لیے  $\cos \theta = \frac{x}{r} > 0$  یا مثبت ہے  $\sin \theta = \frac{y}{r} < 0$  یا منفی ہے

اور  $\tan \theta = \frac{y}{x} < 0$  یا منفی ہے



تکوینیاتی نسبتوں کی علامات کا خلاصہ نیچے دیا گیا ہے۔

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| $\sin \theta > 0$                 | $\sin \theta > 0$                 |
| $\operatorname{cosec} \theta > 0$ | $\operatorname{cosec} \theta > 0$ |
| $\cos \theta < 0$                 | $\cos \theta > 0$                 |
| $\sec \theta < 0$                 | $\sec \theta > 0$                 |
| $\tan \theta < 0$                 | $\tan \theta > 0$                 |
| $\cot \theta < 0$                 | $\cot \theta > 0$                 |
| $\tan \theta > 0$                 | $\cos \theta > 0$                 |
| $\cot \theta > 0$                 | $\sec \theta > 0$                 |
| $\sin \theta < 0$                 | $\sin \theta < 0$                 |
| $\operatorname{cosec} \theta < 0$ | $\operatorname{cosec} \theta < 0$ |
| $\cos \theta < 0$                 | $\tan \theta < 0$                 |
| $\sec \theta < 0$                 | $\cot \theta < 0$                 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| sine<br>S    | all<br>A    |
| tangent<br>T | cosine<br>C |

7.3(vi) تکوینیاتی نسبتوں کی قیمتیں معلوم کرنا جبکہ ایک تکوینیاتی نسبت دی ہوئی ہو:

تکوینیاتی نسبتوں کی قیمت معلوم کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت مندرجہ ذیل مثالوں کے ذریعے کی گئی ہے۔

**مثال 1:** اگر  $\sin \theta = \frac{-3}{4}$  اور  $\cos \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$  ہو تو  $\tan \theta$ ,  $\cot \theta$ ,  $\sec \theta$  اور  $\operatorname{cosec} \theta$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

**حل :** ہم دو مماثلات (Identities) استعمال کرتے ہیں جو باقی تکوینیاتی تقاضے کو sine اور cosine میں ظاہر کرتے ہیں۔

$$\therefore \sin \theta = \frac{-3}{4} \quad \therefore \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{1}{\frac{-3}{4}} = \frac{-4}{3} \Rightarrow \operatorname{cosec} \theta = \frac{-4}{3}$$


$$\therefore \cos \theta = \frac{\sqrt{7}}{4} \quad \therefore \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{4}} \Rightarrow \sec \theta = \frac{4}{\sqrt{7}}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{-3}{4}}{\frac{\sqrt{7}}{4}} = \frac{-3}{\sqrt{7}} \Rightarrow \tan \theta = \frac{-3}{\sqrt{7}} \quad \text{اب}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\frac{-3}{\sqrt{7}}} = -\frac{\sqrt{7}}{3} \quad \text{اور}$$

**مثال 2:** اگر  $\tan \theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$  ہو تو باقی تکوینیاتی نسبتوں کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

**حل:** قائمہ الزاویہ مثلث ABC میں



$$\tan \theta = \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{a}{b} \Rightarrow a = \sqrt{5}, b = 2$$

مسئلہ فیثاغورث کی روست

$$a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow (\sqrt{5})^2 + (2)^2 = c^2$$

$$c^2 = 5 + 4 = 9 \Rightarrow c = \pm 3 \text{ یا } c = 3$$

$$\therefore \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}, \quad \cot \theta = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{2}} \Rightarrow \cot \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\sin \theta = \frac{a}{c} = \frac{\sqrt{5}}{3}, \quad \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} \Rightarrow \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{3}} \therefore \operatorname{cosec} \theta = \frac{3}{\sqrt{5}}$$

$$\cos \theta = \frac{b}{c} = \frac{2}{3}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \Rightarrow \sec \theta = \frac{1}{\frac{2}{3}} \therefore \sec \theta = \frac{3}{2}$$

**7.3(vii)  $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$  اور  $360^\circ$  کی تکوینیاتی نسبتوں کی قیمتیں معلوم کرنا:**

آرٹیکل 7.3(ii) میں ہم ربع زاویوں کو زیر بحث لائے تھے۔ اگر زاویہ  $\theta$  کا اختتامی بازو  $x$ -محور یا  $y$ -محور پر ہو تو  $\theta$  ربع زاویہ کہلاتا ہے۔

**(i) جب  $\theta = 0^\circ$**

ایک نقطہ  $P(1, 0)$  زاویہ  $0^\circ$  کے اختتامی بازو پر ہے، ہم ایک اکائی دائرہ بنا سکتے ہیں جس میں زاویہ  $0^\circ$  کے اختتامی


بازو پر نقطہ  $P(1, 0)$  ہو۔

$$P(1, 0) \Rightarrow x = 1 \text{ اور } y = 0 \quad \text{پس} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1 + 0} = 1$$

$$\therefore \sin 0^\circ = \frac{y}{r} = \frac{0}{1} = 0, \quad \operatorname{cosec} 0^\circ = \frac{1}{\sin 0^\circ} = \frac{1}{0} = \infty \quad (\text{نا قابل تعریف})$$

$$\cos 0^\circ = \frac{x}{r} = \frac{1}{1} = 1, \quad \sec 0^\circ = \frac{1}{\cos 0^\circ} = 1$$

$$\tan 0^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{1} = 0, \quad \cot 0^\circ = \frac{1}{\tan 0^\circ} = \frac{1}{0} = \infty \quad (\text{نا قابل تعریف})$$





## (ii) جب $\theta = 90^\circ$

اس صورت میں نقطہ  $P(0, 1)$  زاویہ  $90^\circ$  کے اختتامی بازو پر ہوتا ہے۔

$$x = 0 \text{ اور } y = 1 \Rightarrow r = \sqrt{0^2 + (1)^2} = 1$$

$$\sin 90^\circ = \frac{y}{r} = \frac{1}{1} = 1 \quad \text{اس لیے}$$


$$\sin 90^\circ = 1 \text{ اور } \operatorname{cosec} 90^\circ = \frac{r}{y} = 1 \quad \text{یہ کہ}$$

معکوس مماثلات کی رو سے

$$\cos 90^\circ = \frac{x}{r} = \frac{0}{1} = 0, \quad \sec 90^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{0} = \infty \quad (\text{نا قابل تعریف})$$

$$\tan 90^\circ = \frac{y}{x} = \frac{1}{0} = \infty \quad (\text{نا قابل تعریف}), \quad \cot 90^\circ = \frac{x}{y} = \frac{0}{1} = 0$$

## (iii) جب $\theta = 180^\circ$



نقطہ  $P(-1, 0)$  زاویہ  $180^\circ$  کے اختتامی بازو  $-x$  محور

پر ہوتا ہے جب کہ  $y = 0$  اور  $x = -1$


$$\Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2} = 1$$

$$\therefore \sin 180^\circ = \frac{y}{r} = \frac{0}{1} = 0; \quad \operatorname{cosec} 180^\circ = \frac{r}{y} = \frac{1}{0} = \infty \quad (\text{نا قابل تعریف})$$

$$\cos 180^\circ = \frac{x}{r} = \frac{-1}{1} = -1; \quad \sec 180^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\tan 180^\circ = \frac{y}{x} = \frac{0}{-1} = 0; \quad \cot 180^\circ = \frac{x}{y} = \frac{-1}{0} = \infty \quad (\text{نا قابل تعریف})$$

## (iv) جب $\theta = 270^\circ$ اور نقطہ $P(0, -1)$ محور پر ہوا زاویہ $270^\circ$ کے اختتامی بازو پر ہو۔



جب کہ  $x = 0$  اور  $y = -1$

$$r = \sqrt{(0)^2 + (-1)^2} = 1 \quad \text{اس طرح}$$

$$\therefore \sin 270^\circ = \frac{y}{r} = \frac{-1}{1} = -1; \quad \operatorname{cosec} 270^\circ = \frac{r}{y} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\cos 270^\circ = \frac{x}{r} = \frac{0}{1} = 0; \quad \sec 270^\circ = \frac{r}{x} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$\tan 270^\circ = \frac{y}{x} = \frac{-1}{0} = -\infty; \quad \cot 270^\circ = \frac{x}{y} = \frac{0}{-1} = 0$$

(iv) جب  $\theta = 360^\circ$  تو نقطہ  $P(1, 0)$  ایک دفعہ پھر  $x$ -محور پر ہوگا۔

اب

$$\sin 360^\circ = \sin 0^\circ = 0 \quad ; \quad \operatorname{cosec} 360^\circ = \frac{1}{\sin 360^\circ} = \frac{1}{\sin 0^\circ} = \frac{1}{0} = \infty \quad (\text{نا قابل تعریف})$$

$$= \sin (360^\circ + 0^\circ)$$


$$\cos 360^\circ = \cos 0^\circ = 1 \quad ; \quad \sec 360^\circ = \frac{1}{\cos 0^\circ} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\tan 360^\circ = \tan 0^\circ = 0 \quad ; \quad \cot 360^\circ = \frac{1}{\tan 0^\circ} = \frac{1}{0} = \infty \quad (\text{نا قابل تعریف})$$

**مثال:** جدول یا کیکولیٹر استعمال کیے بغیر درج ذیل کی قیمت معلوم کیجیے۔

- (i)  $\cos 540^\circ$  (ii)  $\sin 315^\circ$  (iii)  $\sec (-300^\circ)$

**حل:**



$$(i) \quad 540^\circ = (360^\circ + 180^\circ) = 2(1)\pi + 180^\circ$$

$$\cos 540^\circ = \cos(2\pi + \pi) = \cos \pi = -1$$

$$(ii) \quad \sec 315^\circ = \sin (360^\circ - 45^\circ) = \sin \left( 2\pi - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= \sin \left( \frac{-\pi}{4} \right) = -\sin \frac{\pi}{4} = \frac{-1}{\sqrt{2}}$$

$$(iii) \quad \sec (-300^\circ) = \sec (-360^\circ + 60^\circ)$$

$$= \sec (2(-1)\pi + 60^\circ)$$

$$= \sec 60^\circ = \frac{1}{\cos 60^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

## مشق 7.3

1- مندرجہ ذیل زاویوں کو پروٹریکٹر (زاویہ پیم) یا فری ہینڈ طریقہ کی مدد سے معیاری حالت میں ظاہر کریں۔ نیز ہر زاویے کا مثبت اور منفی ہم باز زاویہ بھی معلوم کریں۔

- (i)  $170^\circ$  (ii)  $780^\circ$  (iii)  $-100^\circ$  (iv)  $-500^\circ$

2- قریب ترین ربع زاویوں کی شناخت کریں جن کے درمیان مندرجہ ذیل زاویے ہوں۔

- (i)  $156^\circ$  (ii)  $318^\circ$  (iii)  $572^\circ$  (iv)  $-330^\circ$

3- قریب ترین ربع زاویے لکھیے جن کے درمیان مندرجہ ذیل زاویے ہوں۔ اپنا جواب ریڈین میں لکھیں۔

- (i)  $\frac{\pi}{3}$  (ii)  $\frac{3\pi}{4}$  (iii)  $\frac{-\pi}{4}$  (iv)  $\frac{-3\pi}{4}$



4- زاویہ  $\theta$  کس ربع میں ہو گا جبکہ

- (i)  $\sin\theta > 0$  ,  $\tan\theta < 0$  (ii)  $\cos\theta < 0$  ,  $\sin\theta < 0$   
 (iii)  $\sec\theta > 0$  ,  $\sin\theta < 0$  (iv)  $\cos\theta < 0$  ,  $\tan\theta < 0$   
 (v)  $\operatorname{cosec}\theta > 0$  ,  $\cos\theta > 0$  (vi)  $\sin\theta < 0$  ,  $\sec\theta < 0$

5- خالی جگہ پُر کریں۔

- (i)  $\cos(-150^\circ) = \dots\dots\dots \cos 150^\circ$  (ii)  $\sin(-310^\circ) = \dots\dots\dots \sin 310^\circ$   
 (iii)  $\tan(-210^\circ) = \dots\dots\dots \tan 210^\circ$  (iv)  $\cot(-45^\circ) = \dots\dots\dots \cot 45^\circ$   
 (v)  $\sec(-60^\circ) = \dots\dots\dots \sec 60^\circ$  (vi)  $\operatorname{cosec}(-137^\circ) = \dots\dots\dots \operatorname{cosec} 137^\circ$

6- دیا گیا نقطہ، زاویہ  $\theta$  کے اختتامی بازو پر واقع ہے۔ زاویہ  $\theta$  کا ربع معلوم کیجیے اور تمام چھ ٹکونیاتی نسبتیں بھی معلوم کیجیے۔

- (i)  $(-2, 3)$  (ii)  $(-3, -4)$  (iii)  $(\sqrt{2}, 1)$




7- اگر  $\cos\theta = \frac{-2}{3}$  اور زاویہ  $\theta$  کا اختتامی بازو دوسرے ربع میں ہو تو باقی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

8- اگر  $\tan\theta = \frac{4}{3}$  اور  $\sin\theta < 0$  ہو تو باقی ٹکونیاتی تفاعل کی  $\theta$  پر قیمت معلوم کریں۔

9- اگر  $\sin\theta = \frac{-1}{\sqrt{2}}$  اور زاویہ  $\theta$  کا اختتامی بازو تیسرے ربع میں نہ ہو تو  $\tan\theta$ ،  $\sec\theta$  اور  $\operatorname{cosec}\theta$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

10- اگر  $\operatorname{cosec}\theta = \frac{13}{12}$  اور  $\sec\theta > 0$  ہو تو باقی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمت معلوم کیجیے۔


11- دی ہوئی قائمہ الزاویہ مثلثوں میں ٹکونیاتی تفاعل کی قیمت معلوم کیجیے۔



12- ٹکونیاتی تفاعل کی قیمت معلوم کیجیے۔ ٹکونیاتی جدول (Tables) اور کیکولیٹر استعمال نہ کریں۔

- (i)  $\tan 30^\circ$  (ii)  $\tan 330^\circ$  (iii)  $\sec 330^\circ$  (iv)  $\cot \frac{\pi}{4}$   
 (v)  $\cos \frac{2\pi}{3}$  (vi)  $\operatorname{cosec} \frac{2\pi}{3}$  (vii)  $\cos(-450^\circ)$  (viii)  $\tan(-9\pi)$   
 (ix)  $\cos\left(\frac{-5\pi}{6}\right)$  (x)  $\sin \frac{7\pi}{6}$  (xi)  $\cot \frac{7\pi}{6}$  (xii)  $\cos 225^\circ$

## 7.4 تگونیاتی مسائلات (Trigonometric Identities)



سیکشن 7.3 میں ہم نے تگونیاتی فنکشنز (تفاعل) اور ان کے معکوس پر بحث کی۔ کوئی زاویہ  $\angle MOP = \theta$  ریڈین معیاری حالت میں لیں۔ زاویہ کے اختتامی بازو پر نقطہ  $P(x, y)$  لیں۔ قائمہ الزاویہ مثلث  $OMP$  میں مسئلہ فیثاغورث کی رو سے

$$OM^2 + MP^2 = OP^2$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

(i)

(i) کو  $r^2$  پر تقسیم کرنے سے

$$\begin{cases} \therefore \sin \theta = \frac{y}{r} \\ \cos \theta = \frac{x}{r} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \end{cases}$$

(1)

(i) کو  $x^2$  پر تقسیم کرنے سے

$$\frac{x^2}{x^2} + \frac{y^2}{x^2} = \frac{r^2}{x^2}$$

$$\Rightarrow 1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \left(\frac{r}{x}\right)^2$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{y}{x} \text{ اور } \sec \theta = \frac{r}{x}$$

$$\Rightarrow 1 + (\tan \theta)^2 = (\sec \theta)^2$$

$$\therefore \boxed{1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta} \text{ یا } \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \quad (2)$$

(i) کو ایک دفعہ پھر  $y^2$  پر تقسیم کرنے سے

$$\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{y^2} = \frac{r^2}{y^2}$$

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1 = \left(\frac{r}{y}\right)^2$$

$$\therefore \cot \theta = \frac{x}{y} \text{ اور } \operatorname{cosec} \theta = \frac{r}{y}$$

$$\Rightarrow (\cot \theta)^2 + 1 = (\operatorname{cosec} \theta)^2$$

$$\therefore \boxed{1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta} \text{ یا } \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1 \quad (3)$$

مماثلات (1)، (2) اور (3) فیثاغورث مماثلات کہلاتی ہیں۔

یہ بنیادی مماثلات تگونیاتی تفاعل (Functions) کو مختصر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔



مثال 1: ثابت کیجیے کہ  $\cot \theta \sec \theta = \operatorname{cosec} \theta$

حل: دائیں طرف کی مثلثی نسبتوں کو sine اور cosine میں بدلنے سے

$$\text{L.H.S} = \cot \theta \sec \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cdot \frac{1}{\cos \theta} = \frac{1}{\sin \theta} = \operatorname{cosec} \theta = \text{R.H.S}$$

مثال 2: ثابت کیجیے کہ  $\tan^4 \theta + \tan^2 \theta = \tan^2 \theta \sec^2 \theta$

حل:  $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$   $\therefore \tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$

$$\text{L.H.S} = \tan^4 \theta + \tan^2 \theta = \tan^2 \theta (\tan^2 \theta + 1)$$

$$= \tan^2 \theta \sec^2 \theta$$

$$= \text{R.H.S}$$

مثال 3: ثابت کیجیے کہ  $\frac{\cot^2 \alpha}{\operatorname{cosec} \alpha - 1} = \operatorname{cosec} \alpha + 1$

حل:  $\left( \because \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1 \right)$   
 $\cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta - 1$

$$\text{L.H.S} = \frac{\cot^2 \alpha}{\operatorname{cosec} \alpha - 1}$$

$$= \frac{(\operatorname{cosec}^2 \alpha - 1)}{\operatorname{cosec} \alpha - 1} = \frac{(\operatorname{cosec} \alpha - 1)(\operatorname{cosec} \alpha + 1)}{(\operatorname{cosec} \alpha - 1)}$$

$$= \operatorname{cosec} \alpha + 1 = \text{R.H.S}$$

مثال 4: تکوینیاتی تفاعل (Functions) کو  $\tan \theta$  کی شکل میں بیان کریں۔

حل: معکوس مماثل (Identity) استعمال کر کے ہم  $\cot \theta$  کو  $\tan \theta$  کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

مماثلت  $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$  کو حل کرنے سے

$$\sec \theta = \pm \sqrt{\tan^2 \theta + 1}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta} \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{\pm \sqrt{\tan^2 \theta + 1}}$$

چونکہ

$$\sin \theta = \tan \theta \cos \theta$$

کیونکہ

$$\sin \theta = \tan \theta \left( \frac{1}{\pm \sqrt{\tan^2 \theta + 1}} \right) = \frac{\tan \theta}{\pm \sqrt{\tan^2 \theta + 1}} \quad \text{اس لیے}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{\pm \sqrt{\tan^2 \theta + 1}}{\tan \theta}$$

نوٹ: ہم تمام تکوینیاتی فنکشنز کو صرف ایک تکوینیاتی فنکشن میں بیان کر سکتے ہیں۔

## مشق نمبر 7.4

1 تا 6 تک دیے گئے سوالات میں جملوں کو مختصر کر کے ایک تکنیکی تفاعل میں لکھیے۔

- |                                |                           |                              |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. $\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}$ | 2. $\tan x \sin x \sec x$ | 3. $\frac{\tan x}{\sec x}$   |
| 4. $1 - \cos^2 x$              | 5. $\sec^2 x - 1$         | 6. $\sin^2 x \cdot \cot^2 x$ |

7 تا 24 تک دیے گئے سوالات میں مماثلات کو ثابت کریں۔

- |   |   |
|---|---|
| 7. $(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta) = \cos^2 \theta$   | 8. $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\cos \theta} = 1 + \tan \theta$  |
| 9. $(\tan \theta + \cot \theta) \tan \theta = \sec^2 \theta$  |   |
| 10. $(\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta) (\tan \theta - \sin \theta) = \sec \theta - \cos \theta$           |   |
| 11. $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\tan^2 \theta - 1} = \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$         | 12. $\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} + \sin \theta = \operatorname{cosec} \theta$                             |
| 13. $\sec \theta - \cos \theta = \tan \theta \sin \theta$   | 14. $\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} + \cos \theta = \sec \theta$   |
| 15. $\tan \theta + \cot \theta = \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$   |   |
| 16. $(\tan \theta + \cot \theta) (\cos \theta + \sin \theta) = \sec \theta + \operatorname{cosec} \theta$           |   |
| 17. $\sin \theta (\tan \theta + \cot \theta) = \sec \theta$   | 18. $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = 2 \operatorname{cosec} \theta$ |
| 19. $\frac{1}{1 - \cos \theta} + \frac{1}{1 + \cos \theta} = 2 \operatorname{cosec}^2 \theta$                       |   |
| 20. $\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} - \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta} = 4 \tan \theta \sec \theta$ |   |
| 21. $\sin^3 \theta = \sin \theta - \sin \theta \cos^2 \theta$   | 22. $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$   |
| 23. $\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$                          | 24. $\sqrt{\frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}} = \frac{\sec \theta + 1}{\tan \theta}$                      |




## 7.5 زاویہ صعود اور زاویہ نزول

### (Angle of Elevation and Angle of Depression)

تکوینات کا ایک اہم مقصد بغیر پیمائش کے نقاط کے درمیان فاصلے یا بلندیاں معلوم کرنا ہے۔


#### زاویہ صعود (Angle of Elevation)



شکل 7.5.1

فرض کریں کہ O، P اور Q تین نقاط ہیں اس طرح کہ نقطہ P نقطہ O کی سطح سے بلند ہو اور نقطہ Q نقطہ O کی سطح سے نیچے ہو۔

عمودی خط PQ نقطہ P اور Q میں سے کھینچے اور ایک افقی خط OM کھینچیں۔ نقطہ O سے نقطہ P کو دیکھیں تو بننے والا زاویہ MOP، زاویہ صعود کہلاتا ہے۔ O سے نقطہ Q کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں نیچے کی طرف جھکانا پڑتی ہیں اور  $\angle MOQ$  زاویہ نزول کہلاتا ہے۔




شکل 7.5.2

#### 7.5(i) زاویہ صعود اور زاویہ نزول معلوم کرنا:

### (Find Angle of Elevation and Angle of Depression)

فاصلے، بلندیاں اور زاویے معلوم کرنے کے لیے ہم تکویناتی تقاضا استعمال کرتے ہیں۔ درج ذیل مثالیں ملاحظہ کریں۔

**مثال 1:** ایک جھنڈے کے پول کی اونچائی 17.9 میٹر ہے جبکہ اس کے سائے کی لمبائی 7 میٹر ہے۔ سورج کا زاویہ صعود معلوم کیجیے۔



**حل:** تصویر سے واضح ہوتا ہے کہ  $\alpha$  زاویہ صعود ہے۔

$$\tan \alpha = \frac{AC}{BC} = \frac{17.9}{7} \approx 2.55714 \quad \text{لہذا}$$


$\alpha$  کی قیمت معلوم کرنے کے لیے

$$\alpha \approx \tan^{-1}(2.55714) \\ \approx (68.6666)^\circ \approx 68^\circ 40'$$

$$\Rightarrow \alpha \approx 68^\circ 40'$$

**مثال 2:** ایک مشاہداتی غبارے کی اونچائی سطح زمین سے 4280 میٹر اور ایک فارم ہاؤس سے 9613 میٹر کی دوری پر ہے۔ مشاہداتی غبارے سے فارم ہاؤس کا زاویہ نزول معلوم کیجیے۔

**حل:**



اس قسم کے سوالات میں B سے A کا زاویہ صعود اور A سے B کے زاویہ نزول کو برابر لیا جائے گا۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

$$\tan \alpha = \frac{AC}{BC} = \frac{4280}{9613} \approx 0.44523$$

$$\alpha = \tan^{-1}(0.44523) = 24^\circ$$


پس زاویہ نزول  $24^\circ$  ہے۔




## مشق 7.5

- 1- سورج کا زاویہ صعود معلوم کیجیے جبکہ ایک 6 فٹ لمبے آدمی کا سایہ 3.5 فٹ ہے۔
- 2- ایک درخت کا سایہ 40 میٹر ہے جبکہ سورج کا زاویہ صعود  $25^\circ$  ہے۔ درخت کی اونچائی معلوم کیجیے۔
- 3- ایک 20 فٹ لمبی سیڑھی دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہے جبکہ سیڑھی اور دیوار کا درمیانی فاصلہ 5 فٹ ہے۔ سیڑھی کا زاویہ صعود معلوم کیجیے جوہ سطح زمین کے ساتھ بناتی ہے۔
- 4- ایک مستطیل کا قاعدہ 25 فٹ اور بلندی 13 فٹ ہے۔ مستطیل کے وتر کا زاویہ صعود معلوم کیجیے جوہ مستطیل کے قاعدے کے ساتھ بناتا ہے۔
- 5- زمین سے  $80^\circ$  کے مستقل زاویے پر ایک راکٹ چھوڑا گیا ہے۔ 5000 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد راکٹ کی زمین سے بلندی معلوم کیجیے۔
- 6- پائلٹ 4000 میٹر کی بلندی پر جہاز اڑا رہا ہے۔ وہ جہاز کو  $50^\circ$  کے زاویے پر ایئر پورٹ پر اتارنا چاہتا ہے۔ ایئر پورٹ سے کتنی دوری سے پائلٹ جہاز کو اتارنا شروع کرے گا؟
- 7- ایک پول کے درمیان سے ایک تار زمین کے ساتھ  $78.2^\circ$  کا زاویہ بناتی ہے۔ تار کا سطح زمین پر پول سے فاصلہ 3 میٹر ہے۔ پول کی بلندی معلوم کیجیے۔
- 8- ایک سڑک سطح سمندر سے  $5.7^\circ$  کا زاویہ ڈھلوان کے ساتھ بناتی ہے۔ فرض کریں کہ ہم سڑک پر اونچائی کی جانب 2 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ بتائیے ہم سطح سمندر سے کتنی بلندی پر ہوں گے؟
- 9- ٹیلی وژن کا انٹینا جس کی بلندی 8 فٹ ہے، ایک مکان کی چھت پر نصب ہے۔ زمین سے مکان کی چھت کا زاویہ صعود  $17^\circ$  اور انٹینا کا زاویہ صعود  $21.8^\circ$  ہے۔ مکان کی بلندی معلوم کریں۔
- 10- ایک مشاہداتی مقام سے دو کشتیوں کا زاویہ نزول بالترتیب  $30^\circ$  اور  $45^\circ$  ہے۔ اگر مشاہداتی مقام کی بلندی 4000 فٹ ہو تو دونوں کشتیوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو گا؟
- 11- ایک عمودی چٹان کے پائے سے دو جہاز ایک دوسرے سے 120 میٹر کے فاصلے پر ہیں، چٹان کی چوٹی سے جہازوں کا زاویہ نزول بالترتیب  $30^\circ$  اور  $45^\circ$  ہے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

(a) BC فاصلہ معلوم کریں۔ (b) چٹان کی بلندی CD معلوم کریں۔



ہم دریا کی سطح سے 30 فٹ کی بلندی پر ایک پل پر کھڑے دریا میں تیرتے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر لکڑی کے ٹکڑے کے اگلے سرے کے ساتھ زاویہ  $16.7^\circ$  اور پچھلے سرے کے ساتھ زاویہ  $14^\circ$  ہو تو ٹکڑے کی لمبائی معلوم کیجیے۔



## متفرق مشق 7

### کثیر الانتخابی سوالات

- 1- دیے گئے سوالات کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست کے لیے (✓) لگائیں۔
- (i) دو غیر ہم خط شعاعوں جن کا ایک سر اشتراک ہو، کا مجموعہ ----- کہلاتا ہے۔  
 (a) زاویہ (b) ڈگری (c) منٹ (d) ریڈین
- (ii) پیمائش کا نظام جس میں زاویہ کی پیمائش ریڈین میں کی جاتی ہے ----- سسٹم کہلاتا ہے۔  
 (a) سی جی ایس سسٹم (b) ساٹھ کے اساس کا نظام  
 (c) ایم کے ایس سسٹم (d) دائروی نظام
- (iii) ----- =  $20^\circ$   
 (a)  $360'$  (b)  $630'$  (c)  $1200'$  (d)  $3600'$
- (iv)  $\frac{3\pi}{4}$  ریڈین = -----  
 (a)  $115^\circ$  (b)  $135^\circ$  (c)  $150^\circ$  (d)  $30^\circ$
- (v) اگر  $\tan \theta = \sqrt{3}$  ہو تو  $\theta =$  -----  
 (a)  $90^\circ$  (b)  $45^\circ$  (c)  $60^\circ$  (d)  $30^\circ$
- (vi)  $\sec^2 \theta =$  -----  
 (a)  $1 - \sin^2 \theta$  (b)  $1 + \tan^2 \theta$  (c)  $1 + \cos^2 \theta$  (d)  $1 - \tan^2 \theta$
- (vii)  $\frac{1}{1 + \sin \theta} + \frac{1}{1 - \sin \theta} =$  -----  
 (a)  $2 \sec^2 \theta$  (b)  $2 \cos^2 \theta$  (c)  $\sec^2 \theta$  (d)  $\cos \theta$



$$\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ = \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{viii})$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\text{d}) \quad \sqrt{2} \quad (\text{c}) \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{b}) \quad \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (\text{a})$$

$$\sec \theta \cot \theta = \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{ix})$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad (\text{d}) \quad \frac{1}{\sin \theta} \quad (\text{c}) \quad \frac{1}{\cos \theta} \quad (\text{b}) \quad \sin \theta \quad (\text{a})$$

$$\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = \underline{\hspace{2cm}} \quad (\text{x})$$

$$\tan \theta \quad (\text{d}) \quad 0 \quad (\text{c}) \quad 1 \quad (\text{b}) \quad -1 \quad (\text{a})$$

**-2** درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔

(i) زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(ii) زاویوں کی پیمائش کا ساٹھ کے اساس کا نظام کیا ہے؟

(iii) دو قائمہ الزاویوں میں کل کتنے منٹس ہوتے ہیں؟

(iv) زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجیے۔

(v)  $\frac{\pi}{5}$  کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

(vi)  $15^\circ$  کو ریڈین میں تبدیل کیجیے۔

(vii) دائرے پر قوس کی لمبائی 50 میٹر اور اس کا رداس 25 میٹر ہے مرکز پر بننے والا زاویہ کتنے ریڈین کا ہوگا؟

(viii) جب میٹر  $l = 56$  اور  $\theta = 45^\circ$  ہو تو  $r$  کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ix) اگر  $\cos \theta = \frac{9}{41}$  اور  $\theta$  کا اختتامی بازو چوتھے ربع میں ہو تو  $\tan \theta$  معلوم کیجیے۔

(x) ثابت کیجیے کہ  $(1 - \sin^2 \theta) (1 + \tan^2 \theta) = 1$

**-3** خالی جگہ پُر کریں۔

(i) ریڈین  $\pi = \underline{\hspace{2cm}}$  ڈگری۔

(ii)  $235^\circ$  کا اختتامی بازو ربع میں ہے۔

(iii)  $30^\circ$  کا اختتامی بازو ربع میں ہے۔

(iv) دائروں علاقہ کارقبہ ہے۔

(v) اگر سم  $r = 2$  اور ریڈین  $\theta = 3$  ہو تو دائروں علاقہ کارقبہ ہے۔

(vi)  $480^\circ$  زاویے کی معیاری حالت ہے۔

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \text{ اگر } \theta = \text{ } \quad \text{(vii)}$$

$$\sec(-300)^\circ = \text{ } \text{ اگر } \theta = 300^\circ \text{ ہو تو } \quad \text{(viii)}$$

$$1 + \cot^2 \theta = \text{ } \quad \text{(ix)}$$

$$\sec \theta - \tan \theta = \text{ } \quad \text{(x)}$$

## خلاصہ

اگر دائرے کے محیط کو 360 برابر قوسوں میں تقسیم کریں تو دائرے کے مرکز پر ایک قوس سے بننے والے زاویوں کو ایک ڈگری کہتے ہیں اور اس کو  $1^\circ$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

دائرے کے مرکز پر ایک قوس کی لمبائی دائرے کے رداس کے برابر ہو، سے بننے والے زاویے کی مقدار ایک ریڈین کہلاتا ہے۔

ریڈین اور ڈگری کے درمیان تعلق

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ ریڈین} \approx 0.0175 \text{ ریڈین} \quad \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.295^\circ$$

مرکزی زاویہ اور دائرے کی قوس کی لمبائی میں تعلق  $l = r\theta$  ہے۔

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta \quad \text{دائرہ قاطع کا رقبہ}$$

دو یا دو سے زیادہ زاویے جن کے ابتدائی بازو اور اختتامی بازو ایک جیسے ہوں، کو ٹریپل زاویے کہلاتے ہیں۔

اگر کسی زاویے کا اختتامی بازو  $x$  - محور یا  $y$  - محور پر ہو تو اس زاویے کو ربع زاویہ کہتے ہیں۔

اگر عمومی زاویے کا راس (Vertex)، مبدأ (Origin) پر ہو اور ابتدائی بازو مستوی میں  $x$  - محور کی مثبت سمت میں ہو ایسا زاویہ معیاری صورت میں ہوتا ہے۔

بنیادی طور پر ٹکونیاتی نسبتیں چھ ہیں۔ جن کو Sine، Cosine، Tangent، Cotangent، Secant اور Cosecant کہتے ہیں۔

ٹکونیاتی مماثلت:

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad \text{(b)}$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad \text{(a)}$$

$$1 + \cot^2 \theta = \text{cosec}^2 \theta \quad \text{(c)}$$



## مثلث کے ایک ضلع کا ظل (سایہ)

### (PROJECTION OF A SIDE OF A TRIANGLE)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

درج ذیل اثباتی مسائل بمعہ نتائج صریح کو ثابت کرنا اور متعلقہ سوالات حل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا۔


کسی منفرجہ الزاویہ مثلث میں منفرجہ زاویے کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے اور دو چند مستطیلی رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔

کسی مثلث میں حادہ زاویہ کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے سے کم دو چند (دو گنا) مستطیلی رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔

کسی مثلث میں کوئی سے دو اضلاع کے مربعوں کا مجموعہ، تیسرے نصف ضلع کے مربع اور اس کے وسطانیہ کے مربع کے مجموعے کا دو چند (دو گنا) ہوتا ہے۔

## مسئلہ 1

8.1(i) کسی منفرجہ الزاویہ مثلث میں منفرجہ زاویے کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربحوں کے مجموعے اور دو چند مستطیلی رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔



معلوم:  $ABC$  ایک مثلث ہے جسکے نقطہ  $A$  پر  $BAC$  منفرجہ زاویہ ہے۔ بڑھے ہوئے ضلع  $BA$  پر  $CD$  عمود ہے۔ اس طرح ضلع  $AC$  کا بڑھے ہوئے  $BA$  پر  $AD$  ظل ہے۔

فرض کریں  $CD = h$  اور  $AD = x$ ,  $BC = a$ ,  $CA = b$ ,  $AB = c$

مطلوب:  $(BC)^2 = (AC)^2 + (AB)^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$

$$a^2 = b^2 + c^2 + 2cx$$

یعنی

ثبوت:

| بیانات   | دلائل                 |
|--|-----------------------|
| قائمہ الزاویہ مثلث $CDA$ میں<br>$m\angle CDA = 90^\circ$ | معلوم                 |
| $(AC)^2 = (AD)^2 + (CD)^2$                               | مسئلہ فیثاغورث        |
| $b^2 = x^2 + h^2$ (i) یا                                 |                       |
| قائمہ الزاویہ مثلث $CDB$ میں<br>$m\angle CDB = 90^\circ$ | معلوم                 |
| $(BC)^2 = (BD)^2 + (CD)^2$                               | مسئلہ فیثاغورث        |
| $a^2 = (c + x)^2 + h^2$ یا                               |                       |
| $= c^2 + 2cx + x^2 + h^2$ (ii)                           |                       |
| $a^2 = c^2 + 2cx + b^2$ پس                               | (i) اور (ii) کی رو سے |



$$a^2 = b^2 + c^2 + 2cx$$

یعنی


$$(BC)^2 = (AC)^2 + (AB)^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$$

یا

**مثال:** مثلث  $\triangle ABC$  میں  $\angle A$  منفرجہ ہے۔ اگر  $m\overline{AC} = m\overline{AB}$  ہو تو ثابت کریں کہ

$$(BC)^2 = 2(m\overline{AB})(m\overline{BD})$$

ضلع  $\overline{BA}$  پر  $\overline{CD}$  عمود ہو۔



**معلوم:** مثلث  $\triangle ABC$  میں  $\angle A$  منفرجہ ہے۔  $m\overline{AC} = m\overline{AB}$  اور بڑھے ہوئے ضلع  $\overline{BA}$  پر  $\overline{CD}$  عمود ہے۔

$$(BC)^2 = 2(m\overline{AB})(m\overline{BD})$$

**ثبوت:**

| بیانات   | دلائل  |
|--|--|
| $(BC)^2 = (BA)^2 + (AC)^2 + 2(m\overline{BA})(m\overline{AD})$ $= (AB)^2 + (AB)^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$ $= 2(AB)^2 + 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$ | <p>مسئلہ 1 کی رو سے معلوم</p>                                |
| $(BC)^2 = 2m\overline{AB}(m\overline{AB} + m\overline{AD})$ $= 2(m\overline{AB})(m\overline{BD})$  | <p>نقطہ A قطعہ خط <math>\overline{BD}</math> پر واقع ہے۔</p> |


## مشق 8.1

1- اگر  $m\overline{AC} = 1\text{cm}$ ،  $m\overline{BC} = 2\text{cm}$  اور  $m\angle C = 120^\circ$  تو ضلع  $\overline{AB}$  کی لمبائی اور  $\triangle ABC$  کا رقبہ معلوم کریں۔

(اشارہ)  $(m\overline{CD}) = (m\overline{BC}) \cos (180^\circ - m\angle C)$  جبکہ  $(AB)^2 = (AC)^2 + (BC)^2 + 2m\overline{AC} \cdot m\overline{CD}$

2- اگر مثلث  $ABC$  میں  $\overline{BC}$  کی لمبائی 6 سم،  $\overline{AB}$  کی لمبائی  $4\sqrt{2}$  سم اور  $m\angle ABC = 135^\circ$  ہو تو  $m\overline{AC}$  معلوم کیجیے۔

(ii) 8.1 کسی مثلث میں حادہ زاویہ کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے سے کم دوچند مستطیلی رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔



معلوم:  $\triangle ABC$  میں نقطہ A پر  $\angle CAB$  حادہ زاویہ ہے۔

فرض کریں۔  $m\overline{BC} = a$ ,  $m\overline{CA} = b$ ,  $m\overline{AB} = c$

$\overline{CD} \perp \overline{AB}$  کھینچا اس طرح  $\overline{AD}$ ، ضلع  $\overline{AC}$  کا  $\overline{AB}$  پر ظل ہے اور

$$m\overline{AD} = x, m\overline{CD} = h$$

مطلوب:  $(BC)^2 = (AC)^2 + (AB)^2 - 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2cx$$

یعنی

ثبوت:

| بیانات   | دلائل                 |
|--|-----------------------|
| قائمہ الزاویہ $\triangle CDA$ میں                              | معلوم                 |
| $m\angle CDA = 90^\circ$                                       | مسئلہ فیثاغورث        |
| $(AC)^2 = (AD)^2 + (CD)^2$                                     |                       |
| $b^2 = x^2 + h^2$  |                       |
| (i) یعنی   |                       |
| قائمہ الزاویہ $\triangle CDB$ میں                              | معلوم                 |
| $m\angle CDB = 90^\circ$                                       | مسئلہ فیثاغورث        |
| $(BC)^2 = (BD)^2 + (CD)^2$                                     | بذریعہ شکل            |
| $a^2 = (c-x)^2 + h^2$  |                       |
| $a^2 = c^2 - 2cx + x^2 + h^2$                                  |                       |
| (ii) یا  |                       |
| $a^2 = c^2 - 2cx + b^2$  |                       |
| $a^2 = b^2 + c^2 - 2cx$  | پس                    |
| $(BC)^2 = (AC)^2 + (AB)^2 - 2(m\overline{AB})(m\overline{AD})$ | یعنی                  |
|  | (i) اور (ii) کی رو سے |




### مسئلہ 3

(iii) 8.1 کسی مثلث میں کوئی سے دو اضلاع کے مربعوں کا مجموعہ، تیسرے نصف ضلع کے مربع اور اس کے وسطانیہ کے مربع کے مجموعے کا دوچند ہوتا ہے۔

معلوم: مثلث  $\triangle ABC$  میں وسطانیہ  $\overline{AD}$  ضلع  $\overline{BC}$  کی نقطہ  $D$  پر تنصیف کرتا ہے۔ یعنی  $m\overline{BD} = m\overline{CD}$

مطلوب:  $(AB)^2 + (AC)^2 = 2[(BD)^2 + (AD)^2]$

عمل:  $\overline{AF} \perp \overline{BC}$  کھینچا۔




ثبوت:

| بیانات   | دلائل                             |
|--|-----------------------------------|
| $\triangle ADB$ میں چونکہ $\angle ADB$ حادہ ہے۔                        |                                   |
| (i) $(AB)^2 = (BD)^2 + (AD)^2 - 2m\overline{BD} \cdot m\overline{FD}$  | مسئلہ 2 کی رو سے                  |
| اب $\triangle ADC$ میں چونکہ $\angle ADC$ منفرجہ زاویہ ہے۔             |                                   |
| (ii) $(AC)^2 = (CD)^2 + (AD)^2 + 2m\overline{CD} \cdot m\overline{FD}$ | مسئلہ 1 کی رو سے                  |
| (iii) $(AB)^2 + (AC)^2 = 2(BD)^2 + 2(\overline{AD})^2$                 | معطوم (i) اور (ii) کو جمع کرنے سے |
| تب   |                                   |
| پس $(AB)^2 + (AC)^2 = 2[(BD)^2 + (AD)^2]$                              |                                   |

مثال 1:  $\triangle ABC$  میں  $\angle BCA$  منفرجہ زاویہ ہے۔  $\overline{AD} \perp \overline{BC}$  جبکہ  $\overline{BD}$ ، ضلع  $\overline{AB}$  کا  $\overline{BC}$  پر ظل ہے۔ ثابت کریں کہ

$$(AC)^2 = (AB)^2 + \overline{BC} \cdot \overline{BD}$$



معلوم:  $\triangle ABC$  میں زاویہ  $C$  منفرجہ زاویہ ہے۔ اس طرح  $\angle B$  حادہ زاویہ ہے۔ جبکہ  $\overline{BD}$ ، ضلع  $\overline{AB}$  کا بڑھے ہوئے  $\overline{BC}$  پر ظل ہے۔


مطلوب:  $(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2 - 2m\overline{BC} \cdot m\overline{BD}$  ثبوت:

| بیانات   | دلائل  |
|--|--|
| قائمۃ الزاویہ $\triangle ABD$ میں  |  |
| (i) $(AB)^2 = (AD)^2 + (BD)^2$   | مسئلہ فیثاغورث                                     |
| قائمۃ الزاویہ $\triangle ACD$ میں  |  |
| (ii) $(AC)^2 = (AD)^2 + (CD)^2$  | مسئلہ فیثاغورث                                     |
| یا   | $m\overline{BC} + m\overline{CD} = m\overline{BD}$ |
| (iii) $(AC)^2 = (AD)^2 + (BD)^2 + (BC)^2 - 2m\overline{BC} \cdot m\overline{BD}$ |  |
| $(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2 - 2m\overline{BC} \cdot m\overline{BD}$                | (i) اور (iii) کی رو سے                             |

مثال 2: متساوی الساقین  $\triangle ABC$  میں اگر  $m\overline{AB} = m\overline{AC}$  اور  $\overline{BE} \perp \overline{AC}$  ہو تو ثابت کریں کہ

$$(BC)^2 = 2m\overline{AC} \cdot m\overline{CE}$$

معلوم: متساوی الساقین  $\triangle ABC$  میں  $m\overline{AB} = m\overline{AC}$  اور  $\overline{BE} \perp \overline{AC}$  جبکہ  $\overline{CE}$  ضلع  $\overline{BC}$  کا  $\overline{AC}$  پر ظل ہے۔  
مطلوب:  $(BC)^2 = 2m\overline{AC} \cdot m\overline{CE}$



ثبوت:

| بیانات  | دلائل                                  |
|---|--|
| متساوی الساقین $\triangle ABC$ میں $m\overline{AB} = m\overline{AC}$ اگر $\angle C$ حادہ زاویہ ہو۔ تو |  |
| (AB) <sup>2</sup> = (AC) <sup>2</sup> + (BC) <sup>2</sup> - 2m $\overline{AC}$ . m $\overline{CE}$    | مسئلہ 2 کی رو سے                       |
| (AC) <sup>2</sup> = (AC) <sup>2</sup> + (BC) <sup>2</sup> - 2m $\overline{AC}$ . m $\overline{CE}$    | $m\overline{AB} = m\overline{AC}$      |
| $\Rightarrow (BC)^2 - 2m\overline{AC} \cdot m\overline{CE} = 0$                                       | دونوں جانب (AC) <sup>2</sup> منہا کریں |
| (BC) <sup>2</sup> = 2m $\overline{AC}$ . m $\overline{CE}$  | یا                                     |



## مشق 8.2

- 1-  $\Delta ABC$  میں ضلع  $\overline{BC}$  کی پیمائش کریں جبکہ  $m\overline{AB} = 6\text{ cm}$ ،  $m\overline{AC} = 4\text{ cm}$  اور  $m\angle A = 60^\circ$  ہے۔
- 2- مثلث  $ABC$  میں  $\overline{AB}$  کی لمبائی 6 سم،  $\overline{BC}$  کی لمبائی 8 سم،  $\overline{AC}$  کی لمبائی 9 سم اور نقطہ  $D$ ،  $\overline{AC}$  کا وسطی نقطہ ہے۔  
وسطانیہ  $\overline{BD}$  کی لمبائی معلوم کریں۔
- 3- متوازی الاضلاع  $ABCD$  میں ثابت کریں کہ


$$(AC)^2 + (BD)^2 = 2[(AB)^2 + (BC)^2]$$

## مفرد مشق 8


1.  $\Delta ABC$  میں  $m\angle A = 60^\circ$  ہو تو ثابت کریں کہ  $m\overline{AC} \cdot m\overline{AB} = (BC)^2 = (AB)^2 + (AC)^2 - m\overline{AB} \cdot m\overline{AC}$
2.  $\Delta ABC$  میں  $m\angle A = 45^\circ$  ہو تو ثابت کریں کہ  $m\overline{AC} \cdot m\overline{AB} = (BC)^2 = (AB)^2 + (AC)^2 - \sqrt{2} m\overline{AB} \cdot m\overline{AC}$
- 3-  $\Delta ABC$  میں  $m\overline{BC}$  معلوم کریں جبکہ  $m\overline{AB} = 5\text{ cm}$ ،  $m\overline{AC} = 4\text{ cm}$  اور  $m\angle A = 60^\circ$
- 4-  $\Delta ABC$  میں  $m\overline{AC}$  معلوم کریں جبکہ  $m\overline{AB} = 5\text{ cm}$  اور  $m\overline{BC} = 4\sqrt{2}\text{ cm}$  اور  $m\angle B = 45^\circ$
- 5-  $\Delta ABC$  میں  $m\overline{AB} = 10\text{ cm}$ ،  $m\overline{BC} = 21\text{ cm}$  اور  $m\overline{AC} = 17\text{ cm}$  ہو تو  $\overline{BC}$  پر ظل  $\overline{AC}$  کی لمبائی معلوم کریں۔
- 6- اگر مثلث  $ABC$  میں  $m\overline{AB} = 10\text{ cm}$ ،  $m\overline{BC} = 21\text{ cm}$ ،  $m\overline{AC} = 17\text{ cm}$  ہو تو ضلع  $\overline{BC}$  پر ظل  $\overline{AB}$  کی لمبائی معلوم کریں۔
- 7- اگر  $\Delta ABC$  میں  $a = 17\text{ cm}$ ،  $b = 15\text{ cm}$  اور  $c = 8\text{ cm}$  ہو تو  $m\angle A$  معلوم کریں۔
- 8- اگر  $\Delta ABC$  میں  $a = 17\text{ cm}$ ،  $b = 15\text{ cm}$  اور  $c = 8\text{ cm}$  ہو تو  $m\angle B$  معلوم کریں۔
- 9- مثلث کے اضلاع 5 سم، 7 سم اور 8 سم ہیں۔ کیا وہ حادة الزاویہ، منفرجة الزاویہ یا قائمة الزاویہ ہے؟
- 10- مثلث کے اضلاع 8 سم، 15 سم اور 17 سم ہیں۔ کیا وہ حادة الزاویہ، منفرجة الزاویہ یا قائمة الزاویہ مثلث ہے؟

## خلاصہ

کسی نقطہ سے ایک دیے ہوئے قطعہ خط پر عمود کھینچا جائے تو پایہ عمود کو نقطے کا ظل یا سایہ کہتے ہیں۔ اگر  $\overline{CD} \perp \overline{AB}$  کھینچا جائے تو پایہ عمود  $D$  کو نقطہ  $C$  کا ظل کہیں گے۔



دیے ہوئے قطعہ خط  $CD$  کا کسی دوسرے قطعہ خط  $AB$  پر ظل سے مراد  $\overline{EF}$  ہے جو نقطہ  $E$  پایہ عمود  $C$  اور نقطہ  $F$  پایہ عمود  $D$  کے درمیان ہوتا ہے، البتہ دیے ہوئے عمودی قطعہ خط  $CD$  کا ظل کسی دوسرے قطعہ خط  $AB$  پر اس کا ایک نقطہ  $E$  ہے جس کی پیمائش صفر ہوتی ہے۔



کسی منفرجہ الزاویہ مثلث میں منفرجہ زاویے کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے اور دوچند مستطیلی رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔

کسی مثلث میں حادہ زاویہ کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے سے کم دوچند مستطیلی رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔

کسی مثلث میں کوئی سے دو اضلاع کے مربعوں کا مجموعہ، تیسرے ضلع کے نصف کے مربع اور اس کے وسطانیہ کے مربع کے مجموعے کا دوچند ہوتا ہے۔



## دائرے کا وتر

### (CHORDS OF A CIRCLE)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

درج ذیل اثباتی مسائل بمعہ نتائج صریح کو ثابت کرنا اور متعلقہ سوالات حل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا۔

تین غیر خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔

دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔


دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔

اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

دائرے کے دو وتر جو مرکز سے برابر فاصلہ پر ہوں، وہ متماثل ہوتے ہیں۔


## دائرے کے بنیادی تصورات (Basic Concepts of the Circle)

کسی سطح میں متحرک نقطہ  $P$  کا وہ راستہ جو ایک معین نقطہ  $O$  سے ہمیشہ یکساں فاصلے پر رہے، **دائرہ** کہلاتا ہے۔ دائرہ پر یہ غیر موجود معین نقطہ  $O$  دائرے کا **مرکز** جبکہ مستقل فاصلہ  $OP$  اس کا **رداس** یا نصف قطر ہے جبکہ متحرک نقطہ  $P$  اس کا **محیط** بناتا ہے۔



شکل (i)

شکل (i) میں رداس کی لمبائی  $m\overline{OP} = m\overline{OQ} = m\overline{OT}$  ہے۔ اگر دائرے کا رداس  $r$  ہو تو اس کا محیط  $2\pi r$  ہوتا ہے۔ جبکہ غیر ناطق ہندسہ  $\pi$  کی قیمت، دائرے کے محیط اور اس کے قطر کی نسبت ہوتی ہے۔




شکل (ii)

دائرے کے محیط کا ایک ٹکڑا  $ACB$  دائرے کی قوس ہوتی ہے۔ محیط پر دیے ہوئے دو نقاط کا ملانے والا قطعہ خط  $AKB$  ایک وتر ہے جبکہ مرکز سے گزرنے والا وتر  $POQ$  دائرے کا قطر ہوتا ہے۔  
دائرے کا وہ خطہ جو اس کی قوس اور متعلقہ وتر نے گھیرا ہو، قطعہ دائرہ ہوتا ہے۔ شکل (ii) میں دکھایا گیا سیاہ خطہ، صغیرہ قطعہ دائرہ اور ترچھے قطعات خطہ سے ظاہر کیا گیا خطہ، کبیرہ قطعہ دائرہ ہے۔  
دائرے کے دور دای قطعات اور ان کے متعلقہ قوس سے گھرا ہوا علاقہ دائرے کا **سیکٹر** کہلاتا ہے۔

دائرے کے رداسوں کا ایک جوڑا اس دائرہ کو دو سیکٹروں میں تقسیم کرتا ہے شکل (iii) میں  $OAIB$  دائرے کا



صغیرہ سیکٹر اور  $OAJB$  کبیرہ سیکٹر ہوگا۔ دائرے کی قوس  $AB$  اس کے مرکز  $O$  پر جو زاویہ  $AOB$  بناتی ہے۔ اس کو مرکزی زاویہ کہتے ہیں۔




شکل (iii)

## مسئلہ 1

(i) 9.1 تین غیر خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔

معلوم: مستوی میں تین غیر ہم خط نقاط  $A, B, C$  ہیں۔

مطلوب: تین غیر ہم خط نقاط  $A, B, C$  میں سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔



عمل: نقطہ  $A$  کو  $B$  سے اور نقطہ  $B$  کو  $C$  سے ملایا۔  $\overline{AB}$  پر عمودی ناصف  $\overrightarrow{DF}$

اور  $\overline{BC}$  پر عمودی ناصف  $\overrightarrow{HK}$  بنائیں۔ اس طرح  $\overrightarrow{DF}$  اور  $\overrightarrow{HK}$  دو غیر متوازی

قطعات خط ہیں اور وہ ایک دوسرے کو نقطہ  $O$  پر قطع کرتے ہیں۔ نیز نقاط  $A, B$

اور  $C$  کو نقطہ  $O$  سے ملائیں۔

ثبوت:

| بیانات   | دلائل   |
|--|---|
| عمودی ناصف $\overrightarrow{DF}$ پر ہر نقطہ $A$ اور $B$ سے یکساں فاصلے پر واقع ہے۔         | $\overrightarrow{DF}$ کا عمودی ناصف ہے۔ (عمل) |
| خصوصاً (i) $m\overline{OA} = m\overline{OB}$   |   |
| اسی طرح عمودی ناصف $\overrightarrow{HK}$ پر ہر نقطہ $B$ اور $C$ سے یکساں فاصلے پر واقع ہے۔ | $\overrightarrow{HK}$ کا عمودی ناصف ہے۔       |

$$m\overline{OB} = m\overline{OC}$$

(ii) خصوصاً

اب  $\overrightarrow{DF}$  اور  $\overrightarrow{HK}$  کا صرف ایک ہی مشترک نقطہ  $O$  ہے۔ جو نقاط  $A, B, C$  سے یکساں فاصلے پر واقع ہے۔

$$m\overline{OA} = m\overline{OB} = m\overline{OC}$$

یعنی البتہ  $O$  کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا نقطہ نہیں۔

اس لیے مرکز  $O$  اور رداس  $\overline{OA}$  والا دائرہ نقاط  $A, B, C$  میں سے گزرتا ہے۔

(i) اور (ii) کی رو سے

پس دیے ہوئے تین نقاط  $A, B, C$  میں سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔

**مثال:** ثابت کریں کہ ایک مستطیل کے راسی نقاط میں سے گزرتا ہوا صرف ایک ہی دائرہ بنایا جاسکتا ہے۔

**معلوم:**  $ABCD$  ایک مستطیل ہے۔


**مطلوب:** مستطیل  $ABCD$  کے راسی نقاط میں سے گزرتا ہوا صرف ایک

ہی دائرہ بنایا جاسکتا ہے۔

**عمل:** مستطیل  $ABCD$  کے وتر  $\overline{AC}$  اور  $\overline{BD}$  ایک دوسرے کو نقطہ  $O$  پر ملتے

ہیں۔

**ثبوت:**



دلائل

بیانات

$ABCD$  ایک مستطیل ہے۔

$$m\overline{AC} = m\overline{BD} \quad (i)$$

$\therefore \overline{AC}$  اور  $\overline{BD}$  ایک دوسرے کو نقطہ  $O$  پر ملتے ہیں۔

$$m\overline{OA} = m\overline{OC} \text{ اور } m\overline{OB} = m\overline{OD} \quad (ii)$$

$$\Rightarrow m\overline{OA} = m\overline{OB} = m\overline{OC} = m\overline{OD} \quad (iii)$$

یعنی نقطہ  $O$ ، مستطیل کے تمام راسوں سے مساوی فاصلے پر واقع ہے۔

$O$  کو مرکز مان کر بنایا جانے والا دائرہ مستطیل کے راسوں سے گزرتا ہے

جبکہ  $m\overline{OA}$ ،  $m\overline{OB}$ ،  $m\overline{OC}$  اور  $m\overline{OD}$  دائرے کے رداس ہیں۔

معلوم  
مستطیل کے وتر برابر ہوتے ہیں

عمل


مستطیل کے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں

(i) اور (ii) کی رو سے



## مسئلہ 2

(ii) 9.1 دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔



معلوم: ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے۔ وتر  $\overline{AB}$  کا نقطہ تنصیف ہے۔ جبکہ وتر  $\overline{AB}$  دائرہ کا قطر نہیں ہے۔

مطلوب: وتر  $\overline{OM} \perp \overline{AB}$

عمل: نقاط A اور B کو مرکز O سے ملائیں۔  $\angle 1$  اور  $\angle 2$  لکھیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

ثبوت:

| بیانات  | دلائل   |
|---|---|
| $\triangle OAM \leftrightarrow \triangle OBM$<br>$m\overline{OA} = m\overline{OB}$<br>$m\overline{AM} = m\overline{BM}$<br>$m\overline{OM} = m\overline{OM}$<br>$\therefore \triangle OAM \cong \triangle OBM$<br>$\Rightarrow m\angle 1 = m\angle 2$ (i) | <p>ایک ہی دائرے کے رداس معلوم مشترک</p> <p>S.S.S <math>\cong</math> S.S.S</p> <p>متصلہ سپلیمنٹری زاویے</p> <p>(i) اور (ii) کی رو سے</p> |
| $m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle AMB = 180^\circ$ (ii) یعنی   | <p><math>\therefore m\angle 1 = m\angle 2 = 90^\circ</math></p>   |
| یعنی $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ وتر  |   |


### مسئلہ 3

(iii) 9.1 دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔

معلوم: مرکز  $O$  والے دائرے کا وتر  $\overline{AB}$  ہے۔ اس طرح کہ وتر  $\overline{AB} \perp \overline{OM}$

مطلوب: نقطہ  $M$ ، وتر  $\overline{AB}$  کا وسطی نقطہ ہے۔ یعنی  $m\overline{AM} = m\overline{BM}$

عمل: نقاط  $A$  اور  $B$  کو مرکز  $O$  سے ملائیں۔



ثبوت:


| بیانات   | دلائل  |
|--|--|
| $\Delta OAM \leftrightarrow \Delta OBM$ میں<br>$m\angle OMA = m\angle OMB = 90^\circ$<br>$m\overline{OA} = m\overline{OB}$<br>$m\overline{OM} = m\overline{OM}$<br>$\therefore \Delta OAM \cong \Delta OBM$<br>$m\overline{AM} = m\overline{BM}$ پس<br>$\overline{OM}$ ، وتر $\overline{AB}$ کی تنصیف کرتا ہے۔ | <p>معلوم</p> <p>ایک ہی دائرے کے رداس</p> <p>مشترک</p> <p>قائمہ لزاویہ مشٹان میں H.S <math>\cong</math> H.S</p> |

نتیجہ صریح 1: کسی دائرے کے وتر کا عمودی ناصف دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے۔

نتیجہ صریح 2: کسی دائرے کا قطر اس کے دو متوازی وتروں کے وسطی نقاط میں سے گزرتا ہے۔

مثال: دو دائروں کے مراکز کو ملانے والے قطعہ خط کے متوازی خطوط جو دائروں کے متقاطع نقاط میں سے گزرتے

ہوں۔ ان کے وہ حصے جو دائرے قطع کرتے ہیں لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔



معلوم:  $O_1$  اور  $O_2$  مراکز والے دو دائرے ایک دوسرے کو

نقاط  $E$  اور  $F$  پر قطع کرتے ہیں۔ نیز قطع شدہ قطعات خط  $\overline{AB}$  اور

$\overline{CD}$ ،  $\overline{O_1O_2}$  کے متوازی ہیں۔

مطلوب:  $m\overline{AB} = m\overline{CD}$

عمل:  $\overline{AB}$  اور  $\overline{CD}$  پر بالترتیب  $\overline{PT}$  اور  $\overline{RS}$  عمود کھینچیں۔




| بیانات  | دلائل  |
|---|--|
| PRST ایک مستطیل ہے۔<br>$\therefore m \overline{PR} = m \overline{TS}$ (i)<br>$m \overline{PR} = m \overline{PE} + m \overline{ER}$ اب<br>$= \frac{1}{2} m \overline{AE} + \frac{1}{2} m \overline{EB}$<br>$= \frac{1}{2} (m \overline{AE} + m \overline{EB})$<br>$m \overline{PR} = \frac{1}{2} (m \overline{AB})$ (ii)<br>$m \overline{TS} = \frac{1}{2} m \overline{CD}$ (iii) اسی طرح<br>$\Rightarrow \frac{1}{2} m \overline{AB} = \frac{1}{2} m \overline{CD}$<br>$m \overline{AB} = m \overline{CD}$ یعنی | عمل<br>مسئلہ 3 کی رو سے<br>$m \overline{AE} + m \overline{EB} = m \overline{AB}$<br>(i)، (ii) اور (iii) کی رو سے |

## مشق 9.1

- 1- ثابت کریں کہ دائرے کے قطر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں۔
- 2- ثابت کریں کہ دائرے کے دو متقاطع وتر جو مرکز سے نہ گزرتے ہوں وہ ایک دوسرے کی تنصیف نہیں کرتے۔
- 3- اگر  $\overline{AB}$  وتر کی لمبائی 8 سم ہو اور اس کا مرکز سے فاصلہ 3 سم ہو تو اس دائرہ کا قطر معلوم کریں۔
- 4- ایک دائرہ جس کا رداس 9 سم ہے اور اس کے وتر کا فاصلہ مرکز سے 5 سم ہو تو وتر کی لمبائی معلوم کریں۔

## مسئلہ 4

(iv) 9.1 اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔



معلوم: ایک دائرے کا مرکز O ہے۔ اسکے دو وتر  $\overline{AB}$  اور  $\overline{CD}$  برابر

ہیں۔ اس طرح  $\overline{OH} \perp \overline{AB}$  اور  $\overline{OK} \perp \overline{CD}$

مطلوب:  $m \overline{OH} = m \overline{OK}$


عمل: نقطہ O کو A سے اور O کو C سے ملائیں۔ اس طرح OAH اور

OCK دو قائمہ الزاویہ مثلثان ہیں۔

| بیانات                                       | دلائل   |
|--|---|
| $\overline{OH} \perp \overline{AB}$ کی رو سے | مسئلہ 3 کی رو سے  |
| $\overline{OK} \perp \overline{CD}$ کی رو سے | مسئلہ 3 کی رو سے  |
|  | معلوم   |
|  | (i) اور (ii) کی رو سے   |
|  | (iii) اور (iv) کی رو سے   |
|  | (معلوم)   |
|  | $\overline{OH} \perp \overline{AB}$ and $\overline{OK} \perp \overline{CD}$ |
|  | ایک ہی دائرے کے رداس  |
|  | (iv) کی رو سے ثابت شدہ  |
|  | H. S کے اصول کا موضوعہ  |
|  | $\therefore \Delta OAH \cong \Delta OCK$                                    |
|  | $\Rightarrow m\overline{OH} = m\overline{OK}$                               |
|  | اب قائمہ الزاویہ مثلثان کی مطابقت   |
|  | $\Delta OAH \leftrightarrow \Delta OCK$                                     |
|  | $m\overline{OA} = m\overline{OC}$   |
|  | $m\overline{AH} = m\overline{CK}$   |
|  | اس لیے (iv)   |
|  | $m\overline{AB} = m\overline{CD}$   |
|  | $m\overline{AH} = \frac{1}{2} m\overline{AB}$ (i) یعنی                      |
|  | $m\overline{CK} = \frac{1}{2} m\overline{CD}$ (ii) یعنی                     |
|  | $m\overline{AB} = m\overline{CD}$ (iii) لیکن                                |
|  | $m\overline{AH} = m\overline{CK}$ (iv) اس لیے                               |

## مسئلہ 5

(v) 9.1 دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متماثل ہوتے ہیں۔



معلوم: ایک دائرے کا مرکز O اور دو وتر  $\overline{AB}$  اور  $\overline{CD}$  ہیں۔

$$\overline{OH} \perp \overline{AB} \text{ اور } \overline{OK} \perp \overline{CD}$$

جب کہ

$$m\overline{OH} = m\overline{OK}$$

تو

مطلوب:  $m\overline{AB} = m\overline{CD}$

عمل: نقاط A اور C کو نقطہ O سے ملائیں اس طرح دو قائمہ الزاویہ

مثلثان OAH اور OCK بن گئی ہیں۔



ثبوت:


| بیانات   | دلائل   |
|--|---|
| قائمہ الزاویہ مثلثان $OAH \leftrightarrow OCK$ میں             | ایک ہی دائرے کے رداس                            |
| $m\overline{OA} = m\overline{OC}$                              | معلوم   |
| $m\overline{OH} = m\overline{OK}$                              | H.S کے اصول کا موضوع                            |
| $\Delta OAH \cong \Delta OCK$                                  |   |
| $m\overline{AH} = m\overline{CK}$ (i) پس                       |   |
| $m\overline{AH} = \frac{1}{2} m\overline{AB}$ (ii) لیکن        | $\overline{OH} \perp \overline{AB}$ وتر (معلوم) |
| $m\overline{CK} = \frac{1}{2} m\overline{CD}$ (iii) اسی طرح    | $\overline{OK} \perp \overline{CD}$ وتر (معلوم) |
| $m\overline{AH} = m\overline{CK}$ نیز                          | (i) میں ثابت شدہ                                |
| $\frac{1}{2} m\overline{AB} = \frac{1}{2} m\overline{CD}$ لہذا | (ii) اور (iii) کی رو سے                         |
| $m\overline{AB} = m\overline{CD}$ یا                           |   |

مثال: ثابت کریں کہ دائرہ میں سب سے لمبا وتر ایک قطر ہی ہوتا ہے۔

معلوم: ایک دائرے کا مرکز  $O$  ہے۔  $\overline{AB}$  وتر اور  $\overline{CD}$  قطر ہے۔

مطلوب: اگر وتر  $AB$  اور قطر  $CD$  دونوں مختلف ہوں تو  $m\overline{CD} > m\overline{AB}$

عمل: نقطہ  $O$  کو  $A$  اور  $B$  سے ملانے سے  $\Delta OAB$  بنتی ہے۔



ثبوت:

$\Delta OAB$  کے دو اضلاع کا مجموعہ اسکے تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے۔  
مثلاً اصول موضوعہ

$$\Rightarrow m\overline{OA} + m\overline{OB} > m\overline{AB} \quad (i)$$

$$\Rightarrow m\overline{OA} + m\overline{OB} = m\overline{CD} \quad (ii)$$


$$\Rightarrow m\overline{CD} > m\overline{AB}$$

$$m\overline{CD} > m\overline{AB}$$

یعنی پس قطر سب سے لمبا وتر ہوتا ہے۔

## مشق 9.2


- 1- ایک دائرے کے دو مساوی وتر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ثابت کریں کہ ایک وتر کے قطعات کی لمبائیاں، دوسرے وتر کے متعلقہ قطعات کی لمبائیوں کے برابر ہوتی ہیں۔
- 2- ایک دائرے کا قطر  $CD$ ، اسکے وتر  $AB$  کا عمودی ناصف ہے۔ ثابت کریں کہ  $m\overline{AC} = m\overline{BC}$
- 3- دی ہوئی شکل کے مطابق ایک دائرے کے دو متوازی وُتروں  $AB$  اور  $CD$  کا درمیانی فاصلہ معلوم کریں۔



## متفرق مشق 9


### کشیر الانتخابی سوالات

- 1- درج ذیل سوالات کے چار ممکنہ جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔



- (i) دائروں کی شکل میں  $ADB$  کہلاتا / کہلاتی ہے۔

- (a) ایک قوس  
(b) ایک قاطع خط  
(c) ایک وتر  
(d) ایک قطر




- (ii) دائروں کی شکل میں  $ACB$  کہلاتا / کہلاتی ہے۔

- (a) ایک قوس  
(b) ایک قاطع خط  
(c) ایک وتر  
(d) ایک قطر



(iii) دائروی شکل میں  $AOB$  کہلاتا/کہلاتی ہے۔




(b) ایک قاطع خط

(a) ایک قوس

(d) ایک قطر

(c) ایک وتر

(iv) دائروی شکل میں دو وتر  $AB$  اور  $CD$  مرکز سے یکساں فاصلے پر واقع ہیں وہ آپس میں ہونگے۔



(b) غیر متماثل

(a) متوازی

(d) عمود

(c) متماثل

(v) ایک ہی دائرے کے رداس ہیں۔

(b) قطر سے دو گنا

(a) تمام برابر

(d) کسی بھی وتر سے آدھے

(c) تمام غیر برابر

(vi) دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے۔

(a) رداس (b) قطر (c) قطعہ خط (d) محیط

(vii) دائرے کے وتر کے عمودی ناصف ہمیشہ گزرتے ہیں \_\_\_\_\_ سے

(a) رداس (b) محیط (c) مرکز (d) قطر

(viii) دائرے کا وہ رقبہ جو دو رداسوں اور ان کے متعلقہ قوس سے گھرا ہوا ہو کہلاتا ہے۔

(a) دائرے کا محیط (b) دائرے کا سیکٹر

(c) دائرے کا قطر (d) قطعہ دائرہ

(ix) دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے۔

(a) رداس (b) قطر (c) ایک وتر (d) ایک قوس

(x) دائرے کے کسی نقطے سے مرکز کو ملانے والا \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔

(a) محیط (b) قطر (c) رداسی قطعہ (d) احاطہ

(xi) مستوی کے تمام نقاط کا سیٹ جو معین نقطے سے برابر فاصلے پر ہوں \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔

(a) رداس (b) دائرہ (c) محیط (d) قطر

(xii) مثلث کو ظاہر کرنے کے لیے علامت ہے۔

(a)  $\angle$  (b)  $\Delta$  (c)  $\perp$  (d)  $\odot$

(xiii)

مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔

(a)  $90^\circ$  (b)  $180^\circ$  (c)  $270^\circ$  (d)  $360^\circ$ 

(xiv)

دائرہ کتنے غیر خطی نقاط سے گزرتا ہے؟

(a) ایک (b) دو (c) تین (d) ان میں سے کوئی نہیں

-2

درج ذیل اصطلاحات میں فرق بیان کریں۔ اور ان کی بذریعہ اشکال وضاحت کریں۔

- (i) ایک دائرہ اور اس کا محیط۔ (ii) ایک دائرے کا وتر اور اس کا قطر۔  
 (iii) ایک دائرے کا وتر اور اس کی قوس۔ (iv) ایک دائرہ میں صغیرہ قوس اور کبیرہ قوس۔  
 (v) ایک دائرے کا اندرونہ اور بیرونہ۔ (vi) ایک دائرے کا سیکٹر اور قطعہ۔

## خلاصہ

- دائرے کا رداس  $r$  ہو تو اس کا محیط  $2\pi r$  ہوتا ہے۔
- دائرے کا رداس  $r$  ہو تو اس کا رقبہ  $\pi r^2$  ہوتا ہے۔
- تین یا تین سے زیادہ نقاط ایک ہی خط مستقیم پر واقع ہوں تو انہیں ہم خط نقاط کہتے ہیں بصورت دیگر وہ غیر ہم خط نقاط ہوں گے۔
- مثلث کے راسوں سے گزرنے والا دائرہ محاصرہ دائرہ کہلاتا ہے۔ جبکہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف اس کے مرکز کی نشاندہی کرتے ہیں۔
- تین غیر خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک ہی دائرہ گزر سکتا ہے۔
- دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔
- دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔
- اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔
- دائرے کے دو وتر جو مرکز سے برابر فاصلہ پر ہوں، وہ متماثل ہوتے ہیں۔



## دائرے پر مماس (TANGENT TO A CIRCLE)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

درج ذیل اثباتی مسائل بمعہ نتائج صریح کو ثابت کرنا اور متعلقہ سوالات حل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا۔

اگر دائرے کا رداسی قطعہ خط اس کو کسی نقطہ پر ملے اور اس نقطہ پر عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے کا مماس ہوتا ہے۔


دائرے کا مماس اور رداسی قطعہ خط جو نقطہ تماس اور مرکز کو ملائے، ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔

کسی بیرونی نقطہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی یا اندرونی طور پر مس کریں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ بالترتیب ان کے رداسوں کے مجموعے یا فرق کے برابر ہوتا ہے۔


**مقاطع خط:** ایک ایسا خط مستقیم ہے جو دائرے کے محیط کو دو واضح نقاط پر قطع کرے۔ شکل میں دائرہ  $C_1$  کا قاطع خط "l" ہے۔

**دائرے کا مماس:** ایک ایسا خط مستقیم ہے جو دائرے کے محیط کو صرف ایک نقطہ پر مس کرے۔ شکل میں خط  $\overleftrightarrow{AB}$  دائرے  $C_2$  کا مماس ہے۔



### مسئلہ 1

**10.1 (i)** اگر دائرے کا رداسی قطعہ خط اس کو کسی نقطہ پر ملے اور اس نقطہ پر عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے کا مماس ہوتا ہے۔



**معلوم:** ایک دائرے کا مرکز O اور رداس  $\overline{OC}$  ہے۔ خط  $\overleftrightarrow{AB}$ ، رداسی قطعہ خط  $OC$  کے نقطہ C پر عمود ہے۔

**مطلوب:**  $\overleftrightarrow{AB}$ ، دائرے کے نقطہ C پر مماس ہے۔

**عمل:**  $\overleftrightarrow{AB}$  پر نقطہ C کے علاوہ کوئی دوسرا نقطہ P لیں۔ نقطہ O کو P سے ملائیں۔

**ثبوت:**

| بیانات  | دلائل  |
|---|--|
| $\triangle OCP$ میں<br>$m\angle OCP = 90^\circ$<br>$m\angle OPC < 90^\circ$ | $\overleftrightarrow{AB} \perp \overline{OC}$ (معلوم)<br>قائمہ الزاویہ مثلث میں ایک حادہ زاویہ |



مثلث میں بڑے زاویے کے سامنے بڑا ضلع

$$m\overline{OP} > m\overline{OC}$$


نقطہ  $P$  دائرے کے باہر واقع ہے اس لیے  $\overrightarrow{AB}$  کاہر نقطہ  $C$  کے علاوہ دائرے پر نہیں ہوتا۔

پس  $\overrightarrow{AB}$  دائرے کو صرف ایک نقطہ  $C$  پر مس کرتا ہے۔

یعنی  $\overrightarrow{AB}$ ، دائرے کے نقطہ  $C$  پر مماس ہے۔

## مسئلہ 2

10.1(ii) دائرے کا مماس اور رداس قطعہ خط جو نقطہ تماس اور مرکز کو ملائے، ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔



معلوم: ایک دائرے کا مرکز  $O$  اور رداس  $\overline{OC}$  ہے۔ نیز  $\overrightarrow{AB}$ ، دائرے کے نقطہ  $C$  پر مماس ہے۔

مطلوب:  $\overrightarrow{AB}$  اور  $\overline{OC}$  ایک دوسرے پر عمود ہیں۔

عمل: خط مماس  $\overrightarrow{AB}$  پر نقطہ  $C$  کے علاوہ ایک دوسرا نقطہ  $P$  لیں۔ نقطہ  $O$  کو  $P$  سے ملائیں۔  $\overline{OP}$  دائرے کو نقطہ  $D$  پر قطع کرتا ہے۔

ثبوت:

| بیانات  | دلائل                          |
|---|--------------------------------|
| $\overrightarrow{AB}$ دائرے کے نقطہ $C$ پر مماس ہے۔   | معلوم                          |
| جبکہ $\overline{OP}$ دائرے کو نقطہ $D$ پر قطع کرتا ہے | عمل                            |
| $m\overline{OC} = m\overline{OD}$ (i)                 | ایک ہی دائرے کے رداس           |
| $m\overline{OD} < m\overline{OP}$ (ii) لیکن           | نقطہ $P$ دائرے کے باہر واقع ہے |

(i) اور (ii) کی رو سے

کیونکہ  $m\overline{OC} < m\overline{OP}$


اس طرح رداس  $\overline{OC}$  ان تمام قطعات خط سے چھوٹا ہے جو نقطہ  $O$  سے  $\overline{AB}$  تک کھینچے گئے ہیں۔

پس رداس  $\overline{OC}$ ، مماس  $\overline{AB}$  پر عمود ہے یعنی  $\overline{OC} \perp \overline{AB}$

**نتیجہ مربع:** دائرے کا مرکز  $O$  ہو تو اس کے رداس  $\overline{OC}$  کے انتہائی نقطہ  $C$  پر صرف ایک مماس کھینچا جاسکتا ہے۔ ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کسی دائرے کے محیطی نقطہ  $C$  پر ایک اور صرف ایک خط مماس کھینچا جاسکتا ہے۔

### مسئلہ 3

(iii) 10.1 کسی بیرونی نقطہ سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔



معلوم: ایک دائرے کا مرکز  $O$  ہے اور اسکے بیرونی نقطہ  $P$  سے  $\overline{PA}$  اور  $\overline{PB}$  دو مماس ہیں۔

مطلوب:  $m\overline{PA} = m\overline{PB}$

عمل: نقطہ  $O$  کو  $A, B, C, D$  سے ملائیں۔ اس طرح دو قائمہ الزاویہ مثلثان  $OAP$  اور  $OBP$  بنتی ہیں۔

**ثبوت:**


| بیانات                                     | دلائل  |
|--|--|
| مثلثان $OAP \leftrightarrow OBP$ میں       |  |
| $m\angle OAP = m\angle OBP = 90^\circ$     | دائرے کے رداس، $\overline{PA}$ اور $\overline{PB}$ مماسوں پر عمود ہیں۔ |
| $\overline{OP} \cong \overline{OP}$        | مشترک وتر  |
| $m\overline{OA} = m\overline{OB}$          | ایک ہی دائرے کے مماس   |
| اس لیے $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ | قائمہ الزاویہ مثلثان میں وتر۔ ضلع کا موضوع                             |
| پس $m\overline{PA} = m\overline{PB}$       |  |

**نوٹ:** مماس کی لمبائی کسی دائرے کے بیرونی نقطہ  $P$  سے نقطہ تماس تک ہوتی ہے۔



**نتیجہ مربع:** اگر مرکز  $O$  والے دائرے کے بیرونی نقطہ  $P$  سے  $\vec{PA}$  اور  $\vec{PB}$  دو مماس کھینچیں جائیں تو  $\vec{OP}$ ، وتر  $\vec{AB}$  کا عمودی ناصف ہو گا۔

**مثال 1:** دیے ہوئے دائرے کا مرکز  $O$  اور قطر  $\vec{AB}$  ہے، نقاط  $A$  اور  $B$  پر مماس کھینچے گئے ہیں۔ ثابت کریں کہ دونوں مماس متوازی ہیں۔




**معلوم:** دیے ہوئے دائرے کا مرکز  $O$  اور قطر  $\vec{AB}$  ہے۔ خط  $CD$  دائرے کے نقطہ  $A$  پر مماس ہے اور خط  $EF$  دائرے کے نقطہ  $B$  پر دوسرا مماس ہے۔

**مطلوب:**  $\vec{CD} \parallel \vec{EF}$

**ثبوت:**

| بیانات   | دلائل  |
|--|--|
| ایک دائرے کا مرکز $O$ اور قطر $\vec{AB}$ ہے                    | معلوم  |
| $\therefore \vec{OA}$ اور $\vec{OB}$ ایک ہی دائرے کے رداس ہیں۔ |  |
| نیز $\vec{CD}$ دائرے کے نقطہ $A$ پر مماس ہے۔                   | معلوم  |
| اس لیے $\vec{OA} \perp \vec{CD}$                               | مسئلہ 1 کی رو سے   |
| $\Rightarrow \vec{AB} \perp \vec{CD}$ (i)                      |  |
| اسی طرح $\vec{EF}$ دائرے کے نقطہ $B$ پر مماس ہے۔               | معلوم  |
| اس لیے $\vec{OB} \perp \vec{EF}$                               | مسئلہ 1 کی رو سے   |
| $\Rightarrow \vec{AB} \perp \vec{EF}$ (ii)                     |  |
| پس $\vec{CD} \parallel \vec{EF}$                               | (i) اور (ii) کی رو سے ( $\vec{AB} \perp \vec{CD}$ اور $\vec{AB} \perp \vec{EF}$ پر عمود ہیں) |

**مثال 2:** ثابت کریں کہ دائرے کے کسی وتر کے سروں پر جو مماس کھینچے جائیں وہ وتر کے ساتھ برابر زاویے بناتے ہیں۔



**معلوم:** ایک دائرے کا مرکز O ہے اور  $\overline{AB}$  وتر ہے۔  $\overleftrightarrow{CAD}$ ، نقطہ A پر مماس ہے اور  $\overleftrightarrow{EBF}$ ، نقطہ B پر مماس ہے۔

**مطلوب:**  $m\angle BAD = m\angle ABF$

**عمل:** نقطہ O کو A اور B سے ملائیں۔ اس طرح  $\triangle OAB$  بنتی ہے نیز شکل کے مطابق  $\angle 1$ ،  $\angle 2$ ،  $\angle 3$  اور  $\angle 4$  لکھیں۔

**ثبوت:**

| بیانات  | دلائل   |
|---|---|
| $\triangle OAB$ میں<br>$m \overline{OA} = m \overline{OB}$ $\therefore$ | عمل<br>ایک ہی دائرے کے رداس                   |
| اس لیے (i) $m\angle 1 = m\angle 2$                                      | $\triangle OAB$ کے مساوی اضلاع کے مخالف زاویے |
| نیز $\overline{OA} \perp \overleftrightarrow{CD}$                       | رداس، خط مماس پر عمود ہے                      |
| اس لیے (ii) $m\angle 3 = m\angle OAD = 90^\circ$                        | رداس، خط مماس پر عمود ہے                      |
| اسی طرح $\overline{OB} \perp \overleftrightarrow{EF}$                   |   |
| اس لیے (iii) $m\angle 4 = m\angle OBF = 90^\circ$                       |   |
| پس (iv) $m\angle 3 = m\angle 4$   | (ii) اور (iii) کی رو سے                       |
| $m\angle 1 + m\angle 3 = m\angle 2 + m\angle 4$                         | (i) اور (iv) کو جمع کرنے سے                   |
| $m\angle BAD = m\angle ABF$   | یعنی  |




## مشق 10.1

1- ثابت کریں کہ ایک دیے ہوئے دائرے کے قطر کے سروں پر بنائے گئے مماس آپس میں متوازی ہونگے۔

2- دو ہم مرکز دائروں کے قطر 10 سم اور 5 سم ہیں۔ بیرونی دائرے کے

اس وتر کی لمبائی معلوم کریں جو اندرونی دائرے کو مس کرتا ہو۔  
(اشارہ) بذریعہ شکل




$$m\overline{AB} = 2x = 2\sqrt{25 - 6.25}$$

$$= 2\sqrt{18.75} \approx 8.7\text{cm}$$

3-  $\overleftrightarrow{AB}$  اور  $\overleftrightarrow{CD}$  دو دائروں کے مشترک مماس ہیں۔ اگر A اور C پہلے دائرے کے نقاط تماس ہوں جبکہ B اور D دوسرے دائرے کے نقاط تماس ہوں تو ثابت کریں کہ  $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$

## مسئلہ 4(A)

(iv) 10.1 اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہوں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔



معلوم: دو دائرے جن کے مراکز بالترتیب D اور F ہیں۔ یہ دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر نقطہ C پر مس کرتے ہیں۔ اس طرح ان دائروں کے رداس بالترتیب  $\overline{CD}$  اور  $\overline{CF}$  ہیں۔

مطلوب: نقطہ C مراکز D اور F کو ملانے والے قطعہ خط پر واقع ہے اور  $m\overline{DF} = m\overline{DC} + m\overline{CF}$

عمل: دو دائروں کے نقطہ تماس C پر ایک مشترک مماس  $\overleftrightarrow{ACB}$  کھینچیں۔

| بیانات  | دلائل   |
|---|---|
| <p>دونوں دائرے بیرونی طور پر نقطہ <math>C</math> پر مس کرتے ہیں جبکہ <math>\overline{CD}</math> پہلے دائرے کا رداس ہے اور <math>\overline{ACB}</math> مشترک مماس ہے۔</p> <p>اس لیے (i) <math>m\angle ACD = 90^\circ</math></p> <p>اسی طرح <math>\overline{CF}</math> دوسرے دائرے کا رداس ہے اور <math>\overline{ACB}</math> مشترک مماس ہے۔</p> <p>اس لیے (ii) <math>m\angle ACF = 90^\circ</math></p> <p>(i) اور (ii) کو جمع کرنے سے</p> <p>(iii) <math>m\angle DCF = 180^\circ</math></p> <p>پس <math>DCF</math> ایک قطعہ خط ہے جس میں نقطہ <math>C</math>، نقاط <math>D</math> اور <math>F</math> کے درمیان واقع ہے۔</p> <p>اور <math>m\overline{DF} = m\overline{DC} + m\overline{CF}</math></p> | <p>رداس <math>\overline{CD}</math> مماس <math>\overline{AB}</math> پر عمود ہے۔</p> <p>رداس <math>\overline{CF}</math> مماس <math>\overline{AB}</math> پر عمود ہے۔</p> <p>متصلہ سپلیمنٹری زاویوں کا مجموعہ</p> |


## مشق 10.2

- 1- ایک دائرہ جس کا مرکز  $O$  ہے۔  $\overline{AB}$  اور  $\overline{CD}$  اسکے دو مساوی وتر ہیں۔ دونوں وُتروں کے وسطی نقاط بالترتیب  $H$  اور  $K$  ہیں۔ ثابت کریں  $\overline{HK}$  دونوں وُتروں  $\overline{AB}$  اور  $\overline{CD}$  کے ساتھ یکساں زاویے بناتا ہے۔
- 2- ایک دائرے کا رداس 2.5 سم ہے۔ اس کے دو وتر  $\overline{AB}$  اور  $\overline{CD}$  ایک دوسرے سے 3.9 سم کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اگر پہلے وتر  $\overline{AB}$  کی لمبائی 1.4 سم ہو تو دوسرے وتر کی لمبائی معلوم کریں۔
- 3- دو قاطع دائروں کے رداس 10 سم اور 8 سم ہیں۔ اگر ان کے مشترک وتر کی لمبائی 6 سم ہو تو ان دائروں کے مراکز کا درمیانی فاصلہ معلوم کریں۔
- 4- ثابت کریں کہ کسی دائرے میں سب سے بڑا وتر اس دائرے کا قطر ہوتا ہے۔



## مسئلہ 4(B)

(v) 10.1 اگر دو دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کریں تو ان کا نقطہ تماس ان کے مراکز کو ملانے والا قطعہ خط پر واقع ہوتا ہے اور ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔



معلوم: دو دائرے جن کے مراکز بالترتیب D اور F ہیں وہ ایک دوسرے کو اندرونی طور پر نقطہ C پر مس کرتے ہیں۔ اس طرح ان دائروں کے رداس بالترتیب  $\overline{CD}$  اور  $\overline{CF}$  ہیں۔

مطلوب: نقطہ C، مراکز D اور F کو ملانے والے خط پر واقع ہے اور  $m\overline{DF} = m\overline{DC} - m\overline{CF}$ ۔

عمل: دونوں دائروں کے نقطہ تماس C پر ایک مشترک مماس  $\overleftrightarrow{ACB}$  کھینچیں۔

ثبوت:

| بیانات  | دلائل   |
|---|---|
| دونوں دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر نقطہ C پر مس کرتے ہیں۔ جبکہ $\overleftrightarrow{ACB}$ مشترک مماس ہے اور $\overline{CD}$ پہلے دائرے کا رداس ہے۔ |   |
| اس لیے (i) $m\angle ACD = 90^\circ$   | رداس $\overline{CD}$ مماس $\overleftrightarrow{AB}$ پر عمود ہے۔ |
| اسی طرح $\overleftrightarrow{ACB}$ مشترک مماس ہے اور $\overline{CF}$ دوسرے دائرے کا رداس ہے۔  |   |
| اس لیے (ii) $m\angle ACF = 90^\circ$  | رداس $\overline{CF}$ مماس $\overleftrightarrow{AB}$ پر عمود ہے۔ |
| (i) اور (ii) کی رو سے $m\angle ACD = m\angle ACF = 90^\circ$  |   |




$\angle ACF$  اور  $\angle ACD$  مقدار میں برابر ہیں اور نقطہ  $F$ ، نقاط  $C$  اور  $D$  کے درمیان واقع ہے۔

$$m\overline{DC} = m\overline{DF} + m\overline{FC} \quad \text{اس لیے}$$

$$m\overline{DC} - m\overline{FC} = m\overline{DF} \quad \text{یعنی}$$

$$m\overline{DF} = m\overline{DC} - m\overline{FC} \quad \text{یا}$$



**مثال 1:** تین دائروں میں ہر جوڑا آپس میں بیرونی طور پر مس کرتا ہے۔ ثابت کریں کہ مراکز کو ملانے سے بننے والی مثلث کا احاطہ ان دائروں کے قطروں کے مجموعے کے برابر ہو گا۔

**معلوم:**  $S_1, S_2, S_3$  اور  $s_3$  دائروں کے بالترتیب مراکز نقاط  $A, B, C$  اور ان کے رداس  $r_1, r_2, r_3$  ہیں۔ دائروں کا ہر جوڑا آپس میں بیرونی طور پر نقاط  $E, D, F$  پر مس کرتا ہے۔ اس طرح ان دائروں کے مراکز کو ملانے سے مثلث  $ABC$  بنتی ہے۔

**مطلوب:**  $2r_1 + 2r_2 + 2r_3 = d_1 + d_2 + d_3$  مثلث  $ABC$  کا احاطہ  
دائروں کے قطروں کا مجموعہ = مثلث  $ABC$  کا احاطہ

**ثبوت:**

| بیانات  | دلائل |
|---|-------|
| تین دائروں کے مراکز بالترتیب $A, B, C$ ہیں۔ دائروں کا ہر جوڑا آپس میں بیرونی طور پر نقاط $E, D, F$ پر مس کرتا ہے۔   | معلوم |
| اس لیے (i) $m\overline{AB} = m\overline{AF} + m\overline{FB}$   |       |
| (ii) $m\overline{BC} = m\overline{BD} + m\overline{DC}$   |       |
| اور (iii) $m\overline{CA} = m\overline{CE} + m\overline{EA}$  |       |
| (i), (ii) اور (iii) کو جمع کرنے سے  |       |
| $m\overline{AB} + m\overline{BC} + m\overline{CA} = m\overline{AF} + m\overline{FB} + m\overline{BD}$<br>$+ m\overline{DC} + m\overline{CE} + m\overline{EA}$ |       |



$$d_3 = 2r_3 \text{ اور } d_2 = 2r_2, d_1 = 2r_1$$

دائرے کے قطر ہیں

$$= (m\overline{AF} + m\overline{EA}) + (m\overline{FB} + m\overline{BD}) + (m\overline{CD} + m\overline{CE})$$

$$\Delta ABC \text{ کا احاطہ} = 2r_1 + 2r_2 + 2r_3$$

$$= d_1 + d_2 + d_3$$

$$= \text{دائرؤں کے قطرؤں کا مجموعہ}$$

### مشق 10.3

1- دو دائرے جن کے رداس 5 سم اور 4 سم ہیں ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہیں۔ تب 2.5 سم والا ایک دائرہ اس طرح بنائیں جو پہلے جوڑے کو بھی بیرونی طور پر مس کرے۔

2- اگر دو دائروں کے مراکز کا فاصلہ، دائروں کے رداسوں کے مجموعہ یا ان کے فرق کے برابر ہو تو وہ دائرے ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں۔


### متفرق مشق 10

کثیر الانتخابی سوالات

1- دیے ہوئے سوالات کے چند ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست کے لیے (✓) لکھیں۔

(i) متصلہ دائرے کی شکل میں  $\overleftrightarrow{PTQ}$  کو کہا جاتا ہے۔

- (a) ایک قوس (b) ایک وتر  
(c) ایک مماس (d) ایک قاطع خط




(ii) مرکز O والے دائرے میں  $\overline{OT}$  رداس ہے اور  $\overleftrightarrow{PTQ}$  ایک خط مماس ہے تو

$$\overline{OT} \perp \overleftrightarrow{PQ} \quad (a)$$


$$\overleftrightarrow{PQ} \not\perp \overline{OT} \quad (b)$$

$$\overline{OT} \parallel \overleftrightarrow{PQ} \quad (c)$$

$$\overleftrightarrow{PQ} \text{ کا عمودی ناصف } \overline{OT} \text{ ہے} \quad (d)$$




(iii) دی ہوئی شکل میں نصف دائرے کا رقبہ ہو گا۔ اگر  $m\overline{OA} = 20\text{cm}$  اور  $\pi \simeq 3.1416$



(a) 62.83 مربع سم (b) 314.16 مربع سم

(c) 436.20 مربع سم (d) 628.32 مربع سم

(iv) دی ہوئی شکل میں نصف دائرے کا احاطہ ہو گا۔ اگر  $m\overline{OA} = 20\text{سم}$  اور  $\pi \simeq 3.1416$



(a) 31.42 سم (b) 62.832 سم (c) 125.65 سم (d) 188.50 سم

(v) ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہتے ہیں۔

(a) دائرے کا Sine (b) دائرے کا Cosine

(c) دائرے کا Tangent (d) دائرے کا Secant

(vi) ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو، کہتے ہیں۔

(a) دائرے کا Sine (b) دائرے کا Cosine

(c) دائرے کا Tangent (d) دائرے کا Secant

(vii) ایک دائرے کے بیرونی نقطہ سے دو کھینچے گئے مماس لمبائی کے لحاظ سے ----- ہوتے ہیں۔

(a) نصف (b) برابر (c) دو گنا (d) تین گنا

(viii) ایک دائرے کا صرف ایک ہی ----- ہوتا ہے۔

(a) خطِ قاطع (b) وتر (c) قطر (d) مرکز

(ix) ایک خطِ مماس دائرے کو ----- کاٹتا ہے۔

(a) تین نقاط پر (b) دو نقاط پر (c) ایک نقطہ پر (d) کسی نقطہ پر بھی نہیں



(x) دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں ----- ہوتے ہیں۔


(a) متوازی (b) غیر متوازی (c) ہم خط (d) عمود

(xi) دو بیرونی طور پر مس کرنے والے مساوی دائروں کے مراکز کا فاصلہ ہوتا ہے۔

(a) صفر لمبائی (b) دائرے کا رداس

(c) دائرے کا قطر (d) دائرے کے قطر کا دو گنا


(xii) دیے ہوئے دائرے کی شکل میں مرکز  $O$  اور رداس 5 سم ہے۔ اگر ایک وتر مرکز سے 4 سم کے فاصلے پر ہو تو وتر کی لمبائی ہوگی۔



(a) 4 سم (b) 6 سم (c) 7 سم (d) 9 سم


(xiii) دیے ہوئے دائرے کی شکل میں مرکز  $O$  اور قطر  $AB$  ہے۔ اگر  $m\angle AOC = 120^\circ$  اور  $\overline{DC} \parallel \overline{AB}$  تو

$m\angle ACD$  کے برابر ہوتا ہے۔



(a)  $40^\circ$  (b)  $30^\circ$  (c)  $50^\circ$  (d)  $60^\circ$

## خلاصہ



← **قاطع** خط ایک ایسا خط مستقیم ہے جو دائرے کے محیط کو دو واضح نقاط پر قطع کرے۔ شکل میں قاطع  $\overleftrightarrow{CD}$  دائرہ کو دو واضح نقاط P اور Q قطع کرتا ہے۔

← دائرے کا **ماس** ایک ایسا خط ہے۔ جو دائرے کے محیط کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہے۔ شکل میں دائرے کے نقطہ T پر  $\overleftrightarrow{AB}$  ماس ہے۔

← مماس کی لمبائی دائرے کے کسی بیرونی نقطہ سے **نقطہ تماس** تک ہوتی ہے۔

← اگر دائرے کے کسی نقطہ میں سے گزرنے والے رداسی قطعہ خط پر اسی نقطہ سے عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے کا مماس ہوتا ہے۔

← دائرے کا مماس اور رداسی قطعہ خط جو نقطہ تماس اور مرکز کو ملائے ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔

← کسی بیرونی نقطہ سے دائرے پر کھینچے گئے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

← اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی یا اندرونی طور پر مس کریں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ بالترتیب ان کے رداسوں کے مجموعے یا فرق کے برابر ہوتا ہے۔



## وتر اور قوسیں

## (CHORDS AND ARCS)


طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

درج ذیل اثباتی مسائل بمعہ نتائج صریح کو ثابت کرنا اور متعلقہ سوالات حل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا۔

- ✓ دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو قوسیں متماثل ہوں تو ان کے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔
- ✓ دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو وتر لمبائی میں برابر ہوں تو وہ دو متماثل قوسیں قطع کرتے ہیں۔
- ✓ دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو وتر لمبائی میں برابر ہوں تو ان سے بننے والے مرکزی زاویے بھی مقدار میں برابر ہوتے ہیں۔
- ✓ دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوں تو ان زاویوں کو بنانے والے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

# مسئلہ 1

دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو قوسیں متماثل ہوں تو ان کے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔



معلوم: ABCD اور A'B'C'D' دو متماثل دائرے ہیں۔ جن کے مراکز بالترتیب O اور O' ہیں

$$m\widehat{ADC} = m\widehat{A'D'C'} \quad \text{یعنی} \quad \widehat{ADC} \cong \widehat{A'D'C'} \quad \text{اور}$$

$$m\widehat{AC} = m\widehat{A'C'} \quad \text{مطلوب:}$$

عمل: O کو A اور C سے، O' کو A' اور C' سے ملائیں۔

ثبوت:

| بیانات   | دلائل   |
|--|---|
| ABCD اور A'B'C'D' دو متماثل دائرے ہیں جن کے مراکز بالترتیب O اور O' ہیں۔ | معلوم   |
| $m\widehat{ADC} = m\widehat{A'D'C'}$                                     | معلوم   |
| اس لیے $m\angle AOC = m\angle A'O'C'$                                    | متماثل دائروں میں متماثل یا لمبائی میں برابر قوسوں کے مرکزی زاویے |
| اب مثلثان AOC اور A'O'C' کی مطابقت میں                                   | متماثل دائروں کے رداس   |
| $m\overline{OA} = m\overline{O'A'}$                                      | ثابت شدہ  |
| $m\angle AOC = m\angle A'O'C'$   | متماثل دائروں کے رداس   |
| $m\overline{OC} = m\overline{O'C'}$                                      |   |
| $\Delta AOC \cong \Delta A'O'C'$ ∴                                       | S.A.S $\cong$ S.A.S   |




$$m\overline{AC} = m\overline{A'C'}$$

اور  
اسی طرح یہ مسئلہ ایک ہی دائرے میں بھی ثابت کیا جاسکتا ہے۔

## مسئلہ 2

(عکس مسئلہ 1)

دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو وتر لंबائی میں برابر ہوں تو وہ دو متماثل قوسیں قطع کرتے ہیں۔



معلوم: ABCD اور A'B'C'D' دو متماثل دائرے ہیں جن کے مراکز بالترتیب O اور O' ہیں

$$m\overline{AC} = m\overline{A'C'}$$

$$m\widehat{ADC} = m\widehat{A'D'C'}$$

یا مطلوب:  $\widehat{ADC} \cong \widehat{A'D'C'}$

عمل: O کو A اور C سے، O' کو A' اور C' سے ملائیں۔

ثبوت:

| بیانات   | دلائل                                       |
|--|---|
| $\triangle AOC$ اور $\triangle A'O'C'$ کی مطابقت میں | متماثل دائروں کے رداس                       |
| $m\overline{OA} = m\overline{O'A'}$                  | متماثل دائروں کے رداس                       |
| $m\overline{OC} = m\overline{O'C'}$                  | معلوم                                       |
| $m\overline{AC} = m\overline{A'C'}$                  | S.S.S $\cong$ S.S.S                         |
| $\triangle AOC \cong \triangle A'O'C'$               | مقدار میں برابر مرکزی زاویوں کے سامنے قوسیں |
| $m\angle AOC = m\angle A'O'C'$                       |   |
| $m\widehat{ADC} = m\widehat{A'D'C'}$                 | پس  |

**مثال 1:** ایک دائرے کا مرکز  $O$  ہے اور  $\overline{AB}$  اس کا وتر ہے۔ دائرے پر موجود ایک نقطہ  $P$  اس کے رداسوں  $\overline{OA}$  اور  $\overline{OB}$  سے یکساں

فاصلے پر ہے۔ ثابت کریں کہ  $m\widehat{AP} = m\widehat{BP}$

**معلوم:** مرکز  $O$  والے دائرے کا وتر  $\overline{AB}$  ہے۔ دائرے پر موجود ایک نقطہ  $P$  اسکے رداسوں  $\overline{OA}$  اور  $\overline{OB}$  سے یکساں


فاصلے پر ہے یعنی  $m\overline{PR} = m\overline{PS}$

**مطلوب:**  $m\widehat{AP} = m\widehat{BP}$

**عمل:** نقطہ  $O$  کو  $P$  سے ملائیں۔ دی ہوئی شکل کے مطابق

$\angle 1$  اور  $\angle 2$  بنائیں۔



**ثبوت:**



| بیانات                                   | دلائل                                       |
|--|---|
| قائمۃ الزاویہ مثلثان $OPR$ اور $OPS$ میں | مشترک                                       |
| $m\overline{OP} = m\overline{OP}$        | معلوم                                       |
| $m\overline{PR} = m\overline{PS}$        | قائمۃ الزاویہ مثلثان میں                    |
| $\triangle OPR \cong \triangle OPS$      | $H.S \cong H.S$                             |
| $m\angle 1 = m\angle 2$                  | دائرے کے مرکزی زاویے                        |
| $m\widehat{AP} = m\widehat{BP}$          | مقدار میں برابر مرکزی زاویوں کے سامنے قوسیں |

### مسئلہ 3

دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو وتر لंबائی میں برابر ہوں تو ان سے بننے والے مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوتے ہیں۔





معلوم: دو متماثل دائروں ABC اور A'B'C' کے مراکز بالترتیب O اور O' ہیں

$$m\overline{AC} = m\overline{A'C'} \text{ یا } \overline{AC} \cong \overline{A'C'} \text{ اور}$$

$$\angle AOC \cong \angle A'O'C'$$

عمل: فرض کریں کہ اگر  $m\angle AOC \neq m\angle A'O'C'$  ہو تو  $\angle AOC \cong \angle A'O'D'$ ۔  $\angle AOC \cong \angle A'O'D'$  کو A' اور O' سے ملائیں۔

ثبوت:

| بیانات  | دلائل  |
|---|--|
| $\angle AOC \cong \angle A'O'D'$  | عمل  |
| اس لیے (i) $\overline{AC} \cong \overline{A'D'}$  | متماثل دائروں میں متماثل مرکزی زاویوں کی قوسیں |
| (ii) $m\overline{AC} = m\overline{A'D'}$ یا $\overline{AC} \cong \overline{A'D'}$       | مسئلہ 1 کی رو سے                               |
| لیکن (iii) $m\overline{AC} = m\overline{A'C'}$ یا $\overline{AC} \cong \overline{A'C'}$ | معلوم  |
| $m\overline{A'C'} = m\overline{A'D'}$ $\therefore$                                      | (ii) اور (iii) کی رو سے                        |
| جو صرف تبھی ممکن ہے جب C' اور D' منطبق ہو جائیں۔  |  |
| پس (iv) $m\angle A'O'C' = m\angle A'O'D'$   | عمل  |
| لیکن (v) $m\angle AOC = m\angle A'O'D'$   |  |
| $m\angle AOC = m\angle A'O'C'$  | (iv) اور (v) کی رو سے                          |

**نتیجہ صریح 1:** دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرے میں اگر دو مرکزی زاویے مقداروں میں برابر ہوں

قطاع (Sectors) دائرے بھی برابر ہوتے ہیں۔

**نتیجہ صریح 2:** دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرے میں اگر دو قوسیں لمبائیوں میں غیر برابر ہوں تو ان سے بننے والے

مرکزی زاویے بھی مقداروں میں غیر برابر ہوتے ہیں۔


**مثال 1:** کسی دائرے میں مرکزی زاویے کا اندرونی ناصف مرکزی زاویے سے بننے

والی قوس کی تنصیف کرتا ہے۔

معلوم: O مرکز والے دائرے میں  $\overline{OP}$  مرکزی زاویہ AOB کا اندرونی ناصف ہے۔

$$m\widehat{AP} = m\widehat{BP} \text{ یا } \widehat{AP} \cong \widehat{BP}$$


عمل:  $\overline{AP}$  اور  $\overline{BP}$  دو وتر کھینچیں شکل کے مطابق  $\angle 1$  اور  $\angle 2$  بنائیں۔



ثبوت:

| بیانات   | دلائل   |
|--|---|
| $\Delta OAP \leftrightarrow \Delta OBP$ میں<br>$m \overline{OA} = m \overline{OB}$<br>$m \angle 1 = m \angle 2$<br>$m \overline{OP} = m \overline{OP}$ اور<br>$\Delta OAP \cong \Delta OBP$<br>$\overline{AP} \cong \overline{BP}$ اور<br>$\widehat{AP} \cong \widehat{BP}$ پس | <p>ایک ہی دائرے کے دو اس</p> <p><math>\overline{OP}</math> مرکزی زاویہ <math>\angle AOB</math> کا نصف ہے۔ (معلوم)</p> <p>مشترک</p> <p>(S.A.S <math>\cong</math> S.A.S)</p> <p>متماثل مثلثوں کے متماثل بازو</p> <p>دائرے میں متماثل وتروں کے سامنے قوسیں</p> |

**مثال 2:** کسی دائرے میں قطروں کا کوئی جوڑا ایک دوسرے پر عمود ہو تو ان کے سروں کو ترتیب وار ملانے سے مربع بنتا ہے۔



**معلوم:** O مرکز والے دائرے میں دو قطر  $\overline{AC}$  اور  $\overline{BD}$  ایک دوسرے پر عمود ہیں۔ قطروں کے سروں کو بالترتیب ملانے سے ABCD ایک چوک بنتی ہے۔

**مطلوب:** ABCD ایک مربع شکل ہے۔

**عمل:** دی ہوئی شکل کے مطابق  $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4, \angle 5$  اور  $\angle 6$  لکھیں۔


ثبوت:

| بیانات  | دلائل  |
|---|--|
| $m \angle 1 = m \angle 2 = m \angle 3 = m \angle 4 = 90^\circ$<br>$m \widehat{AB} = m \widehat{BC} = m \widehat{CD} = m \widehat{DA}$ اس لیے<br>$m \overline{AB} = m \overline{BC} = m \overline{CD} = m \overline{DA}$ (i)<br>$m \angle A = m \angle 5 + m \angle 6$ نیز<br>$45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$ (ii)<br>$m \angle A = m \angle C = m \angle D = 90^\circ$ (iii)<br>پس ABCD ایک مربع ہے۔ | <p>قطروں کا جوڑا ایک دوسرے پر عمود ہے۔ (معلوم)</p> <p>دائرے میں مساوی مرکزی زاویوں کی متقابلہ قوسیں</p> <p>مساوی قوسوں کے وتر</p> <p>(iii) اور (ii) کی رو سے</p> |



## مسئلہ 4

11.1(iv) دو متماثل دائروں یا ایک دائرہ میں اگر دو مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوں تو ان زاویوں کو بنانے والے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔



معلوم: دو مساوی دائروں ABCD اور A'B'C'D' کے مراکز بالترتیب O اور O' ہیں۔  $\overline{AC}$  اور  $\overline{A'C'}$  دونوں دائروں

کے بالترتیب وتر ہیں اور  $m\angle AOC = m\angle A'O'C'$

مطلوب:  $m\overline{AC} = m\overline{A'C'}$

ثبوت:

| دلائل                          | بیانات   |
|--------------------------------|--|
| دو متماثل دائروں کے رداس معلوم | $\triangle OAC \longleftrightarrow \triangle O'A'C'$ |
| دو متماثل دائروں کے رداس       | $m\overline{OA} = m\overline{O'A'}$                  |
|                                | $m\angle AOC = m\angle A'O'C'$                       |
|                                | $m\overline{OC} = m\overline{O'C'}$                  |
| $SAS \cong SAS$                | $\triangle OAC \cong \triangle O'A'C'$               |
|                                | $m\overline{AC} = m\overline{A'C'}$                  |
|                                | اس لیے پس  |

## مشق 11.1

- 1- ایک دائرے میں دو مساوی قطر  $AB$  اور  $CD$  ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ثابت کریں کہ  $m \overline{AD} = m \overline{BC}$
- 2- ثابت کریں کہ کسی دائرے میں دو متوازی اور مساوی وتروں کے درمیان بننے والی قوسیں مساوی ہوتی ہیں۔
- 3- ہندسی طور پر ثابت کریں کہ باہم تنصیف کرنے والے وتر دائرے کے قطر ہوں گے۔
- 4- ایک دائرے کا مرکز  $O$  ہے۔ اس میں قوس  $ACB$  کا وسطی نقطہ  $C$  ہے۔ ثابت کریں کہ قطعہ خط  $OC$  وتر  $AB$  کی تنصیف کرتا ہے۔

## متفرق مشق 11

### کثیر الانتخابی سوالات

- 1- دیے گئے سوالات کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست کے لیے (✓) لگائیں۔
  - (i) ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر  $60^\circ$  کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس \_\_\_\_\_ ہو گا۔
 

|          |          |
|----------|----------|
| (a) 1 سم | (b) 2 سم |
| (c) 3 سم | (d) 4 سم |
  - (ii) ایک دائرے میں وتر اور رداس کی لمبائیاں برابر ہیں۔ وتر سے بننے والا مرکز زاویہ \_\_\_\_\_ ہو گا۔
 

|                |                |
|----------------|----------------|
| (a) $30^\circ$ | (b) $45^\circ$ |
| (c) $60^\circ$ | (d) $75^\circ$ |
  - (iii) ایک دائرے کی دو متماثل قوسوں میں سے اگر ایک قوس کا مرکز زاویہ  $30^\circ$  ہو تو دوسری کا مرکز زاویہ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔
 

|                |                |
|----------------|----------------|
| (a) $15^\circ$ | (b) $30^\circ$ |
| (c) $45^\circ$ | (d) $60^\circ$ |
  - (iv) ایک قوس کا مرکز زاویہ  $40^\circ$  ہے اُسکے متعلقہ وتر کا مرکز زاویہ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔
 

|                |                |
|----------------|----------------|
| (a) $20^\circ$ | (b) $40^\circ$ |
| (c) $60^\circ$ | (d) $80^\circ$ |



(v) دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں۔ وہ آپس میں \_\_\_\_\_ ہوں گے۔

(a) متماثل (b) غیر متماثل

(c) متزاہب (d) متوازی

(vi) ایک قوس کا مرکزی زاویہ  $60^\circ$  ہے اُسکے وتر کا مرکزی زاویہ \_\_\_\_\_ ہو گا۔

(a)  $20^\circ$  (b)  $40^\circ$

(c)  $60^\circ$  (d)  $80^\circ$

(vii) دائرے کے نصف محیط کا مرکزی زاویہ \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(a)  $90^\circ$  (b)  $180^\circ$

(c)  $270^\circ$  (d)  $360^\circ$

(viii) اگر دائرے کا وتر مرکزی زاویہ  $180^\circ$  بنائے تو وتر کی لمبائی \_\_\_\_\_ ہو گی۔

(a) رداس سے کم (b) رداس کے برابر

(c) رداس کا دو گنا (d) ان میں سے کوئی نہیں

(ix) اگر ایک دائرے کا وتر مرکزی زاویہ  $60^\circ$  بناتا ہے تب وتر اور رداس کی لمبائیاں آپس میں \_\_\_\_\_ ہوتی ہیں۔

(a) برابر (b) غیر برابر

(c) متوازی (d) عمود

(x) ایک دائرے میں دو غیر متماثل مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسیں \_\_\_\_\_ ہوتی ہیں۔

(a) متماثل (b) غیر متماثل

(c) متوازی (d) عمود

## خلاصہ

کسی دائرے میں گھومنے والے نقطہ سے اُسی نقطہ تک بننے والا راستہ، **محیط** کہلاتا ہے جبکہ محیط کا ایک ٹکڑا دائرے کی **قوس** کہلاتا ہے۔

محیط پر دیے ہوئے دو نقاط کو ملانے والا قطعہ خط دائرے کا **وتر** ہوتا ہے۔

دائرے کا وہ ٹکڑا جو اسکی قوس اور متعلقہ وتر نے گھیرا ہو **قطعہ دائرہ** کہلاتا ہے۔

دائرہ کے دور داسی قطعات اور ان سے متعلقہ قوس سے گھرا ہوا علاقہ **دائرے کا سیکٹر** کہلاتا ہے۔

کسی دائرے کے مرکز سے گزرنے والا قطعہ خط وتر کی تنصیف کرے تو وہ وتر پر عمود ہو گا نیز قطعہ خط جو دائرے کے وتر کی عمودی تنصیف کرے۔ وہ دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے۔

دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو قوسیں متماثل ہوں تو ان کے وتر کی لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔

دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو وتر لمبائی میں برابر ہوں تو وہ دو متماثل قوسیں قطع کرتے ہیں۔

دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو وتر لمبائی میں برابر ہوں تو ان سے بننے والے مرکزی زاویے بھی مقدار میں برابر ہوتے ہیں۔

دو متماثل دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوں تو ان زاویوں کو بنانے والے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔



# قطعہ دائرہ میں زاویہ

## (ANGLE IN A SEGMENT OF A CIRCLE)

طلباء اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد درج ذیل باتوں سے واقف ہوں گے

درج ذیل اثباتی مسائل بمعہ نتائج صریح کو ثابت کرنا اور متعلقہ سوالات حل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا۔

کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔


زاویہ جو نصف قطعہ دائرہ میں ہو قائمہ زاویہ ہوتا ہے۔ جو نصف سے بڑے قطعہ دائرے میں ہو حادہ زاویہ

ہوتا ہے اور جو نصف سے چھوٹے قطعہ دائرے میں ہو، منفرجہ زاویہ ہوتا ہے۔

کسی دائرے کی دائروی چوکور کے متقابلہ زاویے سپلیمنٹری زاویے ہوتے ہیں۔

## مسئلہ 1

(i) 12.1 کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔



معلوم: O مرکز والے دائرے میں  $\widehat{AC}$  قوس صغیرہ ہے جبکہ  $\angle AOC$  اس کا مرکزی زاویہ اور متعلقہ قوس کبیرہ کا محصور زاویہ ABC ہے۔


مطلوب:  $m \angle AOC = 2m \angle ABC$

عمل: نقطہ B کو O سے ملا کر اتنا بڑھائیں کہ یہ دائرہ کو نقطہ D پر قطع کرے۔ دی ہوئی شکل کے مطابق  $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4, \angle 5$  اور  $\angle 6$  لکھیں۔

ثبوت:

| بیانات  | دلائل  |
|---|--|
| (i) کیونکہ $m \angle 1 = m \angle 3$                          | $\triangle OAB$ میں مساوی اضلاع کے مخالف زاویے               |
| (ii) اور $m \angle 2 = m \angle 4$                            | $\triangle OBC$ میں مساوی اضلاع کے مخالف زاویے               |
| (iii) اب $m \angle 5 = m \angle 1 + m \angle 3$               | مثلث میں خارجہ زاویہ متقابلہ داخلہ زاویوں کے مجموعہ کے برابر |
| (iv) اسی طرح $m \angle 6 = m \angle 2 + m \angle 4$           |  |
| (v) $m \angle 5 = m \angle 3 + m \angle 3 = 2m \angle 3$      | (i) اور (iii) کی رو سے                                       |
| (vi) اور $m \angle 6 = m \angle 4 + m \angle 4 = 2m \angle 4$ | (ii) اور (iv) کی رو سے                                       |
| $m \angle 5 + m \angle 6 = 2m \angle 3 + 2m \angle 4$         | (v) اور (vi) کو جمع کرنے سے                                  |
| $m \angle AOC = 2(m \angle 3 + m \angle 4) = 2m \angle ABC$   | شکل کے مطابق   |

مثال 1: ایک دائرے کا رداس  $\sqrt{2}$  سم ہے۔ ایک 2 سم لمبائی کا وتر دائرے کو دو قطعات میں تقسیم کرتا ہے۔ ثابت کریں کہ قطعہ کبیرہ میں زاویہ  $45^\circ$  بنتا ہے۔





**معلوم:** O مرکز والے ایک دائرے کا رداس  $\sqrt{2}$  سم ہے۔ 2 سم لمبائی والے وتر  $\overline{AB}$  دائرے کو دو قطعات میں تقسیم کرتا ہے۔

یعنی  $\sqrt{2}$  سم  $m\overline{OA} = m\overline{OB}$  دائرے کو دو قطعات میں تقسیم کرتا ہے۔ جس میں  $\triangle ACB$  قطعہ کبیرہ ہے۔

**مطلوب:**  $m\angle ACB = 45^\circ$

**عمل:** نقطہ O کو A اور B سے ملائیں۔

**ثبوت:**

| بیانات   | دلائل  |
|--|--|
| $\triangle OAB$ میں<br>$(OA)^2 + (OB)^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2$<br>$= 2 + 2 = 4 = (2)^2 = (AB)^2$<br>اس لیے $\triangle AOB$ ایک قائمہ الزاویہ مثلث ہے<br>جس میں $m\angle AOB = 90^\circ$<br>تب $m\angle ACB = \frac{1}{2} m\angle AOB$<br>$= \frac{1}{2} (90^\circ) = 45^\circ$ | $m\overline{OA} = m\overline{OB} = \sqrt{2}$ سم<br>$m\overline{AB} = 2$ سم (معلوم)<br>قوس $\overline{AB}$ سے بننے والا مرکزی زاویہ<br>مسئلہ 1 کی رو سے مرکزی زاویہ محصور زاویے سے دو گنا |

## مسئلہ 2

**12.1 (ii) زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔**

**معلوم:** O مرکز والے دائرے میں  $\angle ADB$  اور  $\angle ACB$


محصور زاویے ہیں۔

**مطلوب:**  $m\angle ACB = m\angle ADB$

**عمل:** نقطہ O کو A اور B سے ملائیں۔ اس طرح قوس  $\overline{AB}$  سے بننے

والا مرکزی زاویہ  $\angle AOB$  ہے۔

**ثبوت:**




| بیانات   | دلائل |
|--|-------|
| دائرے کی قوس $\overline{AB}$ سے بننے والا<br>مرکزی زاویہ $\angle AOB$ ہے | عمل   |


|                       |  |
|-----------------------|--|
| معلوم                 | اور محصور زاویے ACB اور ADB ہیں۔       |
| مسئلہ 1 کی رو سے      | $m\angle AOB = 2m\angle ACB$ (i) ایلیے |
| مسئلہ 1 کی رو سے      | $m\angle AOB = 2m\angle ADB$ (ii) اور  |
| (i) اور (ii) کی رو سے | $2m\angle ACB = 2m\angle ADB$          |
|                       | $m\angle ACB = m\angle ADB$ پس         |

### مسئلہ 3


(iii) 12.1 زاویہ جو نصف قطعہ دائرہ میں ہو 'قائمہ زاویہ' ہوتا ہے۔ جو نصف سے بڑے قطعہ دائرے میں ہو، حادہ زاویہ ہوتا ہے اور جو نصف سے چھوٹے قطعہ دائرے میں ہو 'منفرجہ زاویہ' ہوتا ہے۔



شکل (I)



شکل (II)



شکل (III)

معلوم: O مرکز والے دائرے میں وتر AB کے لحاظ سے قوس ہے۔ جبکہ AOB مرکزی زاویہ اور ACB محصور زاویہ ہے۔

مطلوب: شکل (I) میں اگر قطعہ دائرہ ACB نصف دائرہ ہے تو قائمہ زاویہ  $m\angle ACB =$   
 شکل (II) میں اگر قطعہ دائرہ ACB نصف دائرے سے بڑا ہے تو قائمہ زاویہ  $m\angle ACB <$   
 شکل (III) میں اگر قطعہ دائرہ ACB نصف دائرے سے کم ہے تو قائمہ زاویہ  $m\angle ACB >$

ثبوت:

| بیانات                                    | دلائل            |
|---|------------------|
| O مرکز والے دائرے کی ہر شکل میں AB وتر ہے | معلوم            |
| قوس ADB سے بننے والا مرکزی زاویہ AOB ہے۔  | معلوم            |
| جبکہ محصور زاویہ ACB ہے۔                  | مسئلہ 1 کی رو سے |



(i) اور (ii) کی رو سے

(i) اور (iii) کی رو سے

(i) اور (iv) کی رو سے

$$m\angle AOB = 2m\angle ACB \quad (i)$$

$$m\angle AOB = 180^\circ \quad \text{شکل (I) میں}$$

$$m\angle AOB = 2(90^\circ) \quad (ii) \text{ اس لیے}$$

$$m\angle ACB = \text{قائمہ زاویہ}$$

$$m\angle AOB < 180^\circ \quad \text{شکل (II) میں}$$

$$m\angle AOB < \text{قائمہ زاویہ} \quad (iii) \text{ اس لیے}$$

$$m\angle ACB < \text{قائمہ زاویہ}$$


$$m\angle AOB > 180^\circ \quad \text{شکل (III) میں}$$

$$\therefore m\angle AOB > \text{قائمہ زاویہ} \quad (iv)$$

$$m\angle ACB > \text{قائمہ زاویہ}$$

**نتیجہ مربع 1:** کسی دائرے کی ایک قوس سے بننے والے محصور زاویے برابر ہوتے ہیں۔

**نتیجہ مربع 2:** ایک ہی قطعہ دائرہ میں بننے والے زاویے باہم برابر ہوتے ہیں۔




## مسئلہ 4

(iv) 12.1 کسی دائرے کی دائروی چوکور کے متقابلہ زاویے، سپلیمنٹری زاویے ہوتے ہیں۔

معلوم: O مرکز والے دائرہ میں ABCD ایک دائروی چوکور ہے۔

$$\begin{cases} m\angle A + m\angle C = 180^\circ \\ m\angle B + m\angle D = 180^\circ \end{cases} \quad \text{مطلوب:}$$

عمل: نقطہ O کو A اور C سے ملائیں۔ شکل کے مطابق  $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6$  اور  $\angle 6$  لکھیں۔




| بیانات   | دلائل   |
|--|---|
| قوس ADC سے بننے والا مرکزی زاویہ 2 ہے۔<br>جبکہ محصور زاویہ B ہے۔<br>اس لیے (i) $m\angle B = \frac{1}{2} (m\angle 2)$                             | O مرکز والے دائرے کی قوس ADC<br>مسئلہ 1 کی رو سے      |
| قوس ABC سے بننے والا مرکزی زاویہ 4 ہے۔<br>جبکہ محصور زاویہ D ہے۔<br>اس لیے (ii) $m\angle D = \frac{1}{2} (m\angle 4)$                            | O مرکز والے دائرے کی قوس ABC<br>مسئلہ 1 کی رو سے      |
| $m\angle B + m\angle D = \frac{1}{2} m\angle 2 + \frac{1}{2} m\angle 4$<br>$= \frac{1}{2} (m\angle 2 + m\angle 4)$                               | (i) اور (ii) جمع کرنے سے                              |
| یعنی، $m\angle B + m\angle D = \frac{1}{2} (4 \angle rt) = 2\angle rt$<br>اسی طرح ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ<br>$m\angle A + m\angle C = 2\angle rt$ | (کلی مرکزی زاویہ) $m\angle 2 + m\angle 4 = 360^\circ$ |

**نتیجہ صر 1:** دو مساوی دائروں یا ایک ہی دائرہ میں دو صغیرہ قوسیں مساوی ہوں تو متعلقہ دو کبیرہ قوسوں پر بننے والے محصور زاویے بھی مساوی ہوں گے۔

**نتیجہ صر 2:** اگر دو مساوی دائروں یا ایک ہی دائرہ میں اگر دو قوسیں برابر ہوں تو محصور زاویے آپس میں برابر ہوں گے۔ نیز اس نتیجہ کا عکس بھی درست ہو گا۔

**مثال 1:** دو مساوی دائرے ایک دوسرے کو نقاط A اور B پر قطع کرتے ہیں۔ نقطہ B میں سے گزرتا ہوا ایک قطعہ خط دائروں کو بالترتیب نقاط P اور Q پر قطع کرتا ہے۔





**معلوم:** دو مساوی دائرے ایک دوسرے کو نقاط A اور B پر قطع کرتے ہیں۔ نقطہ B میں سے گزرتا ہوا ایک قطعہ خط PQ دائروں کو بالترتیب نقاط P اور Q پر قطع کرتا ہے۔


**مطلوب:**  $m\overline{AP} = m\overline{AQ}$

**عمل:** نقاط A اور B کو ملائیں۔ شکل کے مطابق  $\angle 1$  اور  $\angle 2$  لکھیں۔

**ثبوت:**

| بیانات                                   | دلائل  |
|--|--|
| کیونکہ $m\widehat{ACB} = m\widehat{ADB}$ | مشترک وتر AB کے سامنے قوسوں کی لمبائی            |
| اس لیے $m\angle 1 = m\angle 2$           | قوسوں کے متقابلہ زاویے                           |
| پس $m\overline{AQ} = m\overline{AP}$     | $\triangle APQ$ میں مساوی زاویوں کے متقابل اضلاع |
| یا $m\overline{AP} = m\overline{AQ}$     |  |

**مثال 2:** اگر چوکور ABCD ایک دائرے کو محیط کیے ہوئے ہو تو ثابت کریں  $m\overline{AB} + m\overline{CD} = m\overline{BC} + m\overline{DA}$



**معلوم:** O مرکز والے دائرے کو چوکور ABCD نے اس طرح محیط کیا ہے کہ چوکور کا ہر ضلع دائرے پر مماس ہے۔

**مطلوب:**  $m\overline{AB} + m\overline{CD} = m\overline{BC} + m\overline{DA}$

**عمل:**  $\overline{OE} \perp \overline{AB}$ ،  $\overline{OF} \perp \overline{BC}$ ،  $\overline{OG} \perp \overline{CD}$  اور  $\overline{OH} \perp \overline{DA}$  کھینچیں۔

**ثبوت:**

| بیانات   | دلائل   |
|--|---|
| (i) $m\overline{AE} = m\overline{HA}$ ; $m\overline{EB} = m\overline{BF}$    | کسی بیرونی نقطہ سے دائرے پر بنائے گئے مماس آپس میں برابر ہیں۔ |
| (ii) $m\overline{CG} = m\overline{FC}$ and $m\overline{GD} = m\overline{DH}$ |   |
| $(m\overline{AE} + m\overline{EB}) + (m\overline{CG} + m\overline{GD})$      | (i) اور (ii) کو جمع کرنے سے                                   |

$$= (m\overline{BF} + m\overline{FC}) + (m\overline{DH} + m\overline{HA})$$

$$m\overline{AB} + m\overline{CD} = m\overline{BC} + m\overline{DA}$$

یا

## مشق 12.1

- 1- ثابت کریں کہ کسی دی ہوئی دائروی چوکور کے متقابلہ زاویوں کا مجموعہ  $180^\circ$  کے برابر ہے۔
- 2- ثابت کریں کہ دائروی متوازی الاضلاع ایک مستطیل ہوگی۔
- 3- O مرکز والے دائرے کے AOB اور COD دو متقاطع وتر ہیں۔ ثابت کریں کہ AOD اور BOC دو مساوی الزاویہ مثلثان ہیں۔
- 4-  $\overline{AD}$  اور  $\overline{BC}$  کسی دائرے کے دو متوازی وتر ہیں۔ ثابت کریں کہ  
 $\overline{AC} \cong \overline{BD}$  اور  $\overline{AB} \cong \overline{CD}$

## متفرق مشق 12

### کثیر الانتخابی سوالات


- 1- درج ذیل سوالات کے چار ممکنہ جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

(i) کسی قائمہ الزاویہ  $\triangle ABC$  میں  $3$  سم  $m\overline{AC} = m\overline{BC} = 4$  سم اور  $m\angle C = 90^\circ$  اس مثلث کے راسوں میں سے گزرنے والے دائرے کا رداس ہے۔

- (a) 1.5 cm (b) 2.0 cm  
(c) 2.5 cm (d) 3.5 cm


(ii) شکل میں AB ایک ہی قوس پر مرکزی اور محصور زاویے بنتے ہیں۔ تب

- (a)  $m\angle 1 = m\angle 2$   
(b)  $m\angle 1 = 2m\angle 2$   
(c)  $m\angle 2 = 3m\angle 1$   
(d)  $m\angle 2 = 2m\angle 1$





(iii) شکل میں اگر  $m\angle 3 = 75^\circ$  تب  $m\angle 1$  اور  $m\angle 2$  معلوم کیجیے۔



- (a)  $37\frac{1}{2}^\circ, 37\frac{1}{2}^\circ$   
 (b)  $37\frac{1}{2}^\circ, 75^\circ$   
 (c)  $75^\circ, 37\frac{1}{2}^\circ$   
 (d)  $75^\circ, 75^\circ$

(iv) دائرے کا مرکز نقطہ O معلوم ہو تو نشان زدہ زاویہ x ہو گا۔




- (a)  $12\frac{1}{2}^\circ$   
 (b)  $25^\circ$   
 (c)  $50^\circ$   
 (d)  $75^\circ$

(v) دائرے کا مرکز نقطہ O معلوم ہو تو نشان زدہ زاویہ y ہو گا۔



- (a)  $12\frac{1}{2}^\circ$   
 (b)  $25^\circ$   
 (c)  $50^\circ$   
 (d)  $75^\circ$

(vi) شکل میں دائرے کا مرکز O ہے اور  $\overleftrightarrow{ABN}$  ایک خط مستقیم ہو تو منفرجہ زاویہ  $\angle AOC = x$  ہے۔



- (a)  $32^\circ$   
 (b)  $64^\circ$   
 (c)  $96^\circ$   
 (d)  $128^\circ$

(vii) شکل میں دائرے کا مرکز O ہے تب زاویہ x ہے۔



- (a)  $55^\circ$   
 (b)  $110^\circ$   
 (c)  $220^\circ$   
 (d)  $125^\circ$




(viii) شکل میں دائرے کا مرکز O ہے تب زاویہ  $x$  \_\_\_\_\_ ہے۔

- (a)  $15^\circ$  (b)  $30^\circ$  (c)  $45^\circ$  (d)  $60^\circ$



(ix) شکل میں دائرے کا مرکز O ہے تب  $x$  \_\_\_\_\_ ہے۔

- (a)  $15^\circ$  (b)  $30^\circ$  (c)  $45^\circ$  (d)  $60^\circ$



(x) شکل میں دائرے کا مرکز O ہے تب  $x$  \_\_\_\_\_ ہے۔

- (a)  $50^\circ$  (b)  $75^\circ$  (c)  $100^\circ$  (d)  $125^\circ$

## خلاصہ

ایک قوس دائرہ کے مرکز پر جو زاویہ بناتی ہے اسے **مرکزی زاویہ** کہتے ہیں۔

مرکزی زاویہ دائرے کے مرکز پر دو راسوں اور ایک قوس سے بنتا ہے۔

دائرے کی ایک قوس جو اس کے محیط پر زاویہ بناتی ہے اس کو **محاصر زاویہ** کہتے ہیں۔

دائرے کے کوئی سے دو وتر جو محیط پر مشترک نقطہ پر ملیں ان سے بننے والا زاویہ **محاصر زاویہ** کہلاتا ہے۔

وہ چوکور، **سائیکلک** کہلاتی ہے جس کے چاروں راسوں سے دائرہ کھینچا جاسکتا ہو۔

کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دو گنا ہوتا ہے۔

زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

زاویہ جو نصف دائرہ میں ہو قائمہ زاویہ ہوتا ہے۔ جو نصف سے بڑے قطعہ دائرے میں ہو حادہ زاویہ ہوتا ہے۔ جو

نصف سے چھوٹے قطعہ دائرے میں ہو، منفرجہ زاویہ ہوتا ہے۔

کسی دائرے کی سائیکلک چوکور کے متقابلہ زاویے سپلیمنٹری زاویے ہوتے ہیں۔



# عملی جیومیٹری۔ دائرے

## (PRACTICAL GEOMETRY-CIRCLES)

اس یونٹ میں طلباء درج ذیل اثباتی مسائل بمعہ نتائج صریح اور مخصوص

- ✓ دیے ہوئے دائرے کا مرکز دریافت کرنا۔
- ✓ دیے ہوئے تین غیر خطی (غیر ہم خط) نقاط سے گزرتا ہوا دائرہ کھینچنا۔
- ✓ ایک دائرہ مکمل کرنا جبکہ اس کے محیط کا ایک حصہ دیا ہوا ہو۔
- ✓ (i) مرکز معلوم کر کے (ii) بغیر مرکز معلوم کئے
- ✓ دی ہوئی مثلث پر محاصرہ دائرہ کھینچنا۔
- ✓ دی ہوئی مثلث کا جانبی دائرہ کھینچنا۔
- ✓ دیے ہوئے دائرے کی محصور مساوی الاضلاع مثلث بنانا۔
- ✓ دیے ہوئے دائرے پر محاصرہ مربع بنانا۔
- ✓ دیے ہوئے دائرے پر منظم محاصرہ مساوی الاضلاع مثلث بنانا۔
- ✓ بغیر مرکز معلوم کئے دی ہوئی قوس کے درمیانی نقطے P سے مماس کھینچنا۔
- ✓ بغیر مرکز معلوم کئے دی ہوئی قوس کے کسی آخری نقطے P سے مماس کھینچنا۔
- ✓ بغیر مرکز معلوم کئے دی ہوئی قوس کے بیرونی نقطے P سے مماس کھینچنا۔
- ✓ نقطہ P جو دیئے ہوئے دائرے پر ہو، سے مماس کھینچنا۔
- ✓ نقطہ P جو دیے ہوئے دائرے کے باہر ہو، سے مماس کھینچنا۔
- ✓ دائرے کے دو مماس کھینچنا۔ جو باہم دیا ہوا زاویہ بناتے ہوں۔
- ✓ دو مساوی دائروں پر دو راست مشترک مماس کھینچنا اور دو مساوی دائروں پر دو معکوس مشترک مماس کھینچنا۔
- ✓ دو غیر مساوی دائروں پر دو راست مشترک مماس کھینچنا اور دو غیر مساوی دائروں پر دو معکوس مشترک مماس کھینچنا۔
- ✓ دو غیر مساوی مس کرتے ہوئے دائروں اور دو غیر مساوی قطع کرتے ہوئے دائروں پر مماس کھینچنا۔
- ✓ دائرہ کھینچنا (i) جو دیے ہوئے زاویہ کے دونوں بازوؤں کو مس کرے۔
- ✓ (ii) جو دو ہم نقطہ خطوط کے درمیانی نقطہ سے گزرے اور اسکے بازوؤں کو مس کرے۔
- ✓ (iii) جو تین ہم نقطہ خطوط کو مس کرے۔

## تعارف (Introduction)

لفظ جیومیٹری دو یونانی الفاظ جیو (زمین) اور میٹرون (پیمائش) سے اخذ کیا گیا ہے۔ دراصل جیومیٹری کا مطلب زمین کی پیمائش ہے۔ جیومیٹری، ریاضی کی ایک اہم شاخ ہے جس میں شکلوں (Figures) کی بناوٹ (Shape)، جسامت (Size) اور حالت (Position) کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ ہم اس یونٹ میں سادہ شکلوں جیسے نقطہ، سیدھی لائن، مثلث، کثیر الاضلاع اور دائرہ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔

جیومیٹری سے متعلق یونانی ریاضی دانوں (300-600 BC) کا نمایاں حصہ ہے۔ خاص طور پر اقلیدس کی مبادیات "Euclid's Elements" کو کئی صدیوں تک پوری دنیا میں بطور ٹیکسٹ بکس پڑھایا جاتا رہا۔


### 3.1 دائرے کی ساخت

کسی بھی رداس کا دائرہ ایک مخصوص نقطہ O سے پرکار گھمانے سے بنایا جاسکتا ہے۔

#### 3.1(i) دیے گئے دائرے کا مرکز معلوم کرنا

معلوم: ایک دائرہ

ساخت کے اقدام:



شکل 13.1.1

1- دو وتر  $\overline{AB}$  اور  $\overline{CD}$  کھینچیں۔

2- وتر  $\overline{AB}$  کا عمودی نصف  $\overleftrightarrow{EF}$  کھینچیں۔

3- وتر  $\overline{CD}$  کا عمودی نصف  $\overleftrightarrow{PQ}$  کھینچیں۔


4- عمودی نصف  $\overleftrightarrow{EF}$  اور  $\overleftrightarrow{PQ}$  ایک دوسرے

کو نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔ O دائرے کا مرکز ہے۔

#### 3.1(ii) دیے ہوئے تین غیر خطی (غیر ہم خط) نقاط سے گزرتا ہوا دائرہ کھینچنا:

معلوم: تین غیر خطی (غیر ہم خط) نقاط A، B، اور C ہیں۔

ساخت کے اقدام:



شکل 13.1.2

1- A کو B سے اور B کو C سے ملائیں۔

2-  $\overline{AB}$  اور  $\overline{BC}$  کے بالترتیب عمودی نصف  $\overleftrightarrow{LM}$  اور  $\overleftrightarrow{PQ}$  کھینچیں۔


3-  $\overleftrightarrow{LM}$  اور  $\overleftrightarrow{PQ}$  ایک دوسرے کو نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔

نقطہ O سے رداس  $m\overline{OA} = m\overline{OB} = m\overline{OC}$

کا دائرہ کھینچیں جو کہ مطلوبہ دائرہ ہے۔



13.1(iii-a) مرکز معلوم کر کے دائرہ مکمل کرنا جب محیط کا ایک حصہ دیا گیا ہو:



شکل 13.1.3


معلوم:  $\widehat{AB}$  دائرے کے محیط کا حصہ ہے۔  
ساخت کے اقدام:

- 1- فرض کریں کہ چار نقاط  $E, D, C, F$  (دی ہوئی قوس  $AB$ ) پر لیے۔  
وتر  $\overline{CD}$  اور  $\overline{EF}$  کھینچے۔
- 2- وتر  $\overline{CD}$  پر عمودی ناصف  $\overleftrightarrow{PQ}$  اور وتر  $\overline{EF}$  پر عمودی ناصف  $\overleftrightarrow{LM}$  کھینچے۔
- 3-  $\overleftrightarrow{LM}$  اور  $\overleftrightarrow{PQ}$  ایک دوسرے کو نقطہ  $O$  پر قطع کرتے ہیں۔

∴ نقاط  $A, B, C, D, E, F$  اور نقطہ  $O$  سے مساوی فاصلے پر ہیں۔

5- مرکز  $O$  اور رداس ( $m\overline{OA} = m\overline{OB} = m\overline{OC} = m\overline{OD} = m\overline{OE} = m\overline{OF}$ ) سے دائرہ مکمل کریں۔ یہ دائرہ نقاط  $A, B, C, D, E, F$  سے گزرے گا۔

13.1(iii-b) بغیر مرکز معلوم کیے دائرہ مکمل کرنا جبکہ اس کے محیط کا ایک حصہ دیا گیا ہو۔



شکل 13.1.4

معلوم:  $\widehat{AB}$  دائرے کے محیط کا ایک حصہ ہے۔  
ساخت کے اقدام:

- 1- دو مناسب اور برابر لمبائی والے وتر  $\overline{CD}$  اور  $\overline{DE}$  لیں جن کے نقاط  $D, C$  اور  $E$  قوس  $\widehat{AB}$  پر ہوں۔
- 2-  $\overline{CD}$  کو  $D'$  اور  $\overline{DE}$  کو  $E'$  تک بڑھائیں تاکہ بیرونی زاویہ  $D'DE'$  حاصل ہو۔
- 3- بیرونی زاویہ  $E'EF$  کو زاویہ  $D'DE'$  کے برابر بنائیں اور وتر  $\overline{EF}$  کو  $\overline{CD}$  یا  $m\overline{DE}$  کے برابر لیں۔  
 $\overline{EF}$  کو  $F'$  تک بڑھائیں۔

4- بیرونی زاویہ  $F'FG$  کو زاویہ  $E'EF$  کے برابر بنائیں اور وتر  $\overline{FG}$  کو  $\overline{CD}$  یا  $m\overline{CD}$  کے برابر لیں۔  $\overline{FG}$  کو  $G'$  تک بڑھائیں۔

5- نقاط  $F$  اور  $G$  مطلوبہ دائرے کے محیط پر ہیں۔ نقطوں کے ذریعے  $\overline{EF}$  اور  $\overline{FG}$  کو شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔

6- بیرونی برابر زاویوں کے عمل کو جاری رکھیں تاکہ دائرے کا محیط مکمل ہو جائے جیسا کہ شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔  
نوٹ: اندرونی برابر زاویوں کی مدد سے بھی دائرے کے محیط کو مکمل کیا جاسکتا ہے۔

## 13.1 مشق

1- کسی لمبائی کی ایک قوس کو تقسیم کریں۔

(i) دو برابر حصوں میں

(ii) چار برابر حصوں میں

2- ایک قوس ABC کے مرکز کو عملی طور پر معلوم کریں۔

3- (i) اگر کسی قوس کے دو وتروں  $\overline{AB}$  اور  $\overline{BC}$  کی لمبائیاں بالترتیب 3 سم اور 4 سم ہوں تو قوس کا مرکز معلوم کریں۔

(ii) اگر کسی قوس کے دو وتروں  $\overline{AB}$  اور  $\overline{BC}$  کی لمبائیاں بالترتیب 3.5 سم اور 5 سم ہوں تو قوس کا مرکز معلوم کریں۔

4- ایک قوس کے وتروں  $\overline{PQ}$  اور  $\overline{QR}$  کے دو عمودی ناصف کھینچیں۔ نقاط  $Q, P$  اور  $R$  سے گزرتا ہوا دائرہ بنائیں۔

5- 6 سینٹی میٹر درمیانی فاصلہ والے نقاط  $A$  اور  $B$  سے گزرتا ہوا 5 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ کھینچیں نیز دائرے کے مرکز سے  $\overline{AB}$  کا فاصلہ معلوم کریں۔

6- اگر  $\overline{AB} = 4$  cm اور  $\overline{BC} = 6$  cm ہوں اس طرح کہ  $\overline{AB} \perp \overline{BC}$  پر عمود ہو  $(\overline{AB} \perp \overline{BC})$  تو  $A, B$  اور  $C$  سے گزرتا ہوا دائرہ بنائیں نیز اس کا رداس معلوم کریں۔

## 13.2 کشیدہ الاضلاعوں سے منسلک دائرے:

(i) 13.2 دی ہوئی مثلث کے گرد دائرہ (محاصرہ دائرہ) بنانا:

معلوم:  $ABC$  ایک مثلث ہے۔

ساخت کے اقدام:


1- ضلع  $\overline{AB}$  پر عمودی ناصف  $\overleftrightarrow{LMN}$  کھینچیں۔

2- ضلع  $\overline{AC}$  پر عمودی ناصف  $\overleftrightarrow{PQR}$  کھینچیں۔

3-  $\overleftrightarrow{LN}$  اور  $\overleftrightarrow{PR}$  ایک دوسرے کو نقطہ  $O$  پر قطع کرتے ہیں۔

4-  $O$  مرکز سے رداس  $m\overline{OA} = m\overline{OB} = m\overline{OC}$  کا دائرہ

کھینچیں۔




شکل 13.2.1

یہ دائرہ نقاط  $A, B$  اور  $C$  سے گزرے گا جبکہ  $O$  محاصرہ دائرہ کا محاصرہ مرکز ہے۔

یاد رکھیں کہ: مثلث  $ABC$  کے راسوں سے گزرتا ہوا دائرہ بطور محاصرہ دائرہ، اس کا رداس بطور محاصرہ رداس اور مرکز بطور محاصرہ مرکز پہچانے جاتے ہیں۔



### 13.2(ii) دی ہوئی مثلث کے اندر دائرہ (محصور دائرہ) بنانا۔



شکل 13.2.2

معلوم:  $ABC$  ایک مثلث ہے۔

ساخت کے اقدام:

- 1- زاویوں  $ABC$  اور  $ACB$  کی تنصیف کے لیے بالترتیب  $\vec{BE}$  اور  $\vec{CF}$  ناصف کھینچیں۔ شعاعیں  $\vec{BE}$  اور  $\vec{CF}$  ایک دوسرے کو نقطہ  $O$  پر قطع کرتی ہیں۔
  - 2- نقطہ  $O$  محصور دائرے کا مرکز ہے۔
  - 3- نقطہ  $O$  سے  $\vec{BC}$  پر  $\vec{OP}$  عمود کھینچیں۔
- مرکز  $O$  سے رداس  $m\vec{OP}$  کا دائرہ کھینچیں۔ یہ دائرہ مثلث  $ABC$  کا محصور دائرہ ہے۔


یاد رکھیں کہ: کہ دائرہ جو مثلث کے ضلعوں کو اندرونی طور پر مس کرتا ہے۔ بطور محصور دائرہ پہچانا جاتا ہے۔ اس کا رداس بطور محصور رداس اور مرکز بطور محصور مرکز پہچانے جاتے ہیں۔

### 13.2(iii) دی ہوئی مثلث کا جہانی دائرہ بنانا۔

معلوم:  $ABC$  ایک مثلث ہے۔

ساخت کے اقدام:

- 1- مثلث  $ABC$  کے اضلاع  $\vec{AB}$  اور  $\vec{AC}$  کو آگے بڑھائیں۔
- 2- بیرونی زاویوں  $ABC$  اور  $ACB$  کے ناصف کھینچیں۔ بیرونی زاویوں کو یہ ناصف نقطہ  $I$  پر ملتے ہیں۔



شکل 13.2.3

3- نقطہ I سے ضلع  $\overline{BC}$  پر عمود کھینچیں۔ جو  $\overline{BC}$  کو نقطہ D پر قطع کرتا ہے۔  $\overline{I_1D}$  جانبی دائرے کا رداس اور نقطہ  $I_1$  مرکز ہے۔

4- مرکز  $I_1$  سے رداس  $m\overline{I_1D}$  کا دائرہ کھینچیں جو کہ  $\triangle ABC$  کے ضلع  $BC$  کو بیرونی اور بڑھے ہوئے اضلاع  $AB$  اور  $AC$  کو اندرونی طور پر مس کرے گا۔

### جانبی دائرہ:

وہ دائرہ جو کسی مثلث کے ایک ضلع کو بیرونی طور پر اور بڑھے ہوئے دو اضلاع کو اندرونی طور پر چھوئے جانبی دائرہ (ای دائرہ) کہلاتا ہے۔ ای دائرے کا مرکز ای مرکز اور رداس ای رداس کہلاتے ہیں۔

### 13.2(iv) دیے ہوئے دائرے کے گرد مساوی الاضلاع مثلث بنانا:

معلوم: مناسب رداس کے دائرے کا مرکز O ہے۔

ساخت کے اقدام:

1- دائرے کا قطر  $\overline{AB}$  کھینچیں۔

2- دائرے پر نقاط C اور D کو دریافت کرنے کے لیے مرکز

A سے  $m\overline{OA}$  رداس کی ایک قوس کھینچیں۔


3- دائرے کے رداس  $\overline{OC}$  اور  $\overline{OD}$  کھینچیں۔

4- دائرے پر نقاط C، B اور D پر مماس کھینچیں۔

5- مماسوں کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ نقاط E، F اور G پر

ملیں۔


دیے ہوئے دائرے کے گرد EFG مطلوبہ محاصر مثلث ہے۔



شکل 13.2.4



### 13.2(v) دیے ہوئے دائرے میں مساوی الاضلاع محصور مثلث بنانا:



شکل 13.2.5


معلوم: مرکز O کا ایک دائرہ۔

ساخت کے اقدام:

- 1- دائرے کا ایک قطر  $\overline{AB}$  کھینچیں۔
- 2- نقطہ A سے رداس  $\overline{OA}$  کی قوس کھینچیں۔ قوس دائرہ کو نقاط C اور D پر قطع کرتی ہے۔
- 3- نقاط B، C اور D کو ملائیں تاکہ قطعات  $\overline{BC}$ ،  $\overline{CD}$  اور  $\overline{BD}$  حاصل ہوں۔

مثلث BCD مطلوبہ محصور مساوی الاضلاع مثلث ہے۔

### 13.2(vi) دیے ہوئے دائرے کا محاصر مربع بنانا:




شکل 13.2.6

معلوم: مرکز O کا ایک دائرہ۔

ساخت کے اقدام:

- 1- دو قطر  $\overline{PR}$  اور  $\overline{QS}$  کھینچیں جو ایک دوسرے کی عموداً تنصیف کرتے ہیں۔
- 2- نقاط P، Q، R اور S پر دائرے کے مماس کھینچیں۔
- 3- ان مماسوں کو آگے اس طرح بڑھائیں تاکہ وہ آپس میں نقاط A، B، C اور D پر ملیں۔ ABCD مطلوبہ محاصر مربع ہے۔

### 13.2(vii) دیے ہوئے دائرے کا محصور مربع بنانا:



شکل 13.2.7


معلوم: مرکز O کا ایک دائرہ۔

ساخت کے اقدام:

- 1- دو قطر  $\overline{AC}$  اور  $\overline{BD}$  جو کہ ایک دوسرے کی عموداً تنصیف کرتے ہیں، کھینچیں۔
- 2- A کو B سے، B کو C سے، C کو D سے اور D کو A سے ملائیں۔

ABCD دائرے کا مطلوبہ محصور مربع ہے۔

### 13.2(viii) دیے ہوئے دائرے کا محاصرہ مسدس بنانا:



شکل 13.2.8


معلوم: مرکز O کا ایک دائرہ۔

ساخت کے اقدام:


- 1- ایک قطر  $\overline{AD}$  کھینچیں۔
- 2- نقطہ A سے رداس  $\overline{AO}$  کی قوس کھینچیں جو دائرے کو نقاط B اور F پر کاٹی ہے۔
- 3- O کو B سے ملائیں اور آگے بڑھائیں تاکہ دائرے کو نقطہ E پر ملے۔
- 4- O کو F سے ملائیں اور آگے بڑھائیں تاکہ دائرے کو نقطہ C پر ملے۔
- 5- نقاط A، B، C، D، E، F پر دائرے کے مماس کھینچیں جو ایک دوسرے کو بالترتیب نقاط P، Q، R، S، T، U پر قطع کریں۔

پس PQRSTU مطلوبہ محاصرہ مسدس ہے۔

### 13.2(ix) دیے ہوئے دائرے کی محصور مسدس بنانا:



شکل 13.2.9(a)



شکل 13.2.9(b)

معلوم: مرکز O کا ایک دائرہ



## ساخت کے اقدام:

- 1- دائرے پر ایک نقطہ A لو اور اس کو O سے ملاؤ۔
  - 2- نقطہ A سے، رداس  $\overline{OA}$  کی قوس کھینچیں جو دائرے کو نقاط B اور F پر قطع کرتی ہے۔
  - 3- نقاط O اور A کو نقاط B اور F سے ملائیں۔
  - 4- مثلثان OAB اور OAF مساوی الاضلاع مثلثیں ہیں۔ اس لیے زاویے AOB اور AOF کی مقدار  $60^\circ$  ہے۔ یعنی  $m\overline{OA} = m\overline{AB} = m\overline{AF}$
  - 5-  $\overline{FO}$  کو بڑھائیں تاکہ وہ دائرے کو نقطہ C پر ملے۔ B کو C سے ملائیں کیونکہ  $m\angle BOC = 60^\circ$  اس لیے  $m\overline{BC} = m\overline{OA}$
  - 6- C اور F سے رداس  $\overline{OA}$  کی قوسیں لگائیں جو کہ دائرے کو نقاط D اور E پر قطع کرتی ہیں۔
  - 7- C کو D سے، D کو E سے، E کو F سے ملائیں جس سے  $m\overline{OA} = m\overline{OB} = m\overline{OC} = m\overline{OD} = m\overline{OE} = m\overline{OF}$
- پس شکل ABCDEF دائرے کے اندر منظم مسدس ہے۔

## مشق 13.2

- 1-  $\Delta ABC$  کا محاصرہ دائرہ بنائیں جب کہ اس کے اضلاع  $\overline{AB}$ ،  $\overline{BC}$  اور  $\overline{CA}$  کی لمبائیاں بالترتیب 6 سم، 3 سم اور 4 سم ہوں۔ نیز اس کا محاصرہ رداس معلوم کریں۔
- 2-  $\Delta ABC$  کا محصورہ دائرہ بنائیں جب کہ اس کے اضلاع  $\overline{AB}$ ،  $\overline{BC}$  اور  $\overline{CA}$  کی لمبائیاں بالترتیب 5 سم، 3 سم اور 3 سم ہوں۔ نیز اس کا محصورہ رداس معلوم کریں۔
- 3- اس A کے مقابل مثلث ABC کا جانبی دائرہ بنائیں جب کہ اس کے اضلاع  $\overline{AB}$ ،  $\overline{BC}$  اور  $\overline{CA}$  کی لمبائیاں بالترتیب 6 سم، 4 سم اور 3 سم ہوں نیز اس کا رداس معلوم کریں۔
- 4- مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محاصرہ دائرہ بنائیں جب کہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہو۔
- 5- مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصورہ دائرہ بنائیں جب کہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو۔
- 6- ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 3 سم، 4 سم، 5 سم ہیں۔ اس کے محاصرہ اور محصورہ دائرے بنائیں۔
- 7- ایک دائرے کا رداس 4 سم ہے۔ اس کے اندر اور باہر مربع بنائیں۔
- 8- ایک دائرے کا رداس 3.5 سم ہے۔ اس کے اندر اور باہر منظم مسدس بنائیں۔
- 9- ایک دائرے کا رداس 3 سم ہے۔ اسکی محاصرہ منظم مسدس بنائیں۔


### 13.3 دائرے کا مماس

13.3(i) دی ہوئی قوس کے دیے ہوئے نقطہ  $P$  سے مرکز استعمال کیے بغیر مماس کھینچنا:

پہلی صورت: جب  $P$  قوس کا درمیانی نقطہ ہو۔

معلوم:  $P$  قوس  $AB$  کا درمیانی نقطہ ہے۔

ساخت کے اقدام:



شکل 13.3.1(a)

1-  $A$  اور  $B$  کو ملائیں۔

2-  $\overline{AB}$  کا عمودی ناصف کھینچیں جو قوس  $AB$  کے وسطی نقطہ  $P$  اور  $\overline{AB}$  کے وسطی نقطہ  $R$  سے گزرتا ہے۔

3- نقطہ  $P$  پر قائمہ زاویہ  $TPR$  بنائیں۔


4-  $\overrightarrow{TP}$  کو  $P$  کی طرف  $S$  سے آگے بڑھائیں۔

پس  $\overleftrightarrow{TPS}$  مطلوبہ مماس ہے۔

دوسری صورت: جب  $P$  قوس کا آخری نقطہ ہو۔

معلوم: نقطہ  $P$  قوس کا آخری نقطہ ہے۔

ساخت کے اقدام:



شکل 13.3.1(b)

1- قوس  $PQR$  پر کوئی نقطہ  $A$  لیں۔

2- نقاط  $A$  اور  $P$  کو ملائیں۔

3- نقطہ  $A$  سے عمود  $\overrightarrow{AS}$  کھینچیں جو قوس  $PQR$  کو نقطہ  $B$  پر قطع کرتا ہے۔

4- نقاط  $B$  اور  $P$  کو ملائیں۔

5-  $\angle ABP$  کے برابر  $\angle APD$  کھینچیں۔

$$m\angle BPD = m\angle BPA + m\angle APD$$

$$= m\angle BPA + m\angle ABP$$

$$= 90^\circ$$


اب 6-

$$[\because m\angle APD = m\angle ABP]$$

پس  $\overleftrightarrow{PD}$  مطلوبہ مماس ہے۔



تیسری صورت : جب نقطہ  $P$  قوس سے باہر ہو۔



### شکل (c) 13.3.1

**معلوم:** نقطہ  $P$  قوس  $ABC$  کے برابر ہے جس کا مرکز  $O$  معلوم ہے۔

## ساخت کے اقدام:


- 1- نقطہ A کو P سے ملائیں۔  $\overline{AP}$ ، قوس ABC کو نقطہ E پر قطع کرتا ہے۔
  - 2-  $\overline{AP}$  کا درمیانی نقطہ M معلوم کریں۔
  - 3- مرکز M سے رداس  $|AM| = |MP|$  کا سیسی دائرہ بنائیں۔
  - 4- نقطہ E پر عمود کھینچیں جو سیسی دائرے کو نقطہ D پر ملے۔
  - 5- مرکز P سے رداس  $|\overline{PD}|$  کی قوس کھینچیں۔
  - 6- یہ قوس دی ہوئی قوس ABC کو نقطہ T پر قطع کرتی ہے۔
  - 7- نقطہ P کو نقطہ T سے ملائیں۔
- پس  $\overrightarrow{PTQ}$  مطلوبہ مماس ہیں۔

13.3(ii-a) دائرے کے محیطی نقطہ  $P$  سے مماس کھینچنا۔

**معلوم:**  $O$  دائرے کا مرکز ہے اور اس کے محیط پر کوئی نقطہ  $P$  ہے۔


## ساخت کے اقدام:

- 1- فقط  $P$  کو مرکز  $O$  سے ملائیں، تاکہ  $\overline{OP}$  دائرے کا رداس ہو۔
  - 2- ایک خط  $TPS$  کھینچیں جو رداس  $\overline{OP}$  پر عمود ہو۔
- ∴  $\overrightarrow{TPS}$  دائرے پر دیے ہوئے نقطہ  $P$  سے مطلوبہ مماس ہے۔



شکل 13.3.2(a)

13.3(ii-b) دائرے سے ایک مماس کھینچنا جبکہ نقطہ P دائرے سے باہر ہو۔



شکل 13.3.2(b)

معلوم: O دائرے کا مرکز ہے اور کوئی نقطہ P دائرے سے باہر ہے۔

ساخت کے اقدام:

- 1- نقطہ P کو مرکز O سے ملائیں۔
- 2-  $\overline{OP}$  کا وسطی نقطہ M معلوم کریں۔
- 3- مرکز M سے قطر  $\overline{OP}$  پر نصف دائرہ بنائیں۔ یہ نصف دائرہ دیے ہوئے دائرے کو نقطہ T پر کاٹتا ہے۔
- 4- P کو T سے ملائیں اور  $\overline{PT}$  کو دونوں اطراف میں بڑھائیں، تب  $\overline{PT}$  مطلوبہ مماس ہے۔

13.3(iii) دائرے کے دو مماس کھینچیں جو کہ دیے ہوئے زاویہ پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔

ہیں۔

معلوم: O دائرے کا مرکز ہے اور MNS دیا ہوا زاویہ ہے۔

ساخت کے اقدام:

- 1- مرکز O والے دائرے کے محیط پر نقطہ A لیں۔
- 2- نقاط O اور A کو ملائیں۔
- 3-  $m\angle COA$  کو  $m\angle MNS$  کے برابر کھینچیں۔
- 4-  $\overline{CO}$  کو آگے بڑھائیں تاکہ دائرے کو B پر ملے۔

$$m\angle AOB = 180^\circ - m\angle COA \quad -5$$

$$\overline{OA} \text{ پر عمود } \overleftrightarrow{AD} \text{ کھینچیں۔} \quad -6$$

$$\overline{OB} \text{ پر عمود } \overleftrightarrow{BE} \text{ کھینچیں۔} \quad -7$$

$$\overleftrightarrow{AD} \text{ اور } \overleftrightarrow{BE} \text{ نقطہ P پر قطع کرتے ہیں۔} \quad -8$$

$$m\angle AOB = 180^\circ - m\angle APB \text{ یعنی } m\angle AOB + m\angle APB = 180^\circ \quad -9$$

$$5 \text{ اور } 9 \text{ کی رو سے} \quad -10$$


$$180^\circ - m\angle COA = 180^\circ - m\angle APB \Rightarrow m\angle COA = m\angle APB$$

$$\Rightarrow m\angle APB = m\angle MNS \quad (\because m\angle COA = m\angle MNS)$$

$$\overleftrightarrow{AP} \text{ اور } \overleftrightarrow{BP} \text{ مطلوبہ دو مماس ہیں جو دیے ہوئے زاویہ MNS پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔} \quad -11$$



### 13.3(iv-a) مساوی دائروں پر راست مشترک مماس کھینچنا۔



شکل 13.3.4 (a)

معلوم: مراکز  $O$  اور  $O'$  کے دو مساوی دائرے۔


ساخت کے اقدام:

- 1- مراکز  $O$  اور  $O'$  کو ملائیں۔
- 2- پہلے دائرے کا قطر  $AOB$  کھینچیں۔ تاکہ  $\overline{AOB} \perp \overline{OO'}$
- 3- دوسرے دائرے کا قطر  $A'O'B'$  کھینچیں تاکہ  $\overline{A'O'B'} \perp \overline{OO'}$
- 4-  $\overline{AA'}$  اور  $\overline{BB'}$  کھینچیں جو کہ مطلوبہ مشترک مماس ہیں۔

### 13.3(iv-b) دو مساوی دائروں پر معکوس مشترک کھینچنا۔

معلوم: مراکز  $O$  اور  $O'$  کے دو مساوی دائرے۔

ساخت کے اقدام:




شکل 13.3.4 (b)

- 1- مراکز  $O$  اور  $O'$  کو ملائیں۔
- 2-  $\overline{OO'}$  کا وسطی نقطہ  $M$  معلوم کریں۔
- 3-  $\overline{MO'}$  کا وسطی نقطہ  $N$  معلوم کریں۔
- 4- مرکز  $N$  سے رداس  $m\overline{MN}$  کا دائرہ کھینچیں جو مرکز  $O'$  کے دائرے کو نقاط  $P$  اور  $P'$  پر قطع کرے۔
- 5- نقاط  $M$  اور  $P$  سے گزرتا ہوا ایک خط کھینچیں جو دوسرے دائرے کو نقطہ  $Q$  پر مس کرے۔
- 6- نقاط  $M$  اور  $P'$  سے گزرتا ہوا ایک خط کھینچیں جو دوسرے دائرے کو نقطہ  $Q'$  پر چھوئے۔

پس  $\overleftrightarrow{PQ}$  اور  $\overleftrightarrow{P'Q'}$  دیے ہوئے دائرے کے معکوس مشترک مماس ہیں۔

### 13.3(v-a) دو غیر مساوی دائروں کے راست مشترک مماس کھینچنا۔



شکل 13.3.5 (a)

**معلوم:** دو غیر مساوی دائرے جن کے بالترتیب مراکز  $O$ ،  $O'$  اور بالترتیب رداس  $r$ ،  $r'$  ( $r > r'$ ) ہیں۔

**ساخت کے اقدام:**

1- نقاط  $O$  اور  $O'$  کو ملائیں۔

2- قطر  $OO'$  کے درمیانی نقطہ  $M$  کو مرکز مان کر قطر  $OO'$  پر نیا دائرہ بنائیں۔

3- ایک دائرہ جس کا مرکز ایک  $O$  ہے اور مرکز  $O$  سے رداس  $r - r'$  کا ایک دوسرا دائرہ کھینچیں جو قطر  $OO'$  والے دائرے کو نقاط  $P$  اور  $Q$  پر قطع کرے۔


4- قطعات  $OP$  اور  $OQ$  کو آگے بڑھائیں تاکہ مرکز  $O$  والے دائرے کو بالترتیب نقاط  $A$  اور  $B$  پر ملیں۔

5-  $\overrightarrow{OA} \parallel \overrightarrow{O'A'} \parallel \overrightarrow{OB}$  اور  $\overrightarrow{OB'} \parallel \overrightarrow{O'B'}$  کھینچیں۔

6-  $A$  کو  $A$  اور  $B$  اور  $B'$  سے ملائیں۔ پس  $\overrightarrow{AA'}$  اور  $\overrightarrow{BB'}$  مطلوبہ راست مشترک مماس ہیں۔



### 13.3(v-b) دو غیر مساوی دائروں کے معکوس مشترک مماس کھینچنا۔



شکل (b) 13.3.5

معلوم: دو غیر مساوی دائرے جن کے بالترتیب مراکز  $O$ ،  $O'$  اور بالترتیب رداس  $r$ ،  $r'$  ہیں۔

ساخت کے اقدام:

- 1- دیے ہوئے دائروں کے مراکز  $O$  اور  $O'$  کو ملائیں۔
- 2-  $OO'$  کا وسطی نقطہ  $M$  معلوم کریں۔
- 3- مرکز  $M$  سے قطر  $OO'$  پر ایک نیا دائرہ بنائیں۔
- 4- مرکز  $O$  سے رداس  $r + r'$  کا ایک دوسرا دائرہ کھینچیں۔ جو قطر  $OO'$  والے دائرے کو نقاط  $P$  اور  $Q$  پر قطع کرے۔
- 5-  $O$  کو  $P$  اور  $Q$  سے ملائیں۔ قطعات  $OP$  اور  $OQ$  رداس  $r$  والے دائرے کو بالترتیب  $A$  اور  $B$  پر ملتے ہیں۔
- 6-  $\vec{OA} \parallel \vec{OB}$  اور  $\vec{OB} \parallel \vec{O'A'}$  کھینچیں۔
- 7-  $A$  کو  $B$  سے اور  $A'$  اور  $B$  سے ملائیں۔ پس  $\vec{AB}$  اور  $\vec{A'B'}$  مطلوبہ معکوس مشترک مماس ہیں۔


### 13.3(vi-a) دو غیر مساوی مس کرتے ہوئے دائروں پر مماس کھینچنا۔

پہلی صورت :

معلوم: دو غیر مساوی اندرونی طور پر مس کرتے ہوئے دائرے جن کے مراکز  $O$  اور  $O'$  ہیں۔

ساخت کے اقدام:

- 1-  $O$  اور  $O'$  کو ملائیں۔  $OO'$  کو نقطہ  $A$  تک آگے بڑھائیں۔ جہاں دونوں دائرے ایک دوسرے کو نقطہ  $A$  پر مس کرتے ہیں۔ (شکل I)
- 2- مماس  $\overline{OA}$  پر عمود ہوتا ہے۔
- 3- نقطہ  $A$  سے  $\overline{OA}$  پر عمود کھینچیں جو کہ مطلوبہ مماس ہے۔




شکل صورت - I

دوسری صورت :

معلوم: دو غیر مساوی بیرونی طور پر مس کرتے ہوئے دائرے جن کے مراکز  $O$  اور  $O'$  ہیں

ساخت کے اقدام:

- 1-  $O$  کو  $O'$  سے ملائیں۔  $OO'$  دونوں دائروں کو نقطہ  $B$  پر قطع کرتا ہے۔ جہاں یہ دائرے ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں۔ (شکل II)
- 2- مماس، دائروں کے مراکز سے بننے والے قطعہ خط پر عمود ہوتا ہے۔
- 3- نقطہ  $B$  سے  $\overline{OO'}$  پر عمود کھینچیں جو کہ مطلوبہ مماس ہے۔



شکل صورت - II


13.3.6 (a)

### 13.3(vi-b) دو غیر مساوی قطع کرتے ہوئے دائروں پر مماس کھینچنا۔

معلوم: دو قطع کرتے ہوئے دائرے جن کے مراکز  $A$  اور  $B$  ہیں۔

ساخت کے اقدام:

- 1- ایک قطعہ خط  $AB$  لیں۔
- 2- دو دائرے جن کے بالترتیب رداس  $r$  اور  $r_1$  (جب کہ  $r > r_1$ ) اور مراکز  $A$  اور  $B$  ہوں، کھینچیں۔
- 3-  $A$  کو مرکز مان کر رداس  $r - r_1$  کا دائرہ کھینچیں۔
- 4- قطعہ خط  $AB$  کی نقطہ  $M$  پر تنصیف کریں۔



شکل 13.3.6 (b)



5- مرکز  $M$  سے رداس  $m\overline{AM} = m\overline{BM}$  کا دائرہ کھینچیں جو رداس  $r_1 - r$  والے دائرے کو نقاط  $P$  اور  $Q$  پر قطع کرے۔

6-  $A$  کو  $P$  سے ملائیں اور  $\overline{AP}$  کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ مرکز  $A$  والے دائرے کو  $D$  پر ملے۔ نیز  $A$  کو  $Q$  سے ملائیں اور  $\overline{AQ}$  آگے بڑھائیں تاکہ مرکز  $A$  والے دائرے کو  $C$  پر ملے۔

7-  $\overline{AD}$  کے متوازی  $\overrightarrow{BN}$  کھینچیں۔ جو مرکز  $B$  والے دائرے کو  $T$  پر قطع کرے۔

8- نقاط  $D$  اور  $T$  کو ملاتا ہوا خط کھینچیں۔  $\overrightarrow{DT}$  دیے ہوئے دونوں دائروں کا مشترک مماس ہے۔

9-  $\overline{AB}$  کے دوسری طرف اسی عمل کو دہرائیں۔  $\overrightarrow{CT}$  بھی دیے ہوئے دونوں دائروں کا مماس ہے۔

13.3(vii-a) ایک دائرہ جو دیے ہوئے زاویہ کے بازوؤں کو مس کرتا ہو، کھینچیں۔

معلوم:  $\angle BAC$  ایک زاویہ ہے۔

ساخت کے اقدام:

1-  $\angle BAC$  کا نصف  $\overrightarrow{AD}$  کھینچیں۔


2-  $\overrightarrow{AD}$  پر کوئی نقطہ  $E$  لیں۔

3-  $\overline{AC}$  پر عمود  $\overrightarrow{ET}$  کھینچیں جو  $\overline{AC}$  کو نقطہ  $F$  پر قطع کرے۔


4- مرکز  $E$  سے  $m\overline{EF}$  رداس کا دائرہ کھینچیں۔

یہ دائرہ  $\angle BAC$  کے دونوں بازوؤں کو چھوتا ہے۔

13.3(vii-b) دو ہم نقطہ خطوط کو مس کرے اور ان کے درمیانی نقطہ سے گزرے۔



شکل 13.3.7 (a)



شکل 13.3.7 (b)

معلوم:  $\overrightarrow{BS}$  اور  $\overrightarrow{CT}$  دو ہم نقطہ خطوط ہیں۔

ساخت کے اقدام:

- 1-  $\overrightarrow{BS}$  اور  $\overrightarrow{CT}$  نقطہ A پر قطع کرتے ہیں۔
- 2-  $\angle BAC$  کا نصف  $\overrightarrow{AD}$  کھینچیں۔
- 3-  $\overrightarrow{AD}$  پر کوئی نقطہ E لیں۔
- 4-  $\overrightarrow{AB}$  پر عمود  $\overrightarrow{EF}$  کھینچیں۔
- 5- مرکز E سے رداس  $m\overrightarrow{EF}$  کا دائرہ کھینچیں۔
- 6- یہ دائرہ  $\overrightarrow{AB}$  اور  $\overrightarrow{AC}$  کو چھوتا ہے۔
- 7-  $\overrightarrow{AP}$  جو اس دائرے کو نقطہ H پر کاٹتا ہے، کھینچیں۔ نقطہ E اور نقطہ H کو ملائیں۔
- 8- نقطہ P سے  $\overrightarrow{HE} \parallel \overrightarrow{PZ}$  کھینچا۔ جو کہ  $\overrightarrow{AD}$  کو نقطہ O پر قطع کرتا ہے۔
- 9- مرکز O سے رداس  $m\overrightarrow{OP}$  کا دائرہ کھینچیں یہ دائرہ دونوں خطوط کو چھوتا ہے۔

**13.3(vii-c) تین ہم نقطہ خطوط کو چھوتا ہوا دائرہ کھینچنا۔**

**نوٹ:** تین ہم نقطہ خطوط کو چھوتا ہوا دائرہ کھینچنا ممکن ہے۔

### مشق 13.3

- 1- ایک قوس ABC میں وتر  $\overrightarrow{BC}$  کی لمبائی 2 سم ہے۔ قطعہ خط PBC کھینچیں جس کی لمبائی 8 سم ہے۔ جب کہ نقطہ P قوس سے باہر ہے۔ نقطہ P سے قوس پر مماس کھینچیں۔
- 2- 8 سم قطر کا ایک دائرہ بنائیں۔ محیط سے 5 سم کی دوری پر نقطہ C کو ظاہر کریں۔ نقطہ C سے دائرے کا مرکز استعمال کئے بغیر، مماس کھینچیں۔
- 3- رداس 2 سم کا دائرہ بنائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ  $60^\circ$  کا زاویہ بنانے والے دو مماس کھینچیں۔
- 4- 3 سم رداس والے دائرے کے دو عمودی مماس کھینچیں۔
- 5- دو مساوی دائرے 8 سم کے فاصلہ پر ہیں۔ ان دائروں کے راست مشترک مماس کھینچیں۔



- 6- 2.4 سم رداس والے دو مساوی دائرے کھینچیں۔ اگر ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 6 سم ہو تو ان کے معکوس مماس کھینچیں۔
- 7- دو دائرے کھینچیں جن کے رداس 2.5 سم اور 3 سم ہیں۔ اگر ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 6.5 سم ہو تو دو راست مشترک مماس کھینچیں۔
- 8- دو دائرے کھینچیں جن کے رداس 3.5 سم اور 2 سم ہیں۔ اگر ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 6 سم ہو تو دو معکوس مشترک مماس کھینچیں۔
- 9- دو مس کرتے ہوئے دائروں کے رداس 2.5 سم اور 3.5 سم ہیں۔ ان کے دو مشترک مماس کھینچیں۔
- 10- دو قطع کرتے ہوئے دائروں کے رداس 3 سم اور 4 سم ہیں۔ ان کے دو مشترک مماس کھینچیں۔
- 11- دائرہ کھینچیں جو دیے گئے زاویوں کے دونوں بازوؤں کو چھوتے ہوں:
- (i)  $45^\circ$  (ii)  $60^\circ$

## متفرق مشق 13

### کثیر الانتخابی سوالات

#### صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔

- 1- (i) دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔  
 (a) وتر (b) قطعہ (c) سرحد
- (ii) دائرے کو قطع کر تا خط کہلاتا ہے۔  
 (a) مماس (b) خطِ قاطع (c) وتر
- (iii) ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو، کہلاتا ہے۔  
 (a) قطعاع دائرہ یا سیکٹر (b) قطعہ (c) وتر
- (iv) نصف دائرے میں محصور زاویہ ہوتا ہے۔  
 (a)  $\frac{\pi}{2}$  (b)  $\frac{\pi}{3}$  (c)  $\frac{\pi}{4}$
- (v) ایک دائرے کے قطر کی لمبائی دائرے کے رداس کے کتنے گنا ہوتی ہے؟  
 (a) 1 گنا (b) 2 گنا (c) 3 گنا

(vi) دائرے کا مماس اور رداس کا ایک دوسرے

(a) کے متوازی (b) پر عمود نہیں (c) پر عمود

(vii) دائرے جو تین مشترک نقاط رکھتے ہوں۔

(a) متراکب ہونا (b) ہم خطی (c) منطبق نہ ہونا

(viii) جب دو دائرے ایک دوسرے کو مس کرتے ہوں تو ان کے مراکز اور ملنے والا نقطہ ہوتے ہیں۔

(a) منطبق (b) غیر ہم خطی (c) ہم خطی

(ix) ایک مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے۔

(a)  $\frac{\pi}{3}$  (b)  $\frac{\pi}{4}$  (c)  $\frac{\pi}{6}$

(x) اگر محصور مرکز اور محاصرہ مرکز منطبق ہوں تو مثلث ہوتی ہے۔

(a) مساوی الساقین (b) قائمہ الزاویہ مثلث (c) مساوی الاضلاع

(xi) ایک منظم مثنیٰ کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔

(a)  $\frac{\pi}{4}$  (b)  $\frac{\pi}{6}$  (c)  $\frac{\pi}{8}$

(xii) دائرے کے قطر کے سروں پر مماس ہوتے ہیں۔

(a) متوازی (b) عمود (c) قاطع

(xiii) دو دائروں پر دو معکوس مماس کی لمبائیاں ہوتی ہیں۔

(a) غیر برابر (b) برابر (c) متراکب

(xiv) دائرے کے باہر نقطہ سے کتنے مماس کھینچے جاسکتے ہیں۔

(a) 1 (b) 2 (c) 3

(xv) اگر دو دائروں کے مراکز کا درمیانی فاصلہ رداسوں کے مجموعہ کے برابر ہو تو دائرے ہوں گے۔

(a) قطع کرتے ہیں (b) قطع نہیں کرتے

(c) ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہیں

(xvi) اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی طور پر چھوتے ہوں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ برابر ہوتا ہے۔

(a) رداسوں کا فرق (b) رداسوں کا مجموعہ (c) رداسوں کا حاصل ضرب

(xvii) دو مس کرتے ہوئے دائروں کے کتنے مشترک مماس بنائے جاسکتے ہیں؟

(a) 2 (b) 3 (c) 4

(xviii) دو غیر متقاطع دائروں کے کتنے مشترک مماس کھینچے جاسکتے ہیں؟

(a) 2 (b) 3 (c) 4



## 2- دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔

(i) مندرجہ ذیل کی تعریف لکھیں اور اشکال بنائیں۔

- (a) دائرے کا قطعہ (b) دائرے کا مماس  
(c) دائرے کا سیکٹر (یا قطاع دائرہ) (d) محصور دائرہ  
(e) محاصرہ دائرہ (f) جانبی دائرہ

(ii) ایک منظم مثلث کے ضلع کی لمبائی 3 سم ہے۔ اس کا احاطہ معلوم کریں۔

(iii) n-ضلعی کثیر الاضلاع کے اندر موجود زاویہ معلوم کرنے کا کلیہ معلوم کریں۔

(iv) ایک منظم مخمس کے ضلع کی لمبائی 5 سم ہے اس کا احاطہ کیا ہے؟

## 3- حتمی جگہ پر کریں۔

(i) دائرے کی سرحد کو \_\_\_\_\_ کہا جاتا ہے۔

(ii) دائرے کے محیط کو دائرے کی \_\_\_\_\_ کہا جاتا ہے۔

(iii) دائرے کے دو نقاط کو ملانے والا خط \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔

(iv) دائرے کے دو غیر متوازی وتروں کے عمودی ناصف کے نقطہ تقاطع کو \_\_\_\_\_ کہا جاتا ہے۔

(v) دائرے جن کے تین نقاط مشترک ہوں تو وہ \_\_\_\_\_ ہونگے۔

(vi) نقطہ جو دائرے کے اندر ہو۔ اس کا مرکز سے فاصلہ رداس سے \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(vii) نقطہ جو دائرے کے باہر ہو۔ اس کا مرکز سے فاصلہ رداس سے \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(viii) دائرے کا صرف \_\_\_\_\_ مرکز ہوتا ہے۔

(ix) صرف اور صرف ایک دائرہ تین \_\_\_\_\_ نقاط سے کھینچا جاسکتا ہے۔

(x) نصف دائرہ میں محصور زاویہ \_\_\_\_\_ زاویہ ہوتا ہے۔

(xi) اگر دو دائرے ایک دوسرے کو مس کریں تو نقطہ \_\_\_\_\_ اور \_\_\_\_\_ ہم خط ہوتے ہیں۔

(xii) اگر دو دائرے ایک دوسرے کو مس کریں تو ان کا نقطہ تماس اور مراکز \_\_\_\_\_ ہوتے ہیں۔

(xiii) دائرے سے باہر نقطہ سے \_\_\_\_\_ مماس کھینچے جاسکتے ہیں۔

(xiv) مماس، نقطہ تماس سے دائرے کے رداس پر \_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔

(xv) سیدھا خط جو دائرے کے رداس پر عمود ہو تو وہ دائرے کا \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔

(xvi) دو دائرے ایک دوسرے کو \_\_\_\_\_ نقاط سے زیادہ پر نہیں کاٹتے۔

(xvii) ایک دائرے کے وتر کا عمودی ناصف \_\_\_\_\_ سے گزرتا ہے۔

(xviii) دو دائروں کے راست مشترک مماسوں کی لمبائی ایک دوسرے کے \_\_\_\_\_ ہوتی ہے۔

(xix) دو دائروں کے معکوس مشترک مماسوں کی لمبائی ایک دوسرے کے \_\_\_\_\_ ہوتی ہے۔

- (xx) اگر مثلث کا محصور مرکز اور محاصر مرکز منطبق ہوتے ہوں تو مثلث \_\_\_\_\_ ہوتی ہے۔
- (xxi) دو متقاطع دائرے \_\_\_\_\_ نہیں ہوتے۔
- (xxii) محصور دائرے کا مرکز \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔
- (xxiii) محاصر دائرے کا مرکز \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔
- (xxiv) محصور دائرے کا رداس \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔
- (xxv) محاصر دائرے کا رداس \_\_\_\_\_ کہلاتا ہے۔

## خلاصہ

کسی رداس کا دائرہ، پرکار کو کسی معین نقطے پر گھمانے سے ٹریس (Trace) کیا جاسکتا ہے۔

دائرے کے دو غیر متوازی وتروں کے عمودی ناصف جس نقطے پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ وہ نقطہ دائرے کا مرکز ہوتا ہے۔

دیے ہوئے تین غیر ہم خط نقاط سے دائرہ کھینچا جاسکتا ہے۔

جب دائرے کے محیط کا ایک حصہ دیا ہو تو اس دائرے کو مکمل کیا جاسکتا ہے۔

اگر مثلث دی ہوئی ہو تو محاصر دائرہ، محصور دائرہ اور ہر اس کے مقابل **جانبی دائرہ** بنایا جاسکتا ہے۔

اگر ایک دائرہ دیا ہو تو محاصر اور محصور مساوی الاضلاع مثلثیں بنائی جاسکتی ہیں۔

دیے ہوئے دائرے کے لیے محاصر اور محصور مربے بنائے جاسکتے ہیں۔

دیے ہوئے دائرے کے لیے محاصر اور محصور منظم مسدس بنائی جاسکتی ہیں۔

ہم کسی دی ہوئی قوس کے لیے اس کے درمیانی نقطہ، اس کے کسی آخری نقطہ اور وہ نقطہ جو اس پر نہ ہو، مماس کھینچ سکتے ہیں۔

دیے ہوئے دائرے کے محیط پر نقطہ ہو یا نقطہ دائرے کے باہر ہو، مماس کھینچے جاسکتے ہیں۔

دو غیر مساوی مس کرتے ہوئے دائروں کا مماس ٹریس (Trace) کیا جاسکتا ہے۔

دو مساوی دائروں یا دو غیر مساوی دائروں کے راست یا معکوس مشترک مماس کھینچے جاسکتے ہیں۔

ہم دیے ہوئے زاویہ کے بازوؤں کو مس کرتا ہوا دائرہ بنا سکتے ہیں۔

ہم، دو ہم نقطہ خطوط کے درمیانی نقطہ سے گزرتے ہوئے اور ان خطوط کو مس کرتے ہوئے دائرے کو ٹریس (Trace) کر سکتے ہیں۔



## جوابات

### یونٹ 1: دوجی مساواتیں

#### مشق 1.1

1. (i) دوجی،  $x^2 + 4x - 14 = 0$  (ii) دوجی،  $7x^2 - 3x + 7 = 0$   
 (iii) دوجی،  $4x^2 + 4x - 1 = 0$  (iv) پیور،  $x^2 - 1 = 0$   
 (v) پیور،  $x^2 - 20 = 0$  (vi) دوجی،  $x^2 + 29x + 66 = 0$
2. (i)  $\{-4, 5\}$  (ii)  $\left\{0, \frac{-5}{2}\right\}$  (iii)  $\left\{-2, \frac{2}{17}\right\}$   
 (iv)  $\{-8, 19\}$  (v)  $\{3, -4\}$  (vi)  $\left\{\frac{3}{2}, 5\right\}$
3. (i)  $\left\{\frac{-1 \pm 2\sqrt{2}}{7}\right\}$  (ii)  $\left\{\frac{-2 \pm \sqrt{a^2 + 4}}{a}\right\}$  (iii)  $\left\{3, \frac{1}{11}\right\}$   
 (iv)  $\left\{\frac{-m \pm \sqrt{m^2 - 4ln}}{2l}\right\}$  (v)  $\left\{0, \frac{-7}{3}\right\}$  (vi)  $\{-13, 15\}$   
 (vii)  $\left\{-5, \frac{3}{2}\right\}$  (viii)  $\left\{-\frac{1}{2}, -\frac{33}{2}\right\}$  (ix)  $\{1, 3\}$   
 (x)  $\{-3a, 4a\}$

#### مشق 1.2

1. (i)  $\left\{\frac{-7 \pm \sqrt{57}}{2}\right\}$  (ii)  $\left\{\frac{-4 \pm \sqrt{11}}{5}\right\}$  (iii)  $\left\{\sqrt{3}, -\frac{4}{\sqrt{3}}\right\}$   
 (iv)  $\left\{\frac{3 \pm \sqrt{233}}{8}\right\}$  (v)  $\left\{-\frac{1}{3}, \frac{3}{2}\right\}$  (vi)  $\left\{\frac{-4 \pm \sqrt{10}}{3}\right\}$   
 (vii)  $\{3, 7\}$  (viii)  $\left\{3, \frac{-4}{5}\right\}$   
 (ix)  $\left\{(a+b), \frac{1}{2}(a+b)\right\}$  (x)  $\left\{1, \frac{l+m}{l}\right\}$

#### مشق 1.3

1.  $\left\{\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \sqrt{5}\right\}$  2.  $\left\{\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm 2\right\}$  3.  $\left\{\frac{16}{625}, 1\right\}$   
 4.  $\{216, 729\}$  5.  $\left\{\frac{3}{5}, 1\right\}$  6.  $\{-1, 0, 1\}$

7.  $\{6\}$  8.  $\left\{\pm \frac{5}{4}\right\}$  9.  $\left\{-7a, \frac{a}{7}\right\}$   
 10.  $\{\pm 1, 1 \pm \sqrt{2}\}$  11.  $\left\{1, -2, -\frac{1}{2}\right\}$  12.  $\{-3, 0\}$   
 13.  $\{0, -1\}$  14.  $\{2, 4\}$  15.  $\{1, 3, 2 \pm \sqrt{33}\}$   
 16.  $\{-4, -2, 5, 7\}$

#### مشق 1.4

1.  $\left\{-1, -\frac{9}{4}\right\}$  2.  $\{1\}, \left(\frac{-2}{9} \text{ فالتوروت}\right)$  3.  $\left\{\frac{5}{16}\right\}, (-1 \text{ فالتوروت})$   
 4.  $\{7\}, (-12 \text{ فالتوروت})$  5.  $\{4\}$  6.  $\{3\}$   
 7.  $\phi$  یا  $\{\}$  8.  $\{0\}, (-3a \text{ فالتوروت})$  9.  $\left\{\frac{-1 \pm \sqrt{6}}{2}\right\}$   
 10.  $\left\{\frac{-3 \pm \sqrt{2}}{2}\right\}$  11.  $\{-3, 0\}$

#### متفرق مشق 1

1. کثیر الانتخابی سوالات:

- (i) (b) (ii) (c) (iii) (c) (iv) (a)  
 (v) (c) (vi) (b) (vii) (a) (viii) (c)  
 (ix) (a)

2. مختصر جوابات:

- (i)  $-1 \pm \sqrt{3}$  (ii) 0, 3 (iii)  $3x^2 - 2x - 48 = 0$   
 (iv) (a) تجزی (b) تکمیل مربع (c) دو درجی کلیہ (v)  $\frac{-1}{2}, 1$  (vi) -3, 6

3. خالی جگہ پُر کریں۔

- (i)  $ax^2 + bx + c = 0$  (ii) 3 (iii) تکمیل مربع  
 (iv)  $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  (v)  $\left\{\pm \frac{1}{5}\right\}$  (vi) قوت نما  
 (vii)  $\{\pm 3\}$  (viii) معکوس (ix) فالتوروت  
 (x) جذری علامت



## یونٹ 2: دو درجی مساواتوں کا نظریہ

### مشق 2.1

- (i) 17 (ii) -8 (iii) 0 (iv) 81
- (i) حقیقی، مناطق اور نابرابر  $x = 8, 15$  (ii) خیالی،  $x = \frac{-3 \pm \sqrt{-47}}{4}$
- (iii) حقیقی اور برابر  $x = \frac{3}{4}$  (iv) حقیقی، غیر مناطق اور نابرابر  $x = \frac{-7 \pm \sqrt{205}}{6}$
- $k = -\frac{1}{3}, 1$  4. (i)  $k = 2, \frac{2}{3}$  (ii)  $k = -1, 0$  (iii)  $k = 1$
- $a = mc$

### مشق 2.2

- (i)  $-1, -\omega, -\omega^2$  (ii)  $2, 2\omega, 2\omega^2$
- (iii)  $-3, -3\omega, -3\omega^2$  (iv)  $4, 4\omega, 4\omega^2$
- (i) 128 (ii) 1024 (iii) 125 (iv) 24
- (v) 128 (vi) 2 (vii) -6 (viii) -1

### مشق 2.3

- (i)  $S = 5, P = 3$  (ii)  $S = -\frac{7}{3}, P = -\frac{11}{3}$
- (iii)  $S = \frac{q}{p}, P = \frac{r}{p}$  (iv)  $S = \frac{a}{a+b}, P = \frac{b}{a+b}$
- (v)  $S = -\frac{m+n}{l+m}, P = \frac{n-l}{l+m}$  (vi)  $S = \frac{5m}{7}, P = \frac{9n}{7}$
- (i)  $k = \frac{3}{8}$  (ii)  $k = \frac{2}{3}$
- (i)  $k = \frac{64}{23}$  (ii)  $k = -1, 2$
- (i)  $p = 0$  (ii)  $p = \frac{13}{4}$
- (i)  $m = -55$  (ii)  $m = 5$  (iii)  $m = -\frac{10}{7}$
- (i)  $m = \frac{3}{2}$  (ii)  $m = 1$

## 2.4 مشق

1. (i)  $p^2 - 2q$  (ii)  $q(p^2 - 2q)$  (iii)  $\frac{1}{q}(p^2 - 2q)$
2. (i)  $\frac{5}{6}$  (ii)  $\frac{9}{4}$  (iii)  $\frac{5}{9}$  (iv)  $-\frac{235}{96}$
3. (i)  $\frac{-mn^2}{f^3}$  (ii)  $\frac{1}{n^2}[m^2 - 2ln]$

## 2.5 مشق

1. (a)  $x^2 - 6x + 5 = 0$  (b)  $x^2 - 13x + 36 = 0$   
 (c)  $x^2 - x - 6 = 0$  (d)  $x^2 + 3x = 0$   
 (e)  $x^2 + 4x - 12 = 0$  (f)  $x^2 + 8x + 7 = 0$   
 (g)  $x^2 - 2x + 2 = 0$  (h)  $x^2 - 6x + 7 = 0$
2. (a)  $x^2 - 8x + 31 = 0$  (b)  $x^2 + 3x + 36 = 0$   
 (c)  $6x^2 - 3x + 1 = 0$  (d)  $2x^2 + x + 2 = 0$   
 (e)  $2x^2 - 7x + 3 = 0$
3. (a)  $x^2 - (p^2 - 2q)x + q^2 = 0$  (b)  $qx^2 - (p^2 - 2q)x + q = 0$

## 2.6 مشق

1. (i)  $Q(x) = x + 6 ; R = -7$  (ii)  $Q(x) = 4x^2 - 12x + 31 ; R = -78$   
 (iii)  $Q(x) = x^2 + 3x + 3 ; R = 8$
2. (i)  $h = \frac{7}{3}$  (ii)  $h = 6$  (iii)  $h = -5$
3. (i)  $l = -\frac{3}{2}, m = -18$  (ii)  $l = 2, m = -\frac{1}{2}$
4. (i)  $-6, 2, 4$  (ii)  $-2, \frac{1}{2}, 3$  (iii)  $-\frac{3}{4}, -1, 2$
5. (i)  $-3, -1, 1, 3$  (ii)  $-4, -2, 1, 3$

## 2.7 مشق

1.  $\{(4, 1), (-6, 11)\}$  2.  $\{(1, 1), (-5, -8)\}$
3.  $\{(2, -5), (\frac{7}{2}, \frac{-7}{2})\}$  4.  $\{(a, -b), (\frac{a-b}{2}, \frac{a-b}{2})\}$
5.  $\{(-3, 2), (-1, -2)\}$  6.  $\{(0, 1), (-3, -2)\}$
7.  $\{(\pm 2, \pm 3)\}$  8.  $\{(\pm 2, \pm \sqrt{2})\}$



9.  $\{(\pm 1, \pm 1)\}$  10.  $\left\{\left(\frac{5}{3}, \frac{-1}{3}\right), \left(\frac{-5}{3}, \frac{1}{3}\right), (1, 1), (-1, -1)\right\}$
11.  $\left\{(3, 1), (-3, -1), \left(\frac{-4\sqrt{6}}{3}, \sqrt{6}\right), \left(\frac{4\sqrt{6}}{3}, -\sqrt{6}\right)\right\}$
12.  $\left\{\left(\frac{5}{2\sqrt{2}}, \frac{3}{2\sqrt{2}}\right), \left(\frac{-5}{2\sqrt{2}}, \frac{-3}{2\sqrt{2}}\right)\right\}$
13.  $\left\{\left(\frac{7}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(\frac{-7}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}}\right), \left(-\sqrt{3}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right), \left(\sqrt{3}, \frac{-2}{\sqrt{3}}\right)\right\}$

### مشق 2.8

1. 13, 14 2. 4, 5, 6. 3. 12
4.  $\frac{-1}{12}, 2$  5.  $4, -\frac{1}{4}$  6. 81
7. (3, 6), (6, 3) 8.  $x = 5, y = 4$  9. 11, 7
10. 25 سم by 15 سم یا 15 سم by 25 سم

### متفرق مشق 2

#### 1. کثیر الانتخابی سوالات:

- |            |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|------------|
| (i) (c)    | (ii) (b)  | (iii) (b) | (iv) (a)   |
| (v) (a)    | (vi) (b)  | (vii) (c) | (viii) (c) |
| (ix) (d)   | (x) (c)   | (xi) (a)  | (xii) (a)  |
| (xiii) (c) | (xiv) (d) | (xv) (d)  | (xvi) (a)  |

#### 2. مختصر جوابات

- (i) (a) خیال (b) ناطق (حقیقی) نابرابر
- (c) غیر ناطق (حقیقی)، نابرابر (d) ناطق (حقیقی)، برابر
- (ii)  $w^2 = \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$  (iv) 1
- (vi) 0 (vii) 64 (viii)  $x^2 + 3x + 9 = 0$
- (ix)  $Q(x) = x^2 + 5x + 10, R = 22$  (xi) حاصل ضرب =  $-\frac{2r}{p}$ , مجموعہ =  $-\frac{3q}{2p}$
- (xii)  $\frac{10}{9}$  (xiii) (a)  $-\frac{39}{16}$  (b)  $-\frac{13}{8}$  (c)  $\frac{\sqrt{-87}}{4}$
- (xiv) (a)  $x^2 + 5x + 7 = 0$  (b)  $x^2 - 10x + 28 = 0$

- (i)  $b^2 - 4ac$  (ii) برابر (iii) حقیقی (iv) خیالی  
 (v) ناطق (vi) غیر ناطق (vii)  $-\frac{b}{a}$  (viii)  $\frac{c}{a}$   
 (ix)  $\frac{5}{7}$  (x)  $-\frac{9}{5}$  (xi)  $\frac{1}{\alpha\beta}$  (xii)  $1, w, w^2$   
 (xiii) صفر (xiv)  $w^2$  (xv)  $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$   
 (xvi)  $x^2 + 2x + 4 = 0$

### یونٹ 3: تغیرات

#### مشق 3.1

1. (i)  $3 : 5 ; \frac{3}{5}$  (ii)  $3 : 2 ; \frac{3}{2}$  (iii)  $16 : 11 ; \frac{16}{11}$   
 (iv)  $11 : 24 ; \frac{11}{24}$  (v)  $1 : 3 ; \frac{1}{3}$   
 2. (i)  $7 : 12$  (ii)  $7 : 5$   
 3.  $4 : 5$  4.  $p = 8$  5.  $x = 1$  6.  $x = 3; 15$  اور  $24$   
 7.  $x = 2; 8$  اور  $26$  8.  $400$  روپے 9.  $51 : 7$   
 10. (i)  $7$  (ii)  $9bx$  (iii)  $4l$   
 11. (i)  $x = 2$  (ii)  $x = 1$  (iii)  $x = 38$   
 (iv)  $x = p^2 - q^2$  (v)  $x = 4$

#### مشق 3.2

1. (i)  $y = 4x$  (ii)  $y = 20$  (iii)  $x = 7$   
 2. (i)  $y = \frac{7}{3}x$  (ii)  $x = 15, y = 42$   
 3.  $R = \frac{5}{8}T, R = 40, T = 32$  4.  $R = 32$  5.  $V = \frac{5}{27}R^3, R = 15$   
 6.  $w = 3u^3, w = 375$  7.  $y = \frac{14}{x}, y = \frac{1}{9}$  8.  $y = \frac{12}{x}, x = \frac{1}{2}$   
 9.  $w = \frac{35}{z}, w = \frac{4}{5}$  10.  $A = \frac{18}{r^2}, r = \pm \frac{1}{2}$  11.  $a = \frac{48}{b^2}, a = \frac{3}{4}$   
 12.  $V = \frac{135}{r^3}, V = \frac{5}{8}, r = \frac{3}{4}$  13.  $m = \frac{128}{n^3}, m = \frac{16}{27}, n = \frac{2}{3}$



### مشق 3.3

1. (i) 24 (ii)  $9a$  (iii)  $\frac{a-b}{a+b}$   
(iv)  $(x^2 + xy + y^2)^2$  (v)  $(x-2y)^2$  (vi)  $\frac{p-q}{p^2 - pq + q^2}$
2. (i) 24 (ii)  $9x^4$  (iii)  $14b^2$   
(iv)  $5x^3$  (v)  $p-q$  (vi)  $p^2 - pq + q^2$
3. (i)  $\pm 30$  (ii)  $\pm 10x^5y^3$  (iii)  $\pm 45p^2q^3r^5$   
(iv)  $\pm (x-y)$
4. (i)  $p = \pm 15$  (ii)  $x = \pm 12$  (iii)  $p = 8, -4$   
(iv)  $m = 17, -11$

### مشق 3.4

2. (i) 2 (ii) 2 (iii)  $\frac{4(b-a)}{a+b}$  (iv)  $\frac{2(z^2 - y^2)}{yz}$   
(v) 2 (vi)  $\left\{\frac{9}{2}, \frac{11}{3}\right\}$  (vii)  $\pm \sqrt{\frac{5}{2}}$  (extraneous root),  $\phi$  or  $\{ \}$   
(viii)  $\{2p, -2p\}$  (ix)  $\{7\}$

### مشق 3.5

1.  $s = \frac{14u^2}{9v}, \frac{28}{5}$  2.  $w = \frac{1}{36}xy^2z, \frac{49}{3}$  3.  $y = \frac{3x^3}{z^2t}, \frac{2}{3}$
4.  $u = \frac{7x^2}{4yz^3}, \frac{21}{8}$  5.  $v = \frac{7xy^3}{8z^2}, \frac{14}{3}$  6.  $w = \frac{135}{u^3}, \frac{5}{8}$

### مشق 3.7

1. (i)  $A = 48$  مربع یونٹس (ii)  $l = 2$
2.  $S = 4\pi r^2, r = 3$
3. (i)  $S = 2.5$  انچ (ii)  $F = 16$  پونڈ
4.  $I = 45$  کینڈل پاؤر 5.  $d = 20$  فٹ 6. 297000 روپے
7.  $l = 20$  فٹ 8.  $p = 12$  ہارس پاؤر 9. 968000

کثیر الانتخابی سوالات۔

1.

- |            |           |           |            |
|------------|-----------|-----------|------------|
| (i) (b)    | (ii) (c)  | (iii) (b) | (iv) (a)   |
| (v) (c)    | (vi) (a)  | (vii) (d) | (viii) (b) |
| (ix) (a)   | (x) (a)   | (xi) (c)  | (xii) (b)  |
| (xiii) (a) | (xiv) (d) | (xv) (a)  |            |

مختصر جوابات۔

2.

- |                             |                             |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| (vi) $x = 10$               | (vii) $y = \pm \frac{4}{3}$ | (viii) $v = 2$         |
| (ix) $\frac{21}{4}$         | (x) $\pm 28$                | (xi) $\frac{4}{7}$     |
| (xii) $y = \frac{8x^2}{7z}$ | (xiii) $z = 6xy$            | (xiv) $\frac{18}{v^2}$ |

خالی جگہ پر کریں۔

3.

- |                       |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| (i) $\frac{x+y}{x-y}$ | (ii) پہلی رقم      | (iii) دوسری رقم    |
| (iv) طرفین            | (v) وسطین          | (vi) $p = 14$      |
| (vii) $m = 8$         | (viii) $ky$        | (ix) $\frac{v}{k}$ |
| (x) $p^2w$            | (xi) $\frac{4}{3}$ | (xii) 2            |
| (xiii) $\pm 2mn^2p^3$ | (xiv) $m = \pm 6$  |                    |

یونٹ 4: جبزوی کسریں

#### 4.1 مشق

- |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| 1. $\frac{4}{x+1} + \frac{3}{x-3}$           | 2. $\frac{-1}{x-4} + \frac{2}{x+3}$        | 3. $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1}$ |
| 4. $\frac{-1}{x-1} + \frac{2}{x+3}$          | 5. $\frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+2}$         | 6. $\frac{3}{x-4} + \frac{4}{x-3}$ |
| 7. $1 + \frac{9}{5(x-2)} - \frac{4}{5(x+3)}$ | 8. $2x+3 + \frac{5}{3x+1} + \frac{1}{x-1}$ |                                    |

#### 4.2 مشق

- |  |  |
|--|--|
| 1. $\frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-2}$ | 2. $\frac{2}{x+2} + \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{1}{x+3}$ |
|--|--|



$$3. \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} - \frac{3}{(x+2)^2}$$

$$5. \frac{-6}{3x+2} + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$$

$$7. 3 + \frac{3}{x+2} - \frac{2}{(x+2)^2}$$

$$4. x + 1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x-1}$$

$$6. \frac{1}{4(x+1)} - \frac{1}{4(x-1)} + \frac{1}{2(x-1)^2}$$

$$8. \frac{1}{4(x-1)} - \frac{1}{4(x+1)} - \frac{1}{2(x+1)^2}$$

### مشق 4.3

$$1. \frac{-2}{x+3} + \frac{2x-3}{x^2+1}$$

$$3. \frac{1}{2(x+1)} - \frac{x-1}{2(1+x^2)}$$

$$5. \frac{-2}{13(x+3)} + \frac{2x+33}{13(x^2+4)}$$

$$7. \frac{1}{3(x+1)} - \frac{x-2}{3(x^2-x+1)}$$

$$2. \frac{x+12}{5(x^2+1)} - \frac{1}{5(x+3)}$$

$$4. \frac{17x-6}{5(x^2+1)} - \frac{17}{5(x+3)}$$

$$6. \frac{1}{2(x+2)} + \frac{x-2}{2(x^2+4)}$$

$$8. \frac{2}{3(x+1)} + \frac{x+1}{3(x^2-x+1)}$$

### مشق 4.4

$$1. \frac{x}{x^2+4} - \frac{4x}{(x^2+4)^2}$$

$$3. \frac{1}{4(1+x)} - \frac{x-1}{4(x^2+1)} + \frac{x-1}{2(x^2+1)^2}$$

$$5. 1 - \frac{4}{x^2+2} + \frac{4}{(x^2+2)^2}$$

$$2. \frac{1}{(x+1)} + \frac{x}{(x^2+1)^2}$$

$$4. \frac{1}{4(x-1)} - \frac{x+1}{4(x^2+1)} + \frac{x+1}{2(1+x^2)^2}$$

$$6. x - \frac{2x}{x^2+1} + \frac{x}{(x^2+1)^2}$$

### مفرد مشق 4

$$1. \quad (i) (c) \quad (ii) (c) \quad (iii) (b) \quad (iv) (d) \quad (v) (c)$$

$$(vi) (c) \quad (vii) (b) \quad (viii) (a) \quad (ix) (b) \quad (x) (c)$$

$$2. \quad (v) \frac{-4}{x+2} + \frac{5}{x+3}$$

$$(vi) \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x+1)}$$

$$(vii) \frac{3}{2} \left( \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$$

$$(viii) \frac{1}{x-3} + \frac{3}{(x-3)^2}$$

$$(ix) \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{x+a} + \frac{1}{x-a} \right]$$

(x) ہاں، ایک مماثلت ہے۔

## یونٹ 5: سیٹ اور تقابل

### مشق 5.1

- $\{1, 2, 4, 5, 7, 9\}$
  - $\{4, 9\}$
  - $\{1, 2, 4, 5, 7, 9\}$
  - $\{4, 9\}$
- $Y \cup \{13, 17\}$
  - $Y \cup \{13, 17\}$
  - $\{2, 3, 5, 7, 11\}$
  - $\{2, 3, 5, 7, 11\}$
- $Y \cup \{13, 17\}$
  - $T$
  - $Y$
  - $\Phi$
  - $\Phi$
  - $T$
- $\{18, 20, 21, 22, 24, 25\}$
  - $\{18, 20, 21, 22, 24, 25\}$
  - $\{4, 5, \dots, 10, 12, 14, 15, 16, 18, \dots, 25\}$
  - $\{4, 5, \dots, 10, 12, 14, 15, 16, 18, \dots, 25\}$
- $\{2, 6, 10, 14, 18\}$
  - $\{24\}$
- $\Phi$
  - $\{0\}$

### مشق 5.2

- $\{0, 1, 2, 3, \dots, 20, 23\}$
  - $\{0, 1, 2, 3, \dots, 20, 23\}$
  - $\Phi$
  - $\Phi$
  - $\{1, 2, 3, 5, 7, \dots, 19\}$
  - $\{1, 2, 3, 5, 7, \dots, 19\}$
  - $\{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$
  - $\{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$

### مشق 5.4

- $A \times B = \{(a, c), (a, d), (b, c), (b, d)\}$   
 $B \times A = \{(c, a), (c, b), (d, a), (d, b)\}$
- $A \times B = \{(0, -1), (0, 3), (2, -1), (2, 3), (4, -1), (4, 3)\}$   
 $B \times A = \{(-1, 0), (-1, 2), (-1, 4), (3, 0), (3, 2), (3, 4)\}$   
 $A \times A = \{(0, 0), (0, 2), (0, 4), (2, 0), (2, 2), (2, 4), (4, 0), (4, 2), (4, 4)\}$   
 $B \times B = \{(-1, -1), (-1, 3), (3, -1), (3, 3)\}$



3. (i)  $a = 6, b = 3$  (ii)  $a = 1, b = 7$  (iii)  $a = \frac{10}{3}, b = -6$   
 4.  $X = \{a, b, c, d\}; Y = \{a\}$   
 5. (i) 6 (ii) 6 (iii) 9

### 5.5 مشق

1.  $R_1 = \{(a, 3), (b, 4), (c, 3)\}$   
 $R_2 = \{(a, 4), (b, 3), (c, 4)\}$   
 $R_3 = \{(3, a), (4, a)\}$   
 $R_4 = \{(3, b), (4, b), (3, c), (4, c)\}$
2.  $R_1 = \{(-2, -2), (-2, 1), (1, 2), (2, 2)\},$   
 ڈومین  $R_1 = \{-2, 1, 2\} = L,$  رینج  $R_1 = \{-2, 1, 2\}$   
 $R_2 = \{(-2, 1), (1, 1), (-2, 2)\};$   
 ڈومین  $R_2 = \{-2, 1\},$  رینج  $R_2 = \{1, 2\}$
3.  $R_1 = \{(a, a), (a, b)\}; R_2 = \{(b, c), (c, c)\}$   
 $R_1 = \{(a, d), (b, g)\}; R_2 = \{(a, f), (b, e), (c, f)\}$   
 $R_1 = \{(d, e), (d, f)\}; R_2 = \{(e, e), (f, f), (g, g)\}$
4.  $2^{5 \times 5} = 2^{25}$
5. (i)  $R_1 = \{(3, 2), (4, 2), (5, 2), (4, 3), (5, 3)\}$   
 (ii)  $R_2 = \{(2, 2), (3, 3), (5, 5)\}$   
 (iii)  $R_3 = \{(1, 5), (3, 3), (4, 2)\}$   
 (iv)  $R_4 = \{(1, 3), (3, 5), (5, 7)\}$
6. (i) بائی جیکٹیو تفاعل  
 ڈومین  $R_1 = \{1, 2, 3, 4\},$  رینج  $R_1 = \{1, 2, 3, 4\}$   
 (ii) رابطہ  
 ڈومین  $R_2 = \{1, 2, 3\},$  رینج  $R_2 = \{1, 2, 4, 5\}$   
 (iii) آن ٹو تفاعل  
 ڈومین  $R_3 = \{b, c, d\},$  رینج  $R_3 = \{a\}$

(iv) آن ٹو تفاعل

$$R_4 = \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$R_4 = \{1, 3, 4\}$$

(v) بائی جیکٹیو تفاعل

$$R_5 = \{a, b, c, d\},$$

$$R_5 = \{a, b, d, e\}$$

(vi) ربط

$$R_6 = \{1, 2, 3\},$$

$$R_6 = \{2, 3, 4\}$$

(vii) ون-ون ان ٹو تفاعل

$$R_7 = \{1, 3, 5\},$$

$$R_7 = \{p, r, s\}$$

(viii) ربط

$$R_8 = \{1, 3, 7\},$$

$$R_8 = \{a, b, c\}$$

### متفرق مشق 5

کثیر الانتخابی سوالات۔

1.

- |       |     |        |     |         |     |       |     |      |     |
|-------|-----|--------|-----|---------|-----|-------|-----|------|-----|
| (i)   | (c) | (ii)   | (d) | (iii)   | (c) | (iv)  | (b) | (v)  | (d) |
| (vi)  | (c) | (vii)  | (d) | (viii)  | (c) | (ix)  | (b) | (x)  | (a) |
| (xi)  | (c) | (xii)  | (c) | (xiii)  | (a) | (xiv) | (d) | (xv) | (c) |
| (xvi) | (b) | (xvii) | (b) | (xviii) | (c) | (xix) | (b) | (xx) | (c) |

مختصر جوابات۔

2.

(i) A تحت سیٹ ہے B کا.  $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ .

(ii)  $\phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$

(x) (i)  $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(ii)  $(A \cup B)' = A' \cap B'$

حالی جگہ پُر کریں۔

3.

(i) B (ii) غیر مترائب (iii)  $A = B$

(iv)  $(A \cap B) \cup (A \cap C)$  (v)  $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

(vi)  $\phi$  (vii) U (viii)  $\phi$

(ix) U (x)  $A \setminus B$  (xi) تیسرا ربع

(xii) چوتھا ربع (xiii) صفر (xiv) صفر



- (xv)  $\{a, b, c\}$  (xvi)  $\{a, b, c\}$  (xvii) جان وین  
(xviii) ثنائی ربط (xix) آن ٹو (xx) نہیں

## یونٹ 6: بنیادی شماریات

### مشق 6.1

4.

| جماعتی وقفہ  | 2—3 | 4—5 | 6—7 | 8—9 | 10—11 | 12—13 | 14—15 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| تعدادی تقسیم | 2   | 1   | 9   | 5   | 6     | 5     | 3     |

a) 6—7 b) 4—5

### مشق 6.2

3. (i) 24.5 (ii) 290  
4. (i) 24.5 (ii) 290  
5. 32.5  
6. A.M = 9.02 G.M = 8.553 H.M = 8.089  
7. عادی = 9, 4 وسطانیہ = 7  
8. عادی = 2 وسطانیہ = 2  
9. اوسط = 10.478 وسطانیہ = 10.625 عادی = 13.5  
10. (i) نمبر 74 اوسط اوزان (ii) نمبر 72.8 اوسط  
11. روپے فی لٹر = 41.15 اوسط اوزان  
12.

| 2001  | 2002   | 2003 | 2004   | 2005   | 2006 | 2007   | 2008   | 2009 | 2010  |
|-------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|
| ----- | 113.33 | 126  | 142.66 | 159.33 | 178  | 195.33 | 208.67 | 220  | ----- |


### مشق 6.3

4. سعت = 3500 S.D. = 1417.886  
5. a- (i) S.D. = 4.87 (ii) S.D. = 3.87 b- تغیریت = 6.85  
6. اوسط = 27.0935 S.D. = 3.136  
7. سعت = 45

1. (i) (b) (ii) (b) (iii) (a) (iv) (c) (v) (b)  
 (vi) (a) (vii) (a) (viii) (a) (ix) (b) (x) (c)  
 (xi) (b) (xii) (a) (xiii) (c) (xiv) (c) (xv) (a)  
 (xvi) (a) (xvii) (b) (xviii) (b) (xix) (a) (xx) (b)  
 (xxi) (a) (xxii) (c)

یونٹ 7: جیومیٹری کا تعارف

مشق 7.1



2. (i)  $45.5^\circ$  (ii)  $60.5083^\circ$  (iii)  $125.3839^\circ$   
 3. (i)  $47^\circ 21' 36''$  (ii)  $125^\circ 27'$  (iii)  $225^\circ 45'$  (iv)  $-22^\circ 30'$  (v)  $-67^\circ 34' 48''$   
 (vi)  $315^\circ 10' 48''$   
 4. (i)  $\frac{\pi}{6}$  (ii)  $\frac{\pi}{3}$  (iii)  $\frac{3\pi}{4}$  (iv)  $\frac{5\pi}{4}$  (v)  $\frac{-5\pi}{6}$   
 (vi)  $\frac{-5\pi}{4}$  (vii)  $\frac{5\pi}{3}$  (viii)  $\frac{7\pi}{4}$   
 5. (i)  $135^\circ$  (ii)  $150^\circ$  (iii)  $157.5^\circ$  (iv)  $146.25^\circ$  (v)  $171.8869^\circ$




(vi)  $257.83^\circ$  (vii)  $-157.5^\circ$  (viii)  $-146.25^\circ$


## 7.2 مشق

1. (i) 0.57 ریڈین (ii) 1.8 ریڈین
2. (i) 15.4 سم (ii) 15.84 میٹر
3. (i) 16 سم (ii) 66.1818 سم
4. 18 میٹر
5. 220 میٹر
6.  $\frac{\pi}{2}$  ریڈین
7. 12.57 سم
8. 17.6 مربع سم
- 9.(a) 18.85 مربع سم (b) 157.14 مربع سم
10.  $\frac{49\pi}{18}$  مربع میٹر یا 8.55 مربع میٹر
11. 2972.39 مربع سم
12. 31.42 مربع سم
13. 5 ریڈین


## 7.3 مشق




مثبت ہم باز زاویہ  $360^\circ + 170^\circ = 530^\circ$   
منفی ہم باز زاویہ  $-190^\circ$



مثبت ہم باز زاویہ  $60^\circ$   
منفی ہم باز زاویہ  $-300^\circ$



مثبت ہم باز زاویہ  $260^\circ$   
منفی ہم باز زاویہ  $-360^\circ - 100^\circ = -460^\circ$



مثبت ہم باز زاویہ  $220^\circ$   
منفی ہم باز زاویہ  $-140^\circ$

2. (i)  $90^\circ, 180^\circ$  (ii)  $270^\circ, 360^\circ$  (iii)  $540^\circ, 630^\circ$  (iv)  $0^\circ, 90^\circ$

3. (i)  $0, \frac{\pi}{2}$  (ii)  $\frac{\pi}{2}, \pi$  (iii)  $0, \frac{-\pi}{2}$  (iv)  $\frac{-\pi}{2}, -\pi$

4. (i) II (ii) III (iii) IV (iv) II (v) I (vi) III  
 5. (i) +ve (ii) -ve (iii) -ve (iv) -ve (v) +ve  
 (vi) -ve

6. (i) II,  $\sin \theta = \frac{3}{\sqrt{13}}$ ;  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{\sqrt{13}}{3}$ ;  $\cos \theta = \frac{-2}{\sqrt{13}}$ ;  $\sec \theta = -\frac{\sqrt{13}}{2}$ ;  $\tan \theta = \frac{-3}{2}$ ;  
 $\cot \theta = \frac{-2}{3}$

(ii) III,  $\sin \theta = \frac{-4}{5}$ ;  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{-5}{4}$ ;  $\cos \theta = \frac{-3}{5}$ ;  $\sec \theta = \frac{-5}{3}$ ;  $\tan \theta = \frac{4}{3}$ ;  $\cot \theta = \frac{3}{4}$

(iii) I,  $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ;  $\operatorname{cosec} \theta = \sqrt{3}$ ;  $\cos \theta = \sqrt{\frac{2}{3}}$ ;  $\sec \theta = \sqrt{\frac{3}{2}}$ ;  $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ;  $\cot \theta = \sqrt{2}$

7.  $\sec \theta = \frac{-3}{2}$ ;  $\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ;  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{3}{\sqrt{5}}$  or  $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ;  $\tan \theta = \frac{-\sqrt{5}}{2}$ ;  $\cot \theta = \frac{-2}{\sqrt{5}}$

8.  $\sin \theta = \frac{-4}{5}$ ;  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{-5}{4}$ ;  $\cos \theta = \frac{-3}{5}$ ;  $\sec \theta = \frac{-5}{3}$ ;  $\cot \theta = \frac{3}{4}$

9.  $\tan \theta = -1$ ;  $\sec \theta = \sqrt{2}$ ;  $\operatorname{cosec} \theta = -\sqrt{2}$

10.  $\sin \theta = \frac{12}{13}$ ;  $\cos \theta = \frac{5}{13}$ ;  $\sec \theta = \frac{13}{5}$ ;  $\tan \theta = \frac{12}{5}$ ;  $\cot \theta = \frac{5}{12}$

11. (i)  $\sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ;  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{4}{\sqrt{7}}$ ;  $\cos \theta = \frac{3}{4}$ ;  $\sec \theta = \frac{4}{3}$ ;  $\tan \theta = \frac{\sqrt{7}}{3}$ ;  $\cot \theta = \frac{3}{\sqrt{7}}$

(ii)  $\sin \theta = \frac{8}{17}$ ;  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{17}{8}$ ;  $\cos \theta = \frac{15}{17}$ ;  $\sec \theta = \frac{17}{15}$ ;  $\tan \theta = \frac{8}{15}$ ;  $\cot \theta = \frac{15}{8}$

(iii)  $\sin \theta = \frac{2\sqrt{10}}{7}$ ;  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{7}{2\sqrt{10}}$ ;  $\cos \theta = \frac{3}{7}$ ;  $\sec \theta = \frac{7}{3}$ ;  $\tan \theta = \frac{2\sqrt{10}}{3}$ ;

$\cot \theta = \frac{3}{2\sqrt{10}}$

12. (i)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  (ii)  $\frac{-1}{\sqrt{3}}$  (iii)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  (iv) 1 (v)  $\frac{-1}{2}$  (vi)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  (vii) 0 (viii) 0

(ix)  $\frac{-\sqrt{3}}{2}$  (x)  $\frac{-1}{2}$  (xi)  $\sqrt{3}$  (xii)  $\frac{-1}{\sqrt{2}}$



### 7.4 مشق

1.  $\tan^2 x$       2.  $\tan^2 x$       3.  $\sin x$       4.  $\sin^2 x$
5.  $\tan^2 x$       6.  $\cos^2 x$

### 7.5 مشق

1.  $59.74^\circ$       2. 18.652 میٹر      3.  $75.5^\circ$  یا  $75^\circ 30'$
4.  $27.47^\circ$       5. 4924.04 میٹر      6. 3356.4 میٹر      7. 28.72 میٹر
8. 0.199 میل      9. 25.94 فٹ      10. 2928.2 فٹ
11. 164 میٹر ; 164 میٹر (یا 163.93)      12. 20.33 میٹر

### 7 مشق

- Q.1. (i) (a)      (ii) (d)      (iii) (c)      (iv) (b)      (v) (c)  
 (vi) (b)      (vii) (a)      (viii) (b)      (ix) (c)      (x) (b)
- Q.2. (iii)  $10800'$       (v)  $45^\circ$       (vi)  $\frac{\pi}{12}$  ریڈین      (vii) 2 ریڈین      (viii)  $71.27$  سم      (x)  $\frac{40}{9}$
- Q.3. (i)  $180^\circ$       (ii) III      (iii) IV  
 (iv)  $\frac{1}{2}r^2\theta$       (v) 6 مربع سم
- (vi)  $2k\pi + 120^\circ$  جبکہ  $k = 1$       (vii)  $\theta = 30^\circ$  یا  $\frac{\pi}{6}$  ریڈین      (viii) 2
- (ix)  $\operatorname{cosec}^2\theta$       (x)  $\frac{1 - \sin\theta}{\cos\theta}$

یونٹ 8: مثلث کے ایک ضلع کا ظل (سایہ)

### 8.1 مشق

1.  $2.646$  سم ،  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  مربع سم      2.  $m\overline{AC} = 2\sqrt{29}$  سم

### 8.2 مشق

1.  $m\overline{BC} \approx 5.29$  سم      2. 5.45 سم

### 8 مشق

3.  $\approx 4.58$  سم      4.  $\approx 4.12$  سم      5. 15 سم
6. 6 سم      7.  $90^\circ$       8.  $\approx (61.9)^\circ$
9. حادۃ الزاویہ      10. قائمۃ الزاویہ

## یونٹ 9: دائرے کا وتر

### مشق 9.1

3. سم 10

4. سم  $\approx 14.97$

### مشق 9.2

3. سم 7

### متفرق مشق 9

- |    |          |           |            |           |         |
|----|----------|-----------|------------|-----------|---------|
| 1. | (i) (c)  | (ii) (a)  | (iii) (d)  | (iv) (c)  | (v) (a) |
|    | (vi) (b) | (vii) (c) | (viii) (b) | (ix) (a)  | (x) (c) |
|    | (xi) (b) | (xii) (b) | (xiii) (d) | (xiv) (c) |         |

## یونٹ 10: دائرے کا مماس

### مشق 10.2

2. سم 4

3. سم  $\approx 16.96$

### متفرق مشق 10

- |    |          |           |            |          |         |
|----|----------|-----------|------------|----------|---------|
| 1. | (i) (c)  | (ii) (a)  | (iii) (d)  | (iv) (b) | (v) (d) |
|    | (vi) (c) | (vii) (b) | (viii) (d) | (ix) (c) | (x) (a) |
|    | (xi) (c) | (xii) (b) | (xiii) (b) |          |         |

## یونٹ 11: وتر اور قوس

### متفرق مشق 11

- |    |          |           |            |          |         |
|----|----------|-----------|------------|----------|---------|
| 1. | (i) (d)  | (ii) (c)  | (iii) (b)  | (iv) (b) | (v) (a) |
|    | (vi) (c) | (vii) (b) | (viii) (c) | (ix) (a) | (x) (b) |

## یونٹ 12: قطعہ دائرے میں زاویہ

### متفرق مشق 12


- |    |          |           |            |          |         |
|----|----------|-----------|------------|----------|---------|
| 1. | (i) (c)  | (ii) (d)  | (iii) (a)  | (iv) (c) | (v) (b) |
|    | (vi) (d) | (vii) (d) | (viii) (b) | (ix) (d) | (x) (c) |



پونٹ 13: عملی حیومیٹری۔ دائرے


13.1 مشق

1  
(i)




قوس AC کے دو برابر حصے  
 $\widehat{AB}$ ,  $\widehat{BC}$

(ii)




قوس AC کے چار برابر حصے  
 $\widehat{AD}$ ,  $\widehat{DB}$ ,  $\widehat{BE}$ ,  $\widehat{EC}$


2




3(i)




(ii)




4



5.



6.



### مشق 13.2

1. 3.3 سم = رداس

2. 1 سم، تقریباً

3. 2.3 سم

### متفرق مشق 13

### کثیر الانتخابی سوالات۔

1.

- |       |     |        |     |         |     |       |     |      |     |
|-------|-----|--------|-----|---------|-----|-------|-----|------|-----|
| (i)   | (c) | (ii)   | (b) | (iii)   | (a) | (iv)  | (a) | (v)  | (b) |
| (vi)  | (c) | (vii)  | (a) | (viii)  | (c) | (ix)  | (a) | (x)  | (c) |
| (xi)  | (a) | (xii)  | (a) | (xiii)  | (b) | (xiv) | (b) | (xv) | (c) |
| (xvi) | (b) | (xvii) | (b) | (xviii) | (c) |       |     |      |     |

2. (ii) 24 سم

(iii)  $\frac{360^\circ}{n}$ 

(iv) 25 سم

### حالی جگہ پر کریں۔

3.

- |                   |                   |                 |                    |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| (i) محیط          | (ii) حد           | (iii) وتر       | (iv) مرکز          |
| (vi) منطبق        | (vi) کم           | (vii) بڑا       | (viii) ایک         |
| (ix) غیر خطی      | (x) قائمہ         | (xi) تماس، مرکز | (xii) خطی          |
| (xiii) دو         | (xiv) عمود        | (xv) مماس       | (xvi) دو           |
| (xvii) مرکز       | (xviii) برابر     | (xix) برابر     | (xx) مساوی الاضلاع |
| (xxi) ہم مرکز     | (xxii) محصور مرکز |                 | (xxiii) محاصر مرکز |
| (xxiv) محصور رداس | (xxv) محاصر رداس  |                 |                    |



## علامات اور مخففات (Symbols and Abbreviations)

|            |                                |                    |                  |
|------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Adj. A     | A کا ایڈجائنٹ                  | $\therefore$       | کیونکہ           |
| A'         | A کا ٹرانسپوز                  | det A or<br>$ A $  | A کا مقطع        |
| $A^{-1}$   | A کا معکوس                     | $\pi$              | پائی             |
| Add        | جمع                            | $a \times 10^n$    | سائنسی ترقیم     |
| $\log_a x$ | a اساس سے x کا لوگار تھم       | pt                 | نقطہ             |
| i          | آئیوٹا جو 1- کے برابر ہوتا ہے۔ | w.r.t.             | کے لحاظ سے       |
| +ve        | مثبت                           | -ve                | منفی             |
| $\in$      | رکن ہے                         | $\notin$           | رکن نہیں ہے      |
| $\forall$  | تمام کے لیے                    | =                  | برابر            |
| $\exists$  | وجود                           | $\neq$             | برابر نہیں       |
| Alt        | متبادل                         | $\therefore$       | اس لئے           |
| Constr     | عمل (بناوٹ)                    | i.e.               | یعنی             |
| Cor        | نتیجہ صریح                     | $\Rightarrow$      | امپلائز          |
| Corresp    | متناظرہ                        | $\circ$            | ڈگری (درجہ)      |
| Def        | تعریف                          | /                  | منٹ یا فٹ        |
| Ext        | بیرونہ                         | //                 | سیکنڈ یا رینج    |
| Fig        | شکل                            | cm                 | سم               |
| Iff        | صرف اور صرف                    | $\approx / \simeq$ | تقریباً          |
| Iso        | متماثل الساقین                 | $\cong$            | متماثل           |
| Mid pt.    | درمیانی نقطہ                   | $\leftrightarrow$  | مطابقت           |
| perp       | عمود                           | $\Delta^s$         | مثلاثیں          |
| prob.      | سوال                           | $\geq$             | بڑا یا برابر ہے۔ |





|           |             |                 |                    |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Quad.     | چوکور       | $\leq$          | چھوٹا یا برابر ہے۔ |
| Rect      | مستطیل      | $\perp$         | قائمہ زاویہ        |
| Rhmb      | مربع        | $\Delta$        | مثلث               |
| Sq        | مربع        | $\perp$         | عمود               |
| st line   | سیدھا خط    | $\parallel$     | متوازی             |
| Th        | مستطیل      | $\parallel$ gm  | متوازی الاضلاع     |
| Trap      | ذوزنقہ      | $\odot$         | دائرہ              |
| vert opp. | راسی متقابل | $O^{ce}$        | محیط               |
| Q.E.D     | فہم المطلوب | $\overline{AB}$ | قوس AB             |
| $\theta$  | تھیتا       | $\overline{AB}$ | قطعہ خط AB         |
| $\omega$  | اومیگا      | $\phi$          | فائی               |



# لوگر تھم کا جدول (Table of Logarithm)

|    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 0000 | 0043 | 0086 | 0128 | 0170 | 0212 | 0253 | 0294 | 0334 | 0374 | 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 11 | 0414 | 0453 | 0492 | 0531 | 0569 | 0607 | 0645 | 0682 | 0719 | 0755 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| 12 | 0792 | 0828 | 0864 | 0899 | 0934 | 0969 | 1004 | 1038 | 1072 | 1106 | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 |
| 13 | 1139 | 1173 | 1206 | 1239 | 1271 | 1303 | 1335 | 1367 | 1399 | 1430 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 |
| 14 | 1461 | 1492 | 1523 | 1553 | 1584 | 1614 | 1644 | 1673 | 1703 | 1732 | 3 | 6 | 9  | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 15 | 1761 | 1790 | 1818 | 1847 | 1875 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2014 | 3 | 6 | 9  | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 |
| 16 | 2041 | 2068 | 2095 | 2122 | 2148 | 2175 | 2201 | 2227 | 2253 | 2279 | 3 | 5 | 8  | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| 17 | 2304 | 2330 | 2355 | 2380 | 2405 | 2430 | 2455 | 2480 | 2504 | 2529 | 3 | 5 | 8  | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 |
| 18 | 2553 | 2577 | 2601 | 2625 | 2648 | 2672 | 2695 | 2718 | 2742 | 2765 | 2 | 5 | 7  | 9  | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 |
| 19 | 2788 | 2810 | 2833 | 2856 | 2878 | 2900 | 2923 | 2945 | 2967 | 2989 | 2 | 4 | 7  | 9  | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 |
| 20 | 3010 | 3032 | 3054 | 3075 | 3096 | 3118 | 3139 | 3160 | 3181 | 3201 | 2 | 4 | 6  | 8  | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 21 | 3222 | 3243 | 3263 | 3284 | 3304 | 3324 | 3345 | 3365 | 3385 | 3404 | 2 | 4 | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 22 | 3424 | 3444 | 3464 | 3483 | 3502 | 3522 | 3541 | 3560 | 3579 | 3598 | 2 | 4 | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| 23 | 3617 | 3636 | 3655 | 3674 | 3692 | 3711 | 3729 | 3747 | 3766 | 3785 | 2 | 4 | 6  | 7  | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 24 | 3802 | 3820 | 3838 | 3856 | 3874 | 3892 | 3909 | 3927 | 3945 | 3962 | 2 | 4 | 5  | 7  | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 25 | 3979 | 3997 | 4014 | 4031 | 4048 | 4065 | 4082 | 4099 | 4116 | 4133 | 2 | 3 | 5  | 7  | 9  | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 26 | 4150 | 4166 | 4183 | 4200 | 4216 | 4232 | 4249 | 4265 | 4281 | 4298 | 2 | 3 | 5  | 7  | 8  | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 27 | 4314 | 4330 | 4346 | 4362 | 4378 | 4393 | 4409 | 4425 | 4440 | 4456 | 2 | 3 | 5  | 6  | 8  | 9  | 11 | 13 | 14 |
| 28 | 4472 | 4487 | 4502 | 4518 | 4533 | 4548 | 4564 | 4579 | 4594 | 4609 | 2 | 3 | 5  | 6  | 8  | 9  | 11 | 12 | 14 |
| 29 | 4624 | 4639 | 4654 | 4669 | 4683 | 4698 | 4713 | 4728 | 4742 | 4757 | 1 | 3 | 4  | 6  | 7  | 9  | 10 | 12 | 13 |
| 30 | 4771 | 4786 | 4800 | 4814 | 4829 | 4843 | 4857 | 4871 | 4886 | 4900 | 1 | 3 | 4  | 6  | 7  | 9  | 10 | 11 | 13 |
| 31 | 4914 | 4928 | 4942 | 4955 | 4969 | 4983 | 4997 | 5011 | 5024 | 5038 | 1 | 3 | 4  | 6  | 7  | 8  | 10 | 11 | 12 |
| 32 | 5051 | 5065 | 5079 | 5092 | 5105 | 5119 | 5132 | 5145 | 5159 | 5172 | 1 | 3 | 4  | 5  | 7  | 8  | 9  | 11 | 12 |
| 33 | 5185 | 5198 | 5211 | 5224 | 5237 | 5250 | 5263 | 5276 | 5289 | 5302 | 1 | 3 | 4  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10 | 12 |
| 34 | 5315 | 5328 | 5340 | 5353 | 5366 | 5378 | 5391 | 5403 | 5416 | 5428 | 1 | 3 | 4  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 35 | 5441 | 5453 | 5465 | 5478 | 5490 | 5502 | 5514 | 5527 | 5539 | 5551 | 1 | 2 | 4  | 5  | 6  | 7  | 9  | 10 | 11 |
| 36 | 5563 | 5575 | 5587 | 5599 | 5611 | 5623 | 5635 | 5647 | 5658 | 5670 | 1 | 2 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 10 | 11 |
| 37 | 5682 | 5694 | 5705 | 5717 | 5729 | 5740 | 5752 | 5763 | 5775 | 5786 | 1 | 2 | 3  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 38 | 5798 | 5809 | 5821 | 5832 | 5843 | 5855 | 5866 | 5877 | 5888 | 5899 | 1 | 2 | 3  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 39 | 5911 | 5922 | 5933 | 5944 | 5955 | 5966 | 5977 | 5988 | 5999 | 6010 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 40 | 6021 | 6031 | 6042 | 6053 | 6064 | 6075 | 6085 | 6096 | 6107 | 6117 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 9  | 10 |
| 41 | 6128 | 6138 | 6149 | 6160 | 6170 | 6180 | 6191 | 6201 | 6212 | 6222 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 42 | 6232 | 6243 | 6253 | 6263 | 6274 | 6284 | 6294 | 6304 | 6314 | 6325 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 43 | 6335 | 6345 | 6355 | 6365 | 6375 | 6385 | 6395 | 6405 | 6415 | 6425 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 44 | 6435 | 6444 | 6454 | 6464 | 6474 | 6484 | 6493 | 6503 | 6513 | 6522 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 45 | 6532 | 6542 | 6551 | 6561 | 6571 | 6580 | 6590 | 6599 | 6609 | 6618 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 46 | 6628 | 6637 | 6646 | 6656 | 6665 | 6675 | 6684 | 6693 | 6702 | 6712 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 7  | 8  |
| 47 | 6721 | 6730 | 6739 | 6749 | 6758 | 6767 | 6776 | 6785 | 6794 | 6803 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 48 | 6812 | 6821 | 6830 | 6839 | 6848 | 6857 | 6866 | 6875 | 6884 | 6893 | 1 | 2 | 3  | 4  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 49 | 6902 | 6911 | 6920 | 6928 | 6937 | 6946 | 6955 | 6964 | 6972 | 6981 | 1 | 2 | 3  | 4  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |



# لوگر تھم کا جدول (Table of Logarithms)

|    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6990 | 6998 | 7007 | 7016 | 7024 | 7033 | 7042 | 7050 | 7059 | 7067 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 | 7076 | 7084 | 7093 | 7101 | 7110 | 7118 | 7126 | 7135 | 7143 | 7152 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 7160 | 7168 | 7177 | 7185 | 7193 | 7202 | 7210 | 7218 | 7226 | 7235 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 53 | 7243 | 7251 | 7259 | 7267 | 7275 | 7284 | 7292 | 7300 | 7308 | 7316 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 54 | 7324 | 7332 | 7340 | 7348 | 7356 | 7364 | 7372 | 7380 | 7388 | 7396 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 55 | 7404 | 7412 | 7419 | 7427 | 7435 | 7443 | 7451 | 7459 | 7466 | 7474 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 56 | 7482 | 7490 | 7497 | 7505 | 7513 | 7520 | 7528 | 7536 | 7543 | 7551 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 57 | 7559 | 7566 | 7574 | 7582 | 7589 | 7597 | 7604 | 7612 | 7619 | 7627 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 58 | 7634 | 7642 | 7649 | 7657 | 7664 | 7672 | 7679 | 7686 | 7694 | 7701 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 59 | 7709 | 7716 | 7723 | 7731 | 7738 | 7745 | 7752 | 7760 | 7767 | 7774 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 7782 | 7789 | 7796 | 7803 | 7810 | 7818 | 7825 | 7832 | 7839 | 7846 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 61 | 7853 | 7860 | 7868 | 7875 | 7882 | 7889 | 7896 | 7903 | 7910 | 7917 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 62 | 7924 | 7931 | 7938 | 7945 | 7952 | 7959 | 7966 | 7973 | 7980 | 7987 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 63 | 7993 | 8000 | 8007 | 8014 | 8021 | 8028 | 8035 | 8041 | 8048 | 8055 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 64 | 8062 | 8069 | 8075 | 8082 | 8089 | 8096 | 8102 | 8109 | 8116 | 8122 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 65 | 8129 | 8136 | 8142 | 8149 | 8156 | 8162 | 8169 | 8176 | 8182 | 8189 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 66 | 8195 | 8202 | 8209 | 8215 | 8222 | 8228 | 8235 | 8241 | 8248 | 8254 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 67 | 8261 | 8267 | 8274 | 8280 | 8287 | 8293 | 8299 | 8306 | 8312 | 8319 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 68 | 8325 | 8331 | 8338 | 8344 | 8351 | 8357 | 8363 | 8370 | 8376 | 8382 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 69 | 8388 | 8395 | 8401 | 8407 | 8414 | 8420 | 8426 | 8432 | 8439 | 8445 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 8451 | 8457 | 8463 | 8470 | 8476 | 8482 | 8488 | 8494 | 8500 | 8506 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 71 | 8513 | 8519 | 8525 | 8531 | 8537 | 8543 | 8549 | 8555 | 8561 | 8567 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 72 | 8573 | 8579 | 8585 | 8591 | 8597 | 8603 | 8609 | 8615 | 8621 | 8627 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 73 | 8633 | 8639 | 8645 | 8651 | 8657 | 8663 | 8669 | 8675 | 8681 | 8686 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 74 | 8692 | 8698 | 8704 | 8710 | 8716 | 8722 | 8727 | 8733 | 8738 | 8745 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 75 | 8751 | 8756 | 8762 | 8768 | 8774 | 8779 | 8785 | 8791 | 8797 | 8802 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 76 | 8808 | 8814 | 8820 | 8825 | 8831 | 8837 | 8842 | 8848 | 8854 | 8859 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 77 | 8865 | 8871 | 8876 | 8882 | 8887 | 8893 | 8899 | 8904 | 8910 | 8915 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 78 | 8921 | 8927 | 8932 | 8938 | 8943 | 8949 | 8954 | 8960 | 8965 | 8971 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 79 | 8976 | 8982 | 8987 | 8993 | 8998 | 9004 | 9009 | 9015 | 9020 | 9025 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 80 | 9031 | 9036 | 9042 | 9047 | 9053 | 9058 | 9063 | 9069 | 9074 | 9079 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 81 | 9085 | 9090 | 9096 | 9101 | 9106 | 9112 | 9117 | 9122 | 9128 | 9133 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 82 | 9138 | 9143 | 9149 | 9154 | 9159 | 9165 | 9170 | 9175 | 9180 | 9186 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 83 | 9191 | 9196 | 9201 | 9206 | 9212 | 9217 | 9222 | 9227 | 9232 | 9238 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 84 | 9243 | 9248 | 9253 | 9258 | 9263 | 9269 | 9274 | 9279 | 9284 | 9289 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 85 | 9294 | 9299 | 9304 | 9309 | 9315 | 9320 | 9325 | 9330 | 9335 | 9340 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 86 | 9345 | 9350 | 9355 | 9360 | 9365 | 9370 | 9375 | 9380 | 9385 | 9390 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 87 | 9395 | 9400 | 9405 | 9410 | 9415 | 9420 | 9425 | 9430 | 9435 | 9440 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 88 | 9445 | 9450 | 9455 | 9460 | 9465 | 9469 | 9474 | 9479 | 9484 | 9489 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 89 | 9494 | 9499 | 9504 | 9509 | 9513 | 9518 | 9523 | 9528 | 9533 | 9538 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 90 | 9542 | 9547 | 9552 | 9557 | 9562 | 9566 | 9571 | 9576 | 9581 | 9586 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 91 | 9590 | 9595 | 9600 | 9605 | 9609 | 9614 | 9619 | 9624 | 9628 | 9633 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 92 | 9638 | 9643 | 9647 | 9652 | 9657 | 9661 | 9666 | 9671 | 9675 | 9680 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 93 | 9685 | 9689 | 9694 | 9699 | 9703 | 9708 | 9713 | 9717 | 9722 | 9727 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 94 | 9731 | 9736 | 9741 | 9745 | 9750 | 9754 | 9759 | 9763 | 9768 | 9773 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 95 | 9777 | 9782 | 9786 | 9791 | 9795 | 9800 | 9805 | 9809 | 9814 | 9818 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 96 | 9823 | 9827 | 9832 | 9836 | 9841 | 9845 | 9850 | 9854 | 9859 | 9863 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 97 | 9868 | 9872 | 9877 | 9881 | 9886 | 9890 | 9894 | 9899 | 9903 | 9908 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 98 | 9912 | 9917 | 9921 | 9926 | 9930 | 9934 | 9939 | 9943 | 9948 | 9952 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 99 | 9956 | 9961 | 9965 | 9969 | 9974 | 9978 | 9983 | 9987 | 9991 | 9996 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |



(Table of Antilogarithm) اینٹی لوگر تھم کا جدول

|     | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00  | 1000 | 1002 | 1005 | 1007 | 1009 | 1012 | 1014 | 1016 | 1019 | 1021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| .01 | 1023 | 1026 | 1027 | 1030 | 1033 | 1035 | 1038 | 1040 | 1042 | 1045 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| .02 | 1047 | 1050 | 1052 | 1054 | 1057 | 1059 | 1062 | 1064 | 1067 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| .03 | 1072 | 1074 | 1076 | 1079 | 1081 | 1084 | 1086 | 1089 | 1091 | 1094 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| .04 | 1096 | 1099 | 1102 | 1104 | 1107 | 1109 | 1112 | 1114 | 1117 | 1119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .05 | 1122 | 1125 | 1127 | 1130 | 1132 | 1135 | 1138 | 1140 | 1143 | 1146 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .06 | 1148 | 1151 | 1153 | 1156 | 1159 | 1161 | 1164 | 1167 | 1169 | 1172 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .07 | 1175 | 1178 | 1180 | 1183 | 1186 | 1189 | 1191 | 1194 | 1197 | 1199 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .08 | 1202 | 1205 | 1208 | 1211 | 1213 | 1216 | 1219 | 1222 | 1225 | 1227 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .09 | 1230 | 1235 | 1236 | 1239 | 1242 | 1245 | 1247 | 1250 | 1253 | 1256 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .10 | 1259 | 1262 | 1265 | 1268 | 1271 | 1274 | 1276 | 1279 | 1282 | 1285 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .11 | 1288 | 1291 | 1294 | 1297 | 1300 | 1303 | 1306 | 1309 | 1312 | 1315 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .12 | 1318 | 1321 | 1324 | 1327 | 1330 | 1334 | 1337 | 1340 | 1343 | 1346 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .13 | 1349 | 1352 | 1355 | 1358 | 1361 | 1365 | 1368 | 1371 | 1374 | 1377 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .14 | 1380 | 1384 | 1387 | 1390 | 1393 | 1396 | 1400 | 1403 | 1406 | 1409 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .15 | 1413 | 1416 | 1419 | 1422 | 1426 | 1429 | 1432 | 1435 | 1439 | 1442 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .16 | 1445 | 1449 | 1452 | 1455 | 1459 | 1462 | 1466 | 1469 | 1472 | 1476 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .17 | 1479 | 1483 | 1486 | 1489 | 1493 | 1496 | 1500 | 1503 | 1507 | 1510 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .18 | 1514 | 1517 | 1521 | 1524 | 1528 | 1531 | 1535 | 1538 | 1542 | 1545 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .19 | 1549 | 1552 | 1556 | 1560 | 1563 | 1567 | 1570 | 1574 | 1578 | 1581 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .20 | 1585 | 1589 | 1592 | 1596 | 1600 | 1603 | 1607 | 1611 | 1614 | 1618 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .21 | 1622 | 1626 | 1629 | 1633 | 1637 | 1641 | 1644 | 1648 | 1652 | 1656 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .22 | 1660 | 1663 | 1667 | 1671 | 1675 | 1679 | 1683 | 1687 | 1690 | 1694 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .23 | 1698 | 1702 | 1706 | 1710 | 1714 | 1718 | 1722 | 1726 | 1730 | 1734 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .24 | 1738 | 1742 | 1746 | 1750 | 1754 | 1758 | 1762 | 1766 | 1770 | 1774 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .25 | 1778 | 1782 | 1786 | 1791 | 1795 | 1799 | 1803 | 1807 | 1811 | 1816 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .26 | 1820 | 1824 | 1828 | 1832 | 1837 | 1841 | 1845 | 1849 | 1854 | 1858 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .27 | 1862 | 1866 | 1871 | 1875 | 1879 | 1884 | 1888 | 1892 | 1897 | 1901 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .28 | 1905 | 1910 | 1914 | 1919 | 1923 | 1928 | 1932 | 1936 | 1941 | 1945 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .29 | 1950 | 1954 | 1959 | 1963 | 1968 | 1972 | 1977 | 1982 | 1986 | 1991 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .30 | 1995 | 2000 | 2004 | 2009 | 2014 | 2018 | 2023 | 2028 | 2032 | 2037 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .31 | 2042 | 2046 | 2051 | 2056 | 2061 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 | 2084 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .32 | 2089 | 2094 | 2099 | 2104 | 2109 | 2113 | 2118 | 2123 | 2128 | 2133 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .33 | 2138 | 2143 | 2148 | 2153 | 2158 | 2163 | 2168 | 2173 | 2178 | 2183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .34 | 2188 | 2193 | 2198 | 2203 | 2208 | 2213 | 2218 | 2223 | 2228 | 2234 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .35 | 2239 | 2244 | 2249 | 2254 | 2259 | 2265 | 2270 | 2275 | 2280 | 2286 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .36 | 2291 | 2296 | 2301 | 2307 | 2312 | 2317 | 2323 | 2328 | 2333 | 2339 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .37 | 2344 | 2350 | 2355 | 2360 | 2366 | 2371 | 2377 | 2382 | 2388 | 2393 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .38 | 2399 | 2404 | 2410 | 2415 | 2421 | 2427 | 2432 | 2438 | 2443 | 2449 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .39 | 2455 | 2460 | 2466 | 2472 | 2477 | 2483 | 2489 | 2495 | 2500 | 2506 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .40 | 2512 | 2518 | 2523 | 2529 | 2535 | 2541 | 2547 | 2553 | 2559 | 2564 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .41 | 2570 | 2576 | 2582 | 2588 | 2594 | 2600 | 2606 | 2612 | 2618 | 2624 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .42 | 2630 | 2636 | 2642 | 2649 | 2655 | 2661 | 2667 | 2673 | 2679 | 2685 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .43 | 2692 | 2698 | 2704 | 2710 | 2716 | 2723 | 2729 | 2735 | 2742 | 2748 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .44 | 2754 | 2761 | 2767 | 2773 | 2780 | 2786 | 2793 | 2799 | 2805 | 2812 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .45 | 2818 | 2825 | 2831 | 2838 | 2844 | 2851 | 2858 | 2864 | 2871 | 2877 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .46 | 2884 | 2891 | 2897 | 2904 | 2911 | 2917 | 2924 | 2931 | 2938 | 2944 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .47 | 2951 | 2958 | 2965 | 2972 | 2979 | 2985 | 2992 | 2999 | 3006 | 3013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .48 | 3020 | 3027 | 3034 | 3041 | 3048 | 3055 | 3062 | 3069 | 3076 | 3083 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| .49 | 3090 | 3097 | 3105 | 3112 | 3119 | 3126 | 3133 | 3141 | 3148 | 3155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |



(Table of Antilogarithm) اینٹی لوگر تھم کا جدول

|     | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| .50 | 3162 | 3170 | 3177 | 3184 | 3192 | 3199 | 3206 | 3214 | 3221 | 3228 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| .51 | 3236 | 3243 | 3251 | 3258 | 3266 | 3273 | 3281 | 3289 | 3296 | 3304 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4  | 5  | 5  | 6  | 7  |
| .52 | 3311 | 3319 | 3327 | 3334 | 3342 | 3350 | 3357 | 3365 | 3373 | 3381 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4  | 5  | 5  | 6  | 7  |
| .53 | 3388 | 3396 | 3404 | 3412 | 3420 | 3428 | 3436 | 3443 | 3451 | 3459 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 6  | 7  |
| .54 | 3467 | 3475 | 3483 | 3491 | 3499 | 3508 | 3516 | 3524 | 3532 | 3540 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 6  | 7  |
| .55 | 3548 | 3556 | 3565 | 3573 | 3581 | 3589 | 3597 | 3606 | 3614 | 3622 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 7  |
| .56 | 3631 | 3639 | 3648 | 3656 | 3664 | 3673 | 3681 | 3690 | 3698 | 3707 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| .57 | 3715 | 3724 | 3733 | 3741 | 3750 | 3758 | 3767 | 3776 | 3784 | 3793 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| .58 | 3802 | 3811 | 3819 | 3828 | 3837 | 3846 | 3855 | 3864 | 3873 | 3882 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| .59 | 3890 | 3899 | 3908 | 3917 | 3926 | 3936 | 3945 | 3954 | 3963 | 3972 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 6  | 7  | 8  |
| .60 | 3981 | 3990 | 3999 | 4009 | 4018 | 4027 | 4036 | 4046 | 4055 | 4064 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 6  | 7  | 8  |
| .61 | 4074 | 4083 | 4093 | 4102 | 4111 | 4121 | 4130 | 4140 | 4150 | 4159 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| .62 | 4169 | 4178 | 4188 | 4198 | 4207 | 4217 | 4227 | 4236 | 4246 | 4256 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| .63 | 4266 | 4276 | 4285 | 4295 | 4305 | 4315 | 4325 | 4335 | 4345 | 4355 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| .64 | 4365 | 4375 | 4385 | 4395 | 4406 | 4416 | 4426 | 4436 | 4446 | 4457 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| .65 | 4467 | 4477 | 4487 | 4498 | 4508 | 4519 | 4529 | 4539 | 4550 | 4560 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| .66 | 4571 | 4581 | 4592 | 4603 | 4613 | 4624 | 4634 | 4645 | 4656 | 4667 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 9  | 10 |
| .67 | 4677 | 4688 | 4699 | 4710 | 4721 | 4732 | 4742 | 4753 | 4764 | 4775 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| .68 | 4786 | 4797 | 4808 | 4819 | 4831 | 4842 | 4853 | 4864 | 4875 | 4887 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| .69 | 4898 | 4909 | 4920 | 4932 | 4943 | 4955 | 4966 | 4977 | 4989 | 5000 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| .70 | 5012 | 5023 | 5035 | 5047 | 5058 | 5070 | 5082 | 5093 | 5105 | 5117 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 11 |
| .71 | 5129 | 5140 | 5152 | 5164 | 5176 | 5188 | 5200 | 5212 | 5224 | 5236 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8  | 10 | 11 |
| .72 | 5248 | 5260 | 5272 | 5284 | 5297 | 5309 | 5321 | 5333 | 5346 | 5358 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6  | 7  | 9  | 10 | 11 |
| .73 | 5370 | 5383 | 5395 | 5408 | 5420 | 5433 | 5445 | 5458 | 5470 | 5483 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| .74 | 5495 | 5508 | 5521 | 5534 | 5546 | 5559 | 5572 | 5585 | 5598 | 5610 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6  | 8  | 9  | 10 | 12 |
| .75 | 5623 | 5636 | 5649 | 5662 | 5675 | 5689 | 5702 | 5715 | 5728 | 5741 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7  | 8  | 9  | 10 | 12 |
| .76 | 5754 | 5768 | 5781 | 5794 | 5808 | 5821 | 5834 | 5848 | 5861 | 5875 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7  | 8  | 9  | 11 | 12 |
| .77 | 5888 | 5902 | 5916 | 5929 | 5943 | 5957 | 5970 | 5984 | 5998 | 6012 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7  | 8  | 10 | 11 | 12 |
| .78 | 6026 | 6039 | 6053 | 6067 | 6081 | 6095 | 6109 | 6124 | 6138 | 6152 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7  | 8  | 10 | 11 | 13 |
| .79 | 6166 | 6180 | 6194 | 6209 | 6223 | 6237 | 6252 | 6266 | 6281 | 6295 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7  | 9  | 10 | 11 | 13 |
| .80 | 6310 | 6324 | 6339 | 6353 | 6368 | 6383 | 6397 | 6412 | 6427 | 6442 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7  | 9  | 10 | 12 | 13 |
| .81 | 6457 | 6471 | 6486 | 6501 | 6516 | 6531 | 6546 | 6561 | 6577 | 6592 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8  | 9  | 11 | 12 | 14 |
| .82 | 6607 | 6622 | 6637 | 6653 | 6668 | 6683 | 6699 | 6714 | 6730 | 6745 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8  | 9  | 11 | 12 | 14 |
| .83 | 6761 | 6776 | 6792 | 6808 | 6823 | 6839 | 6855 | 6871 | 6887 | 6902 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8  | 9  | 11 | 13 | 14 |
| .84 | 6918 | 6934 | 6950 | 6966 | 6982 | 6998 | 7015 | 7031 | 7047 | 7063 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8  | 10 | 11 | 13 | 15 |
| .85 | 7079 | 7096 | 7112 | 7129 | 7145 | 7161 | 7178 | 7194 | 7211 | 7228 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8  | 10 | 12 | 13 | 15 |
| .86 | 7244 | 7261 | 7278 | 7295 | 7311 | 7328 | 7345 | 7362 | 7379 | 7396 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8  | 10 | 12 | 13 | 15 |
| .87 | 7413 | 7430 | 7447 | 7464 | 7482 | 7499 | 7516 | 7534 | 7551 | 7568 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9  | 10 | 12 | 14 | 16 |
| .88 | 7586 | 7603 | 7621 | 7638 | 7656 | 7674 | 7691 | 7709 | 7727 | 7745 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9  | 11 | 12 | 14 | 16 |
| .89 | 7762 | 7780 | 7798 | 7816 | 7834 | 7852 | 7870 | 7889 | 7907 | 7925 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9  | 11 | 13 | 14 | 16 |
| .90 | 7943 | 7962 | 7980 | 7998 | 8017 | 8035 | 8054 | 8072 | 8091 | 8110 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 |
| .91 | 8128 | 8147 | 8166 | 8185 | 8204 | 8222 | 8241 | 8260 | 8279 | 8299 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 |
| .92 | 8318 | 8337 | 8356 | 8375 | 8395 | 8414 | 8433 | 8453 | 8472 | 8492 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| .93 | 8511 | 8531 | 8551 | 8570 | 8590 | 8610 | 8630 | 8650 | 8670 | 8690 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| .94 | 8710 | 8730 | 8750 | 8770 | 8790 | 8810 | 8831 | 8851 | 8872 | 8892 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| .95 | 8913 | 8933 | 8954 | 8974 | 8995 | 9016 | 9036 | 9057 | 9078 | 9099 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| .96 | 9120 | 9141 | 9162 | 9183 | 9204 | 9226 | 9247 | 9268 | 9290 | 9311 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| .97 | 9333 | 9354 | 9376 | 9397 | 9419 | 9441 | 9462 | 9484 | 9506 | 9528 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| .98 | 9550 | 9572 | 9594 | 9616 | 9638 | 9661 | 9683 | 9705 | 9727 | 9750 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 |
| .99 | 9772 | 9795 | 9817 | 9840 | 9863 | 9886 | 9908 | 9931 | 9954 | 9977 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 |



# اصطلاحات

## یونٹ 1

**دو درجی مساوات:** مساوات جو کہ متغیر مقدار کے مربع پر مشتمل ہو مگر دوسرے کم یا زیادہ طاقت نہ رکھے، دو درجی مساوات یا دوسرے درجے کی مساوات کہلاتی ہے۔

**دو درجی مساوات کی معیاری شکل**  $x$  متغیر (variable) میں دوسرے درجے کی مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$

$a \neq 0$  اور  $a, b, c$  حقیقی اعداد ہوں۔ عام یا معیاری دو درجی مساوات کہلاتی ہے۔ جبکہ  $x^2$  کا عددی سر  $a$ ،  $x$  کا عددی سر  $b$  اور مستقل رقم  $c$  ہے۔

**معکوس مساوات:** کوئی مساوات معکوس مساوات کہلاتی ہے اگر یہ تبدیل نہ ہو جب  $x$  کو  $\frac{1}{x}$  میں تبدیل کیا جائے۔

**قوت نمائی مساوات:** قوت نمائی (exponential) مساواتوں میں متغیر قوت نماؤں میں ہوتا ہے۔

**جزری مساوات:** مساوات جس میں جملہ (expression) جزری علامت کے نیچے ہو، جزری مساوات کہلاتی ہے۔

## یونٹ 2

**فرق کنندہ:** دو درجی جملے  $ax^2 + bx + c$  کا فرق کنندہ " $b^2 - 4ac$ " ہوتا ہے۔

**جزر المکعب:** اکائی کے جزر المکعب 1،  $\omega$  اور  $\omega^2$  ہوتے ہیں۔

**غیر حقیقی جزر المکعب:** اکائی کے غیر حقیقی جزر المکعب  $\omega$  اور  $\omega^2$  ہیں۔

**اکائی کے جزر المکعب کی خصوصیات:**

(a) اکائی کے جزر المکعب کا حاصل ضرب "1" کے برابر ہوتا ہے یعنی  $1 \cdot \omega \cdot \omega^2 = \omega^3 = 1$

(b) اکائی کا ہر ایک غیر حقیقی جزر المکعب دوسرے کا معکوس ہوتا ہے۔

(c) اکائی کا ہر ایک غیر حقیقی جزر المکعب دوسرے کے مربع (Square) کے برابر ہوتا ہے۔

(d) اکائی کے تمام جزر المکعب کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔ یعنی  $1 + \omega + \omega^2 = 0$

**دو درجی مساوات کے روٹس:** دو درجی مساوات  $ax^2 + bx + c = 0$ ،  $a \neq 0$  کے روٹس (Roots)

$$\beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ اور } \alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ ہیں۔}$$

**مجموعہ اور حاصل ضرب:** دودرجی مساوات کے روٹس (Roots) کا مجموعہ اور حاصل ضرب بالترتیب

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \text{ اور } \alpha\beta = \frac{c}{a} \text{ ہوتے ہیں۔}$$

**سمیٹرک تفاعل:** دودرجی مساوات کے روٹس پر مشتمل ایسے تفاعل جن میں روٹس ایسے ہوتے ہیں کہ روٹس کو بدلنے سے جملے کی قیمت تبدیل نہ ہو تو ایسے تفاعل کو سمیٹرک تفاعل کہتے ہیں۔

**دودرجی مساوات بنانا:**

$$0 = (x^2 - (\text{روٹس کا مجموعہ})x + (\text{روٹس کا حاصل ضرب}))$$

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

**ترکیبی تقسیم:** جب کثیر رتی کو یک درجی کثیر رتی سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو حاصل قسمت اور باقی معلوم کرنے کے طریقہ کو ترکیبی تقسیم کہتے ہیں۔

**ہمزاد مساواتیں:** دو متغیروں میں دو مساواتوں  $f(x, y) = 0$  اور  $g(x, y) = 0$  جن کا حل سیٹ مشترک ہو ہمزاد مساواتیں کہلاتی ہیں۔

### یونٹ 3

**نسبت:** دو ہم قسم مقداروں کے درمیان تعلق نسبت کہلاتا ہے۔

**تناسب:** تناسب بیان کردہ دو نسبتوں کی برابری کو ظاہر کرتا ہے۔

اگر دو نسبتیں  $a : b$  اور  $c : d$  برابر ہوں۔ تو ہم ان کو  $a : b = c : d$  لکھ سکتے ہیں۔

**تغیر راست:** اگر دو مقداروں کے درمیان اس طرح کا تعلق ہو کہ ایک مقدار کے بڑھنے (کم ہونے) سے دوسری مقدار اسی نسبت سے بڑھے (کم) ہو تو ایسے تغیر کو تغیر راست کہتے ہیں۔

**تغیر معکوس:** اگر دو مقداروں کے درمیان اس طرح کا تعلق ہو کہ جب ایک مقدار بڑھے اور دوسری اسی نسبت سے کم ہو تو ایسا تعلق تغیر معکوس کہلاتا ہے۔



## تناسب کے مسئلے:

(1) مسئلہ عکس نسبت:

اگر  $a : b = c : d$  ہو تو  $b : a = d : c$

(2) مسئلہ ابدال نسبت:

اگر  $a : b = c : d$  ہو تو  $a : c = b : d$

(3) مسئلہ ترکیب نسبت:

اگر  $a : b = c : d$  ہو تو

$$(i) a + b : b = c + d : d$$

$$(ii) a : a + b = c : c + d \quad \text{اور}$$

(4) مسئلہ تفصیل نسبت:

اگر  $a : b = c : d$  ہو تو

$$(i) a - b : b = c - d : d$$

$$(ii) a : a - b = c : c - d \quad \text{اور}$$

(5) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت:

اگر  $a : b = c : d$  ہو تو

$$a + b : a - b = c + d : c - d$$

**مشترک تغیر:** ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات میں راست اور معکوس تغیروں کے ملنے سے مشترک تغیر بنتا ہے۔

**K-طریقہ**

$$(a) \quad c = dk \text{ اور } a = bk \quad \text{یا} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \quad \text{اگر } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ ہو تو}$$

$$(b) \quad c = fk \text{ اور } c = dk, a = bk \quad \text{اگر } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k \text{ ہو تو}$$

## یونٹ 4

کسر: کسر دو اعداد یا الجبری جملوں کی نسبت ہوتی ہے۔

ناطق کسر:  $\frac{N(x)}{D(x)}$  قسم کی کسر جس میں  $N(x)$  اور  $D(x)$  حقیقی عددی سروں والی کثیر رقمیاں ہوں، ناطق کسر کہلاتی ہے۔

جب کہ کسر میں  $D(x)$ ، صفر کے برابر نہیں ہوتا۔ ہر کسری جملے کو دو کثیر رقمیوں کی نسبت میں ظاہر کر سکتے ہیں۔

واجب کسر: ناطق کسر  $\frac{N(x)}{D(x)}$  جبکہ  $D(x) \neq 0$ ، واجب کسر کہلاتی ہے اگر شمار کنندہ میں کثیر رقمی  $N(x)$  کا درجہ نسب نما

میں کثیر رقمی  $D(x)$  کے درجے سے کم ہو۔

غیر واجب کسر: ناطق کسر  $\frac{N(x)}{D(x)}$  جبکہ  $D(x) \neq 0$ ، غیر واجب کسر کہلاتی ہے اگر شمار کنندہ میں کثیر رقمی  $N(x)$  کا درجہ

نسب نما میں کثیر رقمی  $D(x)$  کے درجے سے زیادہ ہو یا برابر ہو۔

جذری کسر: حاصل کسر  $\frac{N(x)}{D(x)}$  کی تحلیل جب:

(a) نسب نما  $D(x)$ ، غیر مکرر یک درجی اجزائے ضربی پر مشتمل ہو۔

(b) نسب نما  $D(x)$ ، مکرر یک درجی جزو ضربی پر مشتمل ہو۔

(c) نسب نما  $D(x)$ ، غیر مکرر، دو درجی جزو ضربی پر مشتمل ہو۔

(d) نسب نما  $D(x)$ ، مکرر دو درجی جزو ضربی پر مشتمل ہو۔

## یونٹ 5

سیٹ: کچھ مشترک خصوصیات کی حامل واضح اشیاء کے مجموعہ کو سیٹ کہتے ہیں۔

سیٹوں کا یونین: دو سیٹوں  $A$  اور  $B$  کا یونین ایسے ارکان پر مشتمل سیٹ ہوتا ہے جو  $A$  میں یا  $B$  میں یا دونوں میں ہوں۔ اس کو

$A \cup B$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

سیٹوں کا تقاطع: دو سیٹوں  $A$  اور  $B$  کا تقاطع دونوں سیٹوں کے مشترک ارکان پر مشتمل سیٹ ہوتا ہے۔ اس کو  $A \cap B$  سے

ظاہر کرتے ہیں۔ علامتی طور پر اسے  $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ اور } x \in B\}$  لکھتے ہیں۔



**سیٹوں کا فرق:** سیٹ  $B$  اور  $A$  کے فرق کو  $B - A$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس سیٹ میں  $B$  کے وہ ارکان ہوتے ہیں جو  $A$  میں نہیں ہوتے۔

**کمپلیمنٹ سیٹ:**  $U$  کے لحاظ سے سیٹ  $A$  کے کمپلیمنٹ سیٹ میں  $U$  کے وہ تمام ارکان ہوتے ہیں جو  $A$  میں نہیں ہوتے۔ اس کو  $A^c = A' = U - A$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

**بند اشکال:** برطانوی ریاضی دان جان وین (1834-1923) نے یونیورسل سیٹ  $U$  کے لئے مستطیل کو پہلی دفعہ استعمال کیا اور اس کے تحتی سیٹوں  $A$  اور  $B$  کو اس کے اندر بند اشکال کے طور پر استعمال کیا۔

**مترتب جوڑا:** ایک مترتب جوڑے کے ارکان کو ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ جس میں ارکان کی ترتیب کی پابندی کی جاتی ہے۔ دو غیر خالی سیٹوں  $A$  اور  $B$  کی کارتیسی حاصل ضرب میں تمام مرتب جوڑے  $(x, y)$  ہوتے ہیں۔ جب کہ  $x \in A, y \in B$  ہو تو اس سیٹ کو  $A \times B$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

**ثانی ربط:** اگر  $A$  اور  $B$  دو غیر خالی سیٹ ہوں اور  $R \subseteq A \times B$  تو تحتی سیٹ  $R$  سے  $A$  میں ثانی ربط کہلاتا ہے۔

**تفاعل:** اگر دو غیر خالی سیٹ  $A$  اور  $B$  ہوں تو ربط  $f: A \rightarrow B$  تفاعل کہلاتا ہے اگر

$$\text{Dom } f = A \quad (i)$$

(ii) ہر  $x$  جو  $A$  میں ہو،  $f$  کے صرف ایک ہی مرتب جوڑے کا پہلا رکن ہوتا ہے۔

**تفاعل کی ڈومین اور رینج:**  $f$  کا ڈومین سیٹ  $f$  کے مرتب جوڑوں کے پہلے تمام ارکان پر مشتمل ہوتا ہے اور  $f$  کی رینج سیٹ  $f$  کے مرتب جوڑوں کے تمام دوسرے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔

**ان ٹو تفاعل:** ایک تفاعل  $f: A \rightarrow B$  ان ٹو تفاعل کہلاتا ہے اگر  $B$  کا کم از کم ایک رکن سیٹ  $A$  کے کسی رکن کا عکس (ایچ)

$$\text{Range } f \subseteq B \text{ یعنی نہ ہو۔}$$

**آن ٹو تفاعل:** ایک تفاعل  $f: A \rightarrow B$  آن ٹو تفاعل کہلاتا ہے اگر سیٹ  $B$  کا ہر رکن سیٹ  $A$  کے کم از کم ایک رکن کا عکس

$$\text{Range } f = B \text{ ہو یعنی}$$

**ون۔ ون تفاعل:** ایک تفاعل  $f: A \rightarrow B$  ون۔ ون تفاعل کہلاتا ہے اگر سیٹ  $A$  کے تمام واضح ارکان کے واضح عکس

سیٹ  $B$  میں ہوں۔

**بائی جیکٹیو تفاعل:**  $f: A \rightarrow B$  بائی جیکٹیو تفاعل کہلاتا ہے۔ اگر تفاعل  $f$  ون۔ ون اور آن ٹو ہو۔

**مستقل تفاعل:** ایک تفاعل  $f: A \rightarrow B$  مستقل تفاعل کہلاتا ہے۔ اگر  $\forall x \in A$  کے لیے سیٹ  $B$  میں ایک رکن  $c$  ہو۔ اس طرح کہ  $f(x) = c$

**مماثل تفاعل:** ایک تفاعل  $f: A \rightarrow A$  مماثل تفاعل کہلاتا ہے۔ اگر  $\forall x \in A$  کے لیے  $f(x) = x$

## یونٹ 6

**تعددی تقسیم:** خام مواد کو منظم یک طرفہ جدول کی صورت میں پیش کرنے کو تعددی تقسیم کہتے ہیں۔

**جماعتی حدود:**

(a) ہر جماعت یا گروہ میں دو قیمتیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی اور دوسری بڑی۔ اس گروہ (جماعت) کی چھوٹی

قیمت کو زیریں (پچلی) جماعتی حد اور بڑی قیمت کو بالائی جماعتی حد کہتے ہیں۔

(b) کسی جماعت (گروہ) میں حقیقی پچلی جماعتی حد اور حقیقی بالائی جماعتی حد کو حقیقی جماعتی حدود کہا جاتا ہے۔

(c) کسی جماعت کے درمیانی نقطہ کو جماعتی نشان کہا جاتا ہے۔ یہ ہر کلاس کی زیریں اور بالائی جماعتی حد کو جمع کر کے 2 پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

(d) مجموعی تعدد کا کالم تعددی کالم سے مرتب کیا جاتا ہے کسی گروپ (کلاس) کی بالائی حد سے کم تمام گروپس کے تعدد کو مجموعی تعدد کہا جاتا ہے۔

**کالمی نقشہ:** کالمی نقشہ متصل مستطیلوں کا گراف ہوتا ہے جس کو  $XY$ -محور پر تشکیل دیا جاتا ہے۔

**حسابی اوسط:** حسابی اوسط وہ قیمت ہے جو تمام مدات کے مجموعہ کو مدات کی تعداد پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

**انحراف:** کسی متغیر مقدار سے مستقل مقدار کے فرق کو انحراف کہا جاتا ہے۔ جیسے  $D_i = x_i - A$

**اقلیدی اوسط:** کسی متغیر  $x$  کی اقلیدی اوسط سے مراد  $n$ -مدات  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  کے حاصل ضرب کا  $n$ th مثبت روٹ ہوتا ہے۔ علامتی طور پر ہم اسے یوں لکھیں گے۔

$$G.M = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)^{1/n} \quad (\text{اقلیدی اوسط})$$

**ہم آہنگ اوسط:** ہم آہنگ اوسط وہ قیمت ہے جو  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  مدات کے معکوس کا حسابی اوسط لینے سے حاصل ہوتی ہے۔



عادہ: عادہ سے مراد وہ قیمت ہے جو کسی مواد میں سب سے زیادہ بار آئے۔

$$\text{عادہ} = l + \frac{f_m - f_1}{2f_m - f_1 - f_2} \times h$$

وسطانیہ: وسطانیہ ایک بیانا ہے جو کسی مواد کی درمیانی مد کا تعین کرتا ہے۔

$$\text{وسطانیہ} = l + \frac{h}{f} \left\{ \frac{n}{2} - c \right\}$$

انتشار: شماریات میں، انتشار سے مراد کسی مواد میں موجود مدات کا پھیلاؤ ہے۔

سعت: سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی مد کے فرق کو سعت کہتے ہیں۔ اس کی پیمائش کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$\text{سعت} = X_{\max} - X_{\min} = X_m - X_0$$

تغیریت: تغیریت وہ قیمت ہے جو کسی مواد میں انحرافات کے مربعوں کو جو کہ حسابی اوسط سے لیے گئے ہوں، ان کے مجموعہ کو ان کی مدات  $x_i$  ( $i = 1, 2, 3, \dots$ ) کی تعددات پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ علامتی طور پر اسے ہم اس طرح لکھتے ہیں۔

$$X = S.D(X) = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}}$$

## یونٹ 7

ڈگری: اگر دائرے کے محیط کو 360 برابر قوسوں میں تقسیم کریں تو دائرے کے مرکز پر ایک قوس سے بننے والے زاویوں کو ایک ڈگری کہتے ہیں اور اس کو  $1^\circ$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

ریڈین: ایک قوس جس کی لمبائی دائرے کے رداس کے برابر ہو، اس سے دائرے کے مرکز پر بننے والے زاویے کی مقدار ایک ریڈین کہلاتی ہے۔

ریڈین اور ڈگری کے درمیان تعلق:

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ ریڈین} \approx 0.0175 \text{ ریڈین} \quad 1 \text{ ریڈین} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.295^\circ \approx 57.295^\circ$$

دائرے کے مرکزی زاویہ، قوس اور رداس میں تعلق: مرکزی زاویہ  $\theta$  اور دائرے کی قوس کی لمبائی  $l$  میں تعلق  $l = r\theta$  ہوتا ہے۔

دائرہ قاطع کارقبہ: دائرہ قاطع کارقبہ  $A = \frac{1}{2} r^2 \theta$  کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی  $A = \frac{1}{2} r^2 \theta$

کوٹر مینٹل زاویہ: دو یا دو سے زیادہ زاویے جن کے ابتدائی بازو اور اختتامی بازو ایک جیسے ہوں، کوٹر مینٹل زاویے کہلاتے ہیں۔

ربع زاویہ: اگر کسی زاویے کا اختتامی بازو  $x$  - محور یا  $y$  - محور پر ہو تو اس زاویے کو ربع زاویہ کہتے ہیں۔

زاویہ کی معیاری صورت: اگر عمومی زاویے کا راس (Vertex)، مبدأ (Origin) پر ہو اور ابتدائی بازو مستوی میں  $x$  - محور کی مثبت سمت میں ہو ایسا زاویہ معیاری صورت میں ہوتا ہے۔

تکوینیاتی نسبتیں: بنیادی طور پر تکوینیاتی نسبتیں چھ ہیں۔ جن کو Sine، Cosine، Tangent، Cotangent، Secant اور Cosecant کہتے ہیں۔

تکوینیاتی مماثلات:


$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad (b)$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad (a)$$

$$1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta \quad (c)$$


## یونٹ 8

ظل: کسی نقطہ سے ایک دیے ہوئے قطعہ خط پر عمود کھینچا جائے تو پایہ عمود کو نقطہ کا ظل یا سایہ کہتے ہیں۔ اگر  $\overline{CD} \perp \overline{AB}$  کھینچا جائے تو پایہ عمود  $D$  کو نقطہ  $C$  کا ظل کہیں گے۔



صفری سمت: دیے ہوئے قطعہ خط  $\overline{CD}$  کا کسی دوسرے قطعہ خط  $\overline{AB}$  پر ظل سے مراد  $\overline{EF}$  ہے جو نقطہ  $E$  پایہ عمود  $C$  اور نقطہ  $F$  پایہ عمود  $D$  کے درمیان ہوتا ہے، البتہ دیے ہوئے عمودی قطعہ خط  $\overline{CD}$  کا کسی دوسرے قطعہ خط  $\overline{AB}$  پر ایک نقطہ  $E$  ہوتا ہے جس کی پیمائش صفر ہوتی ہے۔





**منفرجہ زاویہ:** کسی منفرجہ الزاویہ مثلث میں منفرجہ زاویے کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے اور دوچند مستطیلی رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔  
**قائمہ زاویہ:** ایک زاویہ جو  $90^\circ$  کے برابر ہو قائمہ زاویہ کہلاتا ہے۔

**حادہ زاویہ:** کسی مثلث میں حادہ زاویہ کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے سے کم دوچند مستطیلی رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔

## یونٹ 9

**دائرہ:** ان تمام مستوی کے نقاط کا گراف جن کا فاصلہ مستوی کے ایک مخصوص نقطہ سے برابر ہو دائرہ کہلاتا ہے۔ مخصوص نقطہ دائرے کا مرکز اور مخصوص نقطہ سے دائرے کے کسی نقطہ کا فاصلہ رداس کہلاتا ہے۔


**دائرے کا محیط:** دائرے کا رداس  $r$  ہو تو اس کا محیط  $2\pi r$  ہوتا ہے۔

**دائرے کا رقبہ:** دائرے کا رداس  $r$  ہو تو اس کا رقبہ  $\pi r^2$  ہوتا ہے۔

**ہم خط نقاط:** تین یا تین سے زیادہ نقاط ایک ہی خط مستقیم پر واقع ہوں تو انہیں ہم خط نقاط کہتے ہیں بصورت دیگر وہ غیر ہم خط نقاط ہوں گے۔

**محاصرہ دائرہ:** مثلث کے راسوں سے گزرنے والا دائرہ محاصرہ دائرہ کہلاتا ہے۔ جبکہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف اس کے مرکز کی نشاندہی کرتے ہیں۔

## یونٹ 10



**قاطع خط:** قاطع خط ایک ایسا خط مستقیم ہے جو دائرے کے محیط کو دو واضح نقاط پر قطع کرتا ہے۔ شکل میں قاطع  $\overleftrightarrow{CD}$  دائرہ کو دو واضح نقاط P اور Q قطع کرتا ہے۔

**مماس:** دائرے کا مماس ایک ایسا خط ہے جو دائرے کے محیط کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہے۔ شکل میں دائرے کے نقطہ T پر  $\overleftrightarrow{AB}$  مماس ہے۔

**مماس کی لمبائی:** مماس کی لمبائی دائرے کے کسی بیرونی نقطہ سے نقطہ تماس تک ہوتی ہے۔

## یونٹ 12

**سیکٹر/قطاع دائرہ:** دائرے کے دو رداسی قطعات اور ان کی درمیانی قوس سے گھرا ہوا علاقہ دائرے کا سیکٹر کہلاتا ہے۔

**مرکزی زاویہ:** مرکزی زاویہ دائرے کے مرکز پر دو رداسوں اور ایک قوس سے بنتا ہے۔

**محاصر زاویہ:** دائرے کے کوئی سے دو وتر جو محیط پر مشترک نقطہ پر ملیں ان سے بننے والا زاویہ محاصر زاویہ کہلاتا ہے۔

**دائرے کا وتر:** محیط کے کوئی سے دو نقاط کو ملانے والا قطعہ خط دائرے کا وتر کہلاتا ہے۔

**سائیکلک چوکور:** وہ چوکور، سائیکلک کہلاتی ہے جس کے چاروں راسوں سے دائرہ کھینچا جاسکتا ہو۔

**محصور مرکز:** مثلث کے محصور دائرہ کے مرکز کو محصور مرکز کہتے ہیں۔

## یونٹ 13

**دائرہ:** کسی رداس کا دائرہ، پرکار کو کسی معین نقطہ پر گھمانے سے ٹریس (Trace) کیا جاسکتا ہے۔ معین نقطہ کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں۔



**رداس:** دائرے کے مرکز سے محیط کے کسی نقطہ تک کا فاصلہ رداس کہلاتا ہے۔

**احاطہ:** جیومیٹری کی کسی شکل کے تمام اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ احاطہ کہلاتا ہے۔

**محیط:** دائرے کی قوس کی کل لمبائی کو محیط کہتے ہیں۔

**قطر:** دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر اس کا قطر کہلاتا ہے۔

**قوس:** دائرے کے محیط کا ایک حصہ قوس کہلاتا ہے۔

**مثلث:** تین غیر متوازی قطعات خط سے بننے والی شکل کو مثلث کہتے ہیں اور قطعات خط اس کے اضلاع کہلاتے ہیں۔

**کثیر الاضلاع:** تین یا تین سے زیادہ قطعات خط سے گھری ہوئی شکل کو کثیر الاضلاع کہتے ہیں۔

**ریگولر کثیر الاضلاع:** ایسی کثیر الاضلاع جس کے تمام اضلاع اور زاویے برابر ہوں۔ ریگولر کثیر الاضلاع کہلاتی ہے۔

**راس:** کثیر الاضلاع کے کسی دو ضلعوں کے مشترک نقطہ کو راس کہتے ہیں۔

**محاصر دائرہ:** دائرہ جو کسی کثیر الاضلاع تمام راسوں سے گزرتا ہو محاصر دائرہ کہلاتا ہے اور دائرے کے اندر کثیر الاضلاع

محصور کثیر الاضلاع کہلاتی ہے۔

**جانبی دائرہ:** دائرہ جو کسی مثلث کے ایک ضلع کو بیرونی اور باقی دو بڑھے ہوئے اضلاع کو اندرونی طور پر ممس کرے۔ جانبی

دائرہ کہلاتا ہے۔

**محاصر دائرہ:** مثلث کے راسوں سے گزرنے والا دائرہ، محاصر دائرہ کہلاتا ہے۔

**محصور دائرہ:** مثلث کے تینوں اضلاع کو اندرونی طور پر ممس کرنے والا دائرہ، محصور دائرہ کہلاتا ہے۔ اس کے مرکز کو محصور

مرکز اور رداس کو محصور رداس کہتے ہیں۔

|          |                  |
|----------|------------------|
| 60.....  | تغیر راست        |
| 73.....  | تغیر مشترک       |
| 62.....  | تغیر معکوس       |
| 160..... | تغیر             |
| 162..... | تغیریت           |
| 67.....  | تفاعل            |
| 91.....  | تفصیل نسبت       |
| 3.....   | تکمیل مربع       |
| 192..... | تکونیاتی مماثلات |
| 180..... | تکونیاتی نسبتیں  |
| 58.....  | تناسب            |
| 64.....  | تیسرا تناسب      |
| 42.....  | تین درجی مساوات  |

## ٹ، ٹ، ش

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 124..... | ٹیلی نشان (مارکس) |
| 113..... | ثنائی ربط         |

## ج، ج

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 25.....  | جزر الملعب کی اکائی کی خصوصیات |
| 13.....  | جزر                            |
| 13.....  | جزری مساوات                    |
| 85.....  | جزوی کسور                      |
| 127..... | جماعتی حدود                    |
| 127..... | جماعتی وقفہ                    |
| 43.....  | چار درجی                       |

## ا، ب

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 171..... | ابتدائی بازو        |
| 66.....  | ابدال نسبت          |
| 171..... | اختتامی بازو        |
| 149..... | اقلیدسی اوسط        |
| 25.....  | اکائی کے جذر الملعب |
| 160..... | انتشاری             |
| 260..... | ای۔ دائرہ           |
| 260..... | ای۔ رداس            |
| 260..... | ای۔ مرکز            |
| 40.....  | باقی                |
| 139..... | بالواسطہ طریقہ      |
| 115..... | بائی جیکٹیو تفاعل   |
| 137..... | براہ راست طریقہ     |
| 123..... | بنیادی شماریات      |
| 227..... | بیرونی              |

## پ، ت

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 56.....  | پہلی رقم           |
| 2.....   | تجری               |
| 67.....  | ترکیب نسبت         |
| 67.....  | ترکیب و تفصیل نسبت |
| 40.....  | ترکیبی تقسیم       |
| 124..... | تعددی تقسیم        |
| 131..... | تعددی کثیر الاضلاع |



ر-ز

|        |                  |
|--------|------------------|
| 182    | ربع زاویہ        |
| 182    | ربع              |
| 210    | رداس             |
| 36     | روٹس کا حاصل ضرب |
| 22     | روٹس کی اقسام    |
| 36     | روٹس کی جمع      |
| 29, 34 | روٹس             |
| 174    | ریڈین            |
| 195    | زاویہ صعود       |
| 195    | زاویہ نزول       |

س، ش، ض

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 171 | ساتھ کا نظام    |
| 249 | سپلیمنٹری زاویے |
| 115 | سرجیکٹو تفاعل   |
| 161 | سعت             |
| 98  | سیٹ کا کمپلیمنٹ |
| 97  | سیٹ             |
| 97  | سیٹوں کا تقاطع  |
| 98  | سیٹوں کا فرق    |
| 97  | سیٹوں کا یونین  |
| 34  | سمیٹرک تفاعل    |
| 84  | شمار کنندہ      |
| 30  | ضعف             |

ط، ظ

|     |           |
|-----|-----------|
| 58  | طریقین    |
| 202 | ظل (سایہ) |

|     |             |
|-----|-------------|
| 64  | چوتھا تناسب |
| 251 | چوکور       |

ح، خ

|          |              |
|----------|--------------|
| 204, 248 | حادہ زاویہ   |
| 40       | حاصل قسمت    |
| 86       | حاصل کسر     |
| 137      | حسابی اوسط   |
| 100      | خاصیت تلازم  |
| 100, 104 | خاصیت مبادلہ |

د، ڈ

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 210      | دائرہ                   |
| 178      | دائرہ قیطان کا رقبہ     |
| 222      | دائرے پر مماس           |
| 171      | درجہ                    |
| 127      | درمیانی نقطہ            |
| 2        | دو درجی پیور مساوات     |
| 21       | دو درجی جملہ            |
| 5        | دو درجی فارمولہ         |
| 36       | دو درجی مساوات کی تشکیل |
| 2        | دو درجی مساوات          |
| 56       | دوسری رقم               |
| 113      | ڈومین                   |
| 102, 106 | ڈی مارگنز قوانین        |
| 171      | ڈگری (درجہ)             |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 210.....      | قطعہ کبیرہ         |
| 11.....       | قوت نمائی مساواتیں |
| 246, 254..... | قوس صغیرہ          |
| 246, 254..... | قوس کبیرہ          |
| 176.....      | قوس                |
| 73.....       | k- طریقہ           |
| 112.....      | کار تیمی ضرب       |
| 258.....      | کثیر الاضلاع       |
| 84.....       | کثیر رتی کا درجہ   |
| 84.....       | کثیر رتی           |
| 84.....       | کسر                |
| 42.....       | کم درجی مساوات     |
| 113.....      | کوڈو مین           |
| 147.....      | گروہی مواد         |

## م

|               |              |
|---------------|--------------|
| 112.....      | مترتب جوڑے   |
| 2.....        | متغیر        |
| 259.....      | مقابلہ زاویے |
| 236, 238..... | متماثل دائرے |
| 215.....      | متماثل       |
| 127, 133..... | مجموعی تعدد  |
| 258.....      | محاصرہ دائرہ |
| 258.....      | محاصرہ مرکز  |
| 259.....      | محصورہ دائرہ |
| 259.....      | محصورہ مرکز  |

## ع، غ

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 147.....       | عادیہ                |
| 2, 29, 89..... | عددی سر              |
| 66.....        | عکس نسبت             |
| 211.....       | عمودی ناصف           |
| 180.....       | عمومی زاویہ          |
| 26.....        | غیر حقیقی جذر الملعب |
| 22, 26.....    | غیر حقیقی            |
| 211.....       | غیر خطی نقاط         |
| 143.....       | غیر گروہی مواد       |
| 268.....       | غیر مساوی دائرے      |
| 89.....        | غیر مکرر             |
| 22.....        | غیر ناطق             |
| 84.....        | غیر واجب کسر         |

## ف، ق، ک، گ

|               |             |
|---------------|-------------|
| 14.....       | فالتو اصل   |
| 21.....       | فرق کنندہ   |
| 89.....       | قابل تحویل  |
| 222.....      | قاطع خط     |
| 270.....      | قاطع دائرے  |
| 204, 248..... | قائمہ زاویہ |
| 248.....      | قائمہ زاویہ |
| 186.....      | قطاع دائرہ  |
| 210, 213..... | قطر         |
| 210.....      | قطعہ صغیرہ  |



184.....ناطق کسر  
84.....ناطق کسر

### ن، و، ہ

87, 90 .....نسب نما  
56.....نسبت  
248.....نصف قطعہ دائرہ  
151.....ہم آہنگ اوسط  
180.....ہم بازو زاویہ  
44.....ہم زاد مساواتیں  
227.....ہم مرکز دائرے  
220.....ہم نقطہ خطوط  
84.....واجب کسر  
84.....واجب کسر  
210.....وتر  
165.....وسط فی التناسب  
143.....وسطانیہ  
58.....وسطین  
107.....وین اشکال

### ی


86.....یک درجی اجزائے ضربی  
2.....یک درجی مساوات  
21.....یکساں فاصلہ

259.....مخصوص مرکز  
176, 210, 220.....محیط  
137.....مرکزی رجحان  
211, 241.....مرکزی زاویہ  
137.....مرکزی قیمت  
227.....مَس کرتے دائرے  
185.....مساوی الاضلاع  
267.....مساوی دائرے  
262.....مسدس  
65.....مسلل نسبت  
195.....مسئلہ فیثاغورث  
267.....مشترک مماس  
115.....مطابقت  
9.....معکوس مساواتیں  
142.....معیاری انحراف  
181.....معیاری زاویہ  
2.....معیاری شکل  
40.....مقسوم علیہ  
88.....مکرر  
21.....مکمل مربع  
87.....مماثلت  
266.....مماس  
204, 248.....منفرجہ زاویہ  
124.....مواد  
113.....مینگ / تفاعل

## حوالہ جات


1. Oxford Mathematics by Teh Kong Seng, Loh Chengyeze,  
Published by: Aameena Saiyed Oxford University Press Karachi.
2. Oxford Additional Mathematics by Ho Soo Thong, Khor Nyak Hiony,  
Published by: Pan Pacific Publishing Singapore.
3. National Curriculum Level 9 & 10 by K.M. Vickers and M.J. Tipler,  
Published by: Canterbury Educational Ltd. Great Britain.
4. Fundamental Algebra and Trigonometry by Robert G. Stein,  
Published by: Nelson-Hall Chicago (USA).
5. A New Sequence of Geometry for School by Johan Gray,  
Published by: Great Educational Co. Ltd. London.
6. Dil's New Geometry by Khawaja Dil Muhammad,  
Published by: Khawaja Book Depot, Lahore.
7. Discovering Algebra by Russell F. Jacobs,  
Published by: Harcourt Brace Jovanovich, New York (USA).
8. Elementary Geometry by C. Godfrey & A.W. Siddons,  
Published by: Cambridge University Press.
9. Complete Mathematics by Indian Edition 2009  
Published in: New Dehli India.
10. Pak Geometry by M. Hassan Rathoor and Dr. Zia-ud-din.





گاڑیاں اپنی اپنی مقررہ لین میں چلائیں۔

اپنی لین میں رہیں



ان میں ایسے گاڑی چلائیں  
جیسے ہدایت کی گئی ہے

دائیں، بائیں اور سیدھی جانے والی گاڑیاں اپنی اپنی مقررہ لین میں چلیں۔

## جملہ حقوق (کاپی رائٹ) بحق ناشر محفوظ ہیں

منظور کردہ: پنجاب کری کولم اتھارٹی بمطابق مراسلہ نمبر PCA/12/123 مورخہ 27-11-2012 اس کتاب کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ناشر سے پرنٹ لائسنس حاصل کر کے سرکاری سکولوں میں مفت تقسیم کے لئے بھی طبع کیا ہے، ناشر کی تحریری اجازت کے بغیر اس کتاب کا کوئی حصہ کسی امدادی کتاب، خلاصہ، ماڈل پیپر، یا گائیڈ وغیرہ میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

ناشر: علمی کتاب خانہ

کبیر سٹریٹ، اردو بازار، لاہور